

不規則抗体マスタ(適合血選択のみ)

番号	名称	略称	臨床的意義	意味合い等
1	抗C	抗C	○	
2	抗c	抗c	○	
3	抗D	抗D	○	
4	抗E	抗E	○	
5	抗e	抗e	○	
6	抗K	抗K	○	
7	抗k	抗k	○	
8	抗Fy ^a	抗Fy ^a	○	
9	抗Fy ^b	抗Fy ^b	○	
10	抗Jk ^a	抗Jk ^a	○	
11	抗Jk ^b	抗Jk ^b	○	
12	抗S	抗S	○	
13	抗s	抗s	○	
14	抗Di ^a	抗Di ^a	○	
15	抗Di ^b	抗Di ^b	○	
16	抗Jr ^a	抗Jr ^a	○	
17	抗Le ^a	抗Le ^a	△	反応増強剤無添加-間接抗グロブリン試験(37°C, 60分)で反応が認められた場合、臨床的意義あり
18	抗Le ^b	抗Le ^b	×	
19	抗M	抗M	△	反応増強剤無添加-間接抗グロブリン試験(37°C, 60分)で反応が認められた場合、臨床的意義あり
20	抗N	抗N	×	
21	抗P1	抗P1	×	
22	抗Xg ^a	抗Xg ^a	×	
23	自己抗体	自己抗体	△	輸血認定医、輸血認定技師または専門機関に相談 溶血症状など臨床症状を有する場合、臨床的意義あり
201	その他	その他		上記1~200に含まれない抗体種
202	同定不能	同定不能		同定検査はしたが抗体の特異性が認められなかったもの

<臨床的意義欄の説明>

○	臨床的意義が高く、抗原陰性血の選択が必要
△	場合によっては抗原陰性血の選択が必要
×	臨床的意義が低いため、抗原陰性血の選択の必要性はない