

令和元年度血液製剤使用実態調査データ集

2019 年 11 月

一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

目 次

回答数(集計対象施設数)・回収率	06
【1】 基本項目	
1-1) 医療機関の概要について	07
1-2) 血液製剤の納入状況について	21
【特別集計:全血製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	22
【特別集計:赤血球製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	25
【特別集計:血小板製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	27
【特別集計:血漿製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	29
1-3) 血液製剤の廃棄状況について	29
【特別集計:全血製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	30
【特別集計:赤血球製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	34
【特別集計:血小板製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	37
【特別集計:血漿製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	40
1-4) 血漿分画製剤の購入状況について	42
【特別集計:アルブミン製剤購入量(g)】	44
【特別集計:加熱人血漿蛋白購入量(g)】	45
【特別集計:免疫グロブリン製剤購入量(g)】	47
1-5) 血漿分画製剤の廃棄状況について	48
【特別集計:アルブミン製剤廃棄量(g)】	50
【特別集計:免疫グロブリン製剤廃棄量(g)】	54

【2】輸血療法の体制について

2-1) 血液製剤の管理について	55
2-2) 輸血関連の検査体制について	58
2-3) 輸血前の検体保管状況と感染症検査の実施状況について	68
2-4) 輸血後の検体保管状況と感染症検査の実施状況について	70
2-5) 輸血の同意書に記載しているHBV, HCV, HIVの残存リスクについて	72
2-6) 業務手順書の整備状況について	75
2-7) 業務手順書の実施のための処置の状況について	76
2-8) その他輸血療法の安全管理について	77

【3】使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について	78
3-2) 輸血用血液製剤の使用実績について	80
3-3) 全血製剤の使用実績について(全体)	81
【特別集計:全血製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	82
【特別集計:一般病床数あたりの全血製剤使用量】	82
3-4) 赤血球製剤の使用実績について(全体)	82
【特別集計:赤血球製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	84
【特別集計:一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】	84
3-5) 赤血球製剤の使用実績について(個別製剤)	91
3-6) 血小板製剤の使用実績について(全体製剤)	123
【特別集計:血小板製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	125
【特別集計:一般病床数あたりの血小板製剤使用量】	125

3-7) 血小板製剤の使用実績について(個別製剤)	134
3-8) 血漿製剤の使用実績について(全体)	198
【特別集計:血漿製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	199
【特別集計:一般病床数あたりの血漿製剤使用量】	200
3-9) 血漿製剤の使用実績について(個別製剤)	207
3-10) 血液照射について	225
3-11) 外来輸血について	227
3-12) 病院外(介護施設・在宅)輸血について	231
3-13) 輸血副作用について	242
3-14) 自己血製剤使用の実績について	245
【特別集計:貯血式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	247
【特別集計:一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】	247
【特別集計:貯血式自己血の廃棄総袋(本)数と総単位数】	248
【特別集計:希釈式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	250
3-15) 血漿分画製剤の使用実績について	251
3-16) アルブミン製剤の使用実績について(全体)	252
【特別集計:アルブミン製剤使用量(g)】	259
【特別集計:一般病床数あたりのアルブミン製剤使用量(g)】	260
3-17) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について(全体)	267
【特別集計:加熱人血漿蛋白使用量(g)】	267
【特別集計:一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白使用量(g)】	268
3-18) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について(全体)	268
【特別集計:免疫グロブリン製剤使用量(g)】	270
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量(g)】	270

3-19) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について(個別製剤)		273
【4】 その他		
4-1) その他		331
【5】 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査		
5-1) 異型適合血および輸血副作用の実態について		332
5-2) 大量出血時の輸血について		338
5-3) 院内成分採血細胞処理・凍結保存・保管に関する実施状況調査		343
5-4) 細胞治療(再生医療等製品)に関する実施状況調査		347
5-5) その他		349

令和元年度血液製剤使用実態調査データ集

2019年11月15日

回答数（集計対象数）

（１）アンケート依頼送付施設数

9686 施設

返却・辞退の施設数

50 施設

（２）アンケート対象施設数

9636 施設

輸血業務・血液製剤年間使用量調査回答施設

4725 施設（49.03%）

内訳 Web 3684 施設（77.97%）

手書き 1041 施設（22.03%）

一般病床数別回収率

番号	発送時の病床数	発送数	回収数	回収率
1	0 床	2245	790	35.19%
2	1 床～19 床	1710	670	39.18%
3	20 床～99 床	2880	1374	47.71%
4	100 床～199 床	1437	845	58.80%
5	200 床～299 床	560	363	64.82%
6	300 床～399 床	351	268	76.35%
7	400 床～499 床	206	165	80.10%
8	500 床～599 床	116	93	80.17%
9	600 床～699 床	79	72	91.14%
10	700 床～799 床	40	27	67.50%
11	800 床～899 床	25	23	92.00%
12	900 床～999 床	14	14	100.00%
13	1000 床以上	23	21	91.30%
14	全体	9686(※1)	4725	48.78%(※2)

（※1）返却・辞退の施設数も含んでいます。

（※2）発送数に返却・辞退の施設数を含んでいるため、集計対象数の回収率とは若干異なります。

【1】 輸血業務・血液製剤年間使用量基本調査

【1】 基本項目

1-1) 医療機関の概要について

1-1. 病床数を記入して下さい

【一般病床数(必須)】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	878	18.58%
2	1 床～19 床	689	14.58%
3	20 床～99 床	1432	30.31%
4	100 床～199 床	738	15.62%
5	200 床～299 床	321	6.79%
6	300 床～399 床	253	5.35%
7	400 床～499 床	169	3.58%
8	500 床～599 床	94	1.99%
9	600 床～699 床	71	1.50%
10	700 床～799 床	25	0.53%
11	800 床～899 床	24	0.51%
12	900 床～999 床	11	0.23%
13	1000 床以上	20	0.42%
	回答施設合計	4725	

【療養病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1683	55.45%
2	1 床～19 床	102	3.36%
3	20 床～99 床	963	31.73%
4	100 床～199 床	223	7.35%
5	200 床～299 床	41	1.35%
6	300 床～399 床	16	0.53%
7	400 床～499 床	0	0.00%
8	500 床～599 床	3	0.10%
9	600 床～699 床	1	0.03%
10	700 床～799 床	2	0.07%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	1	0.03%
	回答施設合計	3035	

【精神病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	2285	89.01%
2	1 床～19 床	17	0.66%
3	20 床～99 床	150	5.84%
4	100 床～199 床	46	1.79%
5	200 床～299 床	33	1.29%
6	300 床～399 床	21	0.82%
7	400 床～499 床	5	0.19%
8	500 床～599 床	2	0.08%
9	600 床～699 床	3	0.12%
10	700 床～799 床	3	0.12%
11	800 床～899 床	2	0.08%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2567	

【感染症病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	2330	89.51%
2	1 床～19 床	238	9.14%
3	20 床～99 床	34	1.31%
4	100 床～199 床	0	0.00%
5	200 床～299 床	0	0.00%
6	300 床～399 床	0	0.00%
7	400 床～499 床	1	0.04%
8	500 床～599 床	0	0.00%
9	600 床～699 床	0	0.00%
10	700 床～799 床	0	0.00%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2603	

【その他病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	2154	79.84%
2	1 床～19 床	106	3.93%
3	20 床～99 床	363	13.45%
4	100 床～199 床	61	2.26%
5	200 床～299 床	11	0.41%
6	300 床～399 床	1	0.04%
7	400 床～499 床	0	0.00%
8	500 床～599 床	1	0.04%
9	600 床～699 床	0	0.00%
10	700 床～799 床	0	0.00%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	1	0.04%
	回答施設合計	2698	

1-2. 貴施設の種類のどれに該当しますか(必須入力)

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域医療支援病院	10	1.14%	264	8.30%	213	50.47%	136	55.51%	623	13.19%
2	特定機能病院	5	0.57%	38	1.19%	26	6.16%	108	44.08%	177	3.75%
3	臨床研究中核病院	1	0.11%	6	0.19%	5	1.18%	23	9.39%	35	0.74%
4	一般病院	240	27.33%	2166	68.11%	204	48.34%	45	18.37%	2655	56.19%
5	診療所	504	57.40%	673	21.16%	0	0.00%	0	0.00%	1177	24.91%
6	その他	130	14.81%	152	4.78%	29	6.87%	13	5.31%	324	6.86%
	回答施設合計	878		3180		422		245		4725	

1-3. 貴施設の診療科について

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	心臓血管外科	9	1.05%	274	8.66%	194	46.08%	223	91.77%	700	14.94%
2	消化器外科	59	6.88%	986	31.15%	285	67.70%	212	87.24%	1542	32.91%
3	脳神経外科	37	4.32%	881	27.84%	353	83.85%	240	98.77%	1511	32.24%
4	呼吸器外科	5	0.58%	219	6.92%	244	57.96%	218	89.71%	686	14.64%
5	整形外科	180	21.00%	2009	63.48%	401	95.25%	240	98.77%	2830	60.39%
6	産婦人科	13	1.52%	716	22.62%	334	79.33%	238	97.94%	1301	27.76%
7	皮膚科・形成外科	79	9.22%	1105	34.91%	377	89.55%	240	98.77%	1801	38.43%
8	泌尿器科	147	17.15%	1211	38.26%	389	92.40%	240	98.77%	1987	42.40%
9	その他の外科	102	11.90%	1116	35.26%	272	64.61%	196	80.66%	1686	35.98%
10	血液内科	27	3.15%	375	11.85%	245	58.19%	219	90.12%	866	18.48%
11	循環器内科	200	23.34%	1659	52.42%	395	93.82%	240	98.77%	2494	53.22%
12	消化器内科	205	23.92%	1536	48.53%	377	89.55%	240	98.77%	2358	50.32%
13	呼吸器内科	102	11.90%	1121	35.42%	359	85.27%	233	95.88%	1815	38.73%
14	腎臓内科	269	31.39%	818	25.85%	276	65.56%	217	89.30%	1580	33.72%
15	神経内科	61	7.12%	839	26.51%	309	73.40%	224	92.18%	1433	30.58%
16	膠原病リウマチ科	22	2.57%	406	12.83%	178	42.28%	184	75.72%	790	16.86%
17	内分泌代謝科	59	6.88%	591	18.67%	241	57.24%	205	84.36%	1096	23.39%
18	その他の内科	385	44.92%	1387	43.82%	229	54.39%	164	67.49%	2165	46.20%
19	精神科・心療内科	96	11.20%	389	12.29%	217	51.54%	212	87.24%	914	19.50%
20	小児科	56	6.53%	839	26.51%	356	84.56%	233	95.88%	1484	31.67%
21	腫瘍治療科	3	0.35%	55	1.74%	80	19.00%	120	49.38%	258	5.51%
22	救急科	3	0.35%	336	10.62%	274	65.08%	219	90.12%	832	17.76%
23	歯科・口腔外科	38	4.43%	415	13.11%	243	57.72%	222	91.36%	918	19.59%
24	その他の診療科	137	15.99%	633	20.00%	170	40.38%	165	67.90%	1105	23.58%
	回答施設合計	857		3165		421		243		4686	

1-4. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、全麻手術を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	13	1.54%	1645	52.89%	389	94.19%	240	99.59%	2287	49.65%
2	いいえ	813	96.56%	1392	44.76%	9	2.18%	0	0.00%	2214	48.07%
3	わからない	16	1.90%	73	2.35%	15	3.63%	1	0.41%	105	2.28%
	回答施設合計	842		3110		413		241		4606	

全麻手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	11	1	328	59.91	659	94.40
1～299 床	1397	1	3995	368.00	514099	475.81
300～499 床	290	12	4858	1722.41	499500	923.24
500 床以上	187	23	13132	4071.44	761360	1874.10
全体	1885	1	13132	941.97	1775618	1399.99

1-5. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、心臓・大血管手術を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.12%	114	3.65%	154	37.84%	218	89.71%	487	10.55%
2	いいえ	830	98.22%	2964	95.00%	244	59.95%	24	9.88%	4062	88.02%
3	わからない	14	1.66%	42	1.35%	9	2.21%	1	0.41%	66	1.43%
	回答施設合計	845		3120		407		243		4615	

心臓・大血管手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	1	2	2	2.00	2	
1～299 床	99	1	723	116.38	11522	138.28
300～499 床	112	1	963	160.96	18028	159.37
500 床以上	172	16	3062	324.26	55772	392.06
全体	384	1	3062	222.20	85324	299.46

1-6. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、帝王切開を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	3	0.36%	363	11.68%	244	59.22%	218	91.21%	828	18.00%
2	いいえ	825	97.98%	2717	87.42%	150	36.41%	18	7.53%	3710	80.63%
3	わからない	14	1.66%	28	0.90%	18	4.37%	3	1.26%	63	1.37%
	回答施設合計	842		3108		412		239		4601	

帝王切開件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	3	60	122	97.67	293	33.08
1～299 床	304	1	1069	83.51	25388	98.75
300～499 床	174	3	451	112.64	19600	88.12
500 床以上	159	6	1051	198.72	31596	137.95
全体	640	1	1069	120.12	76877	116.73

1-7. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、造血幹細胞移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.00%	23	0.74%	79	19.17%	169	70.42%	271	5.88%
2	いいえ	827	98.45%	3070	98.52%	329	79.85%	69	28.75%	4295	93.21%
3	わからない	13	1.55%	23	0.74%	4	0.97%	2	0.83%	42	0.91%
	回答施設合計	840		3116		412		240		4608	

造血幹細胞移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床						
1～299 床	20	1	78	9.25	185	17.09
300～499 床	65	1	77	10.42	677	14.00
500 床以上	150	1	177	25.25	3788	25.64
全体	235	1	177	19.79	4650	23.43

1-8. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、臓器(腎・肝・心・膵)移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	8	0.96%	60	1.94%	18	4.42%	94	39.00%	180	3.93%
2	いいえ	815	97.37%	3014	97.29%	385	94.59%	141	58.51%	4355	95.03%
3	わからない	14	1.67%	24	0.77%	4	0.98%	6	2.49%	48	1.05%
	回答施設合計	837		3098		407		241		4583	

1-9. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、腎臓移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	5	62.50%	34	60.71%	17	94.44%	87	94.57%	143	82.18%
2	いいえ	2	25.00%	22	39.29%	1	5.56%	5	5.43%	30	17.24%
3	わからない	1	12.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.57%
	回答施設合計	8		56		18		92		174	

腎臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床						
1～299 床	12	1	30	10.25	123	11.13
300～499 床	15	1	29	8.73	131	9.40
500 床以上	72	1	108	14.90	1073	17.19
全体	99	1	108	13.40	1327	15.71

1-10. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、肝臓移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	5	62.50%	17	30.36%	1	5.56%	28	30.11%	51	29.14%
2	いいえ	2	25.00%	38	67.86%	17	94.44%	65	69.89%	122	69.71%
3	わからない	1	12.50%	1	1.79%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.14%
	回答施設合計	8		56		18		93		175	

肝臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床						
1～299 床						
300～499 床						
500 床以上	23	1	49	13.83	318	14.35
全体	23	1	49	13.83	318	14.35

1-11. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、心臓移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	5	62.50%	17	29.82%	0	0.00%	11	11.83%	33	18.86%
2	いいえ	2	25.00%	39	68.42%	17	100.00%	82	88.17%	140	80.00%
3	わからない	1	12.50%	1	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.14%
	回答施設合計	8		57		17		93		175	

心臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床						
1～299 床						
300～499 床						
500 床以上	8	1	18	7.00	56	7.13
全体	8	1	18	7.00	56	7.13

1-12. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、膵臓移植を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	5	62.50%	18	31.03%	0	0.00%	12	13.19%	35	20.00%
2	いいえ	2	25.00%	39	67.24%	18	100.00%	79	86.81%	138	78.86%
3	わからない	1	12.50%	1	1.72%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.14%
	回答施設合計	8		58		18		91		175	

膵臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床						
1～299 床						
300～499 床						
500 床以上	8	1	22	5.50	44	7.29
全体	8	1	22	5.50	44	7.29

1-13. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、血漿交換を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	4	0.50%	131	4.53%	225	57.25%	221	92.08%	581	13.43%
2	いいえ	782	97.75%	2723	94.09%	163	41.48%	18	7.50%	3686	85.19%
3	わからない	14	1.75%	40	1.38%	5	1.27%	1	0.42%	60	1.39%
	回答施設合計	800		2894		393		240		4327	

血漿交換件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	3	1	8	5.33	16	3.79
1～299 床	114	1	700	18.09	2062	73.15
300～499 床	194	1	220	12.09	2345	21.27
500 床以上	185	1	357	57.57	10650	68.42
全体	496	1	700	30.39	15073	59.87

1-14. 救急医療の体制について

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	一次救急指定病院	13	1.60%	311	10.12%	14	3.37%	9	3.70%	347	7.63%
2	二次救急指定病院	18	2.21%	1404	45.69%	325	78.13%	86	35.39%	1833	40.33%
3	三次救急指定病院	3	0.37%	36	1.17%	57	13.70%	148	60.91%	244	5.37%
4	救命救急センター	0	0.00%	4	0.13%	39	9.38%	60	24.69%	103	2.27%
5	高度救命救急センター	0	0.00%	0	0.00%	1	0.24%	42	17.28%	43	0.95%
6	救急指定病院ではない	781	96.06%	1365	44.42%	25	6.01%	6	2.47%	2177	47.90%
	回答施設合計	813		3073		416		243		4545	

1-15. 輸血管理料および加算の取得の有無について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血管理料Ⅰと輸血適正使用加算を取得している	5	0.64%	74	2.48%	180	43.48%	144	59.50%	403	9.12%
2	輸血管理料Ⅰのみ取得している	3	0.39%	41	1.37%	28	6.76%	50	20.66%	122	2.76%
3	輸血管理料Ⅱと輸血適正使用加算を取得している	11	1.41%	673	22.57%	101	24.40%	17	7.02%	802	18.16%
4	輸血管理料Ⅱのみ取得している	9	1.16%	328	11.00%	85	20.53%	27	11.16%	449	10.17%
5	取得していない	751	96.41%	1866	62.58%	20	4.83%	4	1.65%	2641	59.79%
	回答施設合計	779		2982		414		242		4417	

1-16. オーダリングシステムを導入していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	85	10.20%	1244	39.71%	389	92.62%	240	98.77%	1958	42.30%
2	導入していない	748	89.80%	1889	60.29%	31	7.38%	3	1.23%	2671	57.70%
	回答施設合計	833		3133		420		243		4629	

1-17. 問 1-16 で「(1) 導入している」を選択した施設にお尋ねします。輸血業務でオーダーリングシステムを利用している対象は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	63	82.89%	1139	92.90%	381	98.96%	239	99.58%	1822	94.55%
2	日赤血液製剤輸血	48	63.16%	961	78.38%	366	95.06%	237	98.75%	1612	83.65%
3	貯血式自己血製剤貯血	1	1.32%	505	41.19%	339	88.05%	232	96.67%	1077	55.89%
4	貯血式自己血製剤輸血	4	5.26%	497	40.54%	341	88.57%	230	95.83%	1072	55.63%
5	希釈式自己血製剤輸血	0	0.00%	15	1.22%	28	7.27%	36	15.00%	79	4.10%
6	回収式自己血製剤輸血	0	0.00%	29	2.37%	23	5.97%	20	8.33%	72	3.74%
7	院内成分採血製剤（末梢血幹細胞 等）	0	0.00%	11	0.90%	34	8.83%	101	42.08%	146	7.58%
8	院内調製血（分割製剤 等）	0	0.00%	10	0.82%	19	4.94%	91	37.92%	120	6.23%
9	輸血副作用	7	9.21%	482	39.31%	302	78.44%	208	86.67%	999	51.84%
10	細胞治療（再生医療等製品）	0	0.00%	4	0.33%	5	1.30%	53	22.08%	62	3.22%
11	ベッドサイドで患者と製剤の認証	11	14.47%	615	50.16%	315	81.82%	218	90.83%	1159	60.15%
12	その他	6	7.89%	30	2.45%	4	1.04%	17	7.08%	57	2.96%
	回答施設合計	76		1226		385		240		1927	

1-18. 問 1-16 で「(1) 導入している」を選択した施設にお尋ねします。血漿分画製剤業務でオーダーリングシステムを利用している対象は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤（アルブミン製剤）	44	73.33%	930	87.32%	308	91.67%	211	96.79%	1493	88.92%
2	血漿分画製剤（アルブミン製剤以外）	17	28.33%	697	65.45%	219	65.18%	131	60.09%	1064	63.37%
3	血漿分画製剤投与後の副作用	2	3.33%	175	16.43%	117	34.82%	113	51.83%	407	24.24%
4	ベッドサイドで患者と製剤の認証	9	15.00%	433	40.66%	198	58.93%	164	75.23%	804	47.89%
5	細胞治療（再生医療等製品）	0	0.00%	0	0.00%	5	1.49%	48	22.02%	53	3.16%
6	その他	12	20.00%	59	5.54%	7	2.08%	4	1.83%	82	4.88%
	回答施設合計	60		1065		336		218		1679	

1-19. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を導入していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	40	4.86%	1046	33.70%	402	96.40%	241	99.18%	1729	37.69%
2	導入していない	783	95.14%	2058	66.30%	15	3.60%	2	0.82%	2858	62.31%
	回答施設合計	823		3104		417		243		4587	

1-20. 問 1-19 で「(1)導入している」を選択した施設にお尋ねします。システムを利用している範囲は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	32	94.12%	948	94.33%	396	99.00%	241	100.00%	1617	96.25%
2	日赤血液製剤入庫	13	38.24%	740	73.63%	390	97.50%	239	99.17%	1382	82.26%
3	日赤血液製剤輸血	18	52.94%	773	76.92%	383	95.75%	236	97.93%	1410	83.93%
4	貯血式自己血製剤貯血	4	11.76%	493	49.05%	362	90.50%	236	97.93%	1095	65.18%
5	貯血式自己血製剤輸血	2	5.88%	475	47.26%	348	87.00%	232	96.27%	1057	62.92%
6	希釈式自己血製剤輸血	0	0.00%	22	2.19%	25	6.25%	35	14.52%	82	4.88%
7	回収式自己血製剤輸血	0	0.00%	26	2.59%	34	8.50%	19	7.88%	79	4.70%
8	院内成分採血製剤（末梢血幹細胞 等）	0	0.00%	12	1.19%	38	9.50%	111	46.06%	161	9.58%
9	院内調製血（分割製剤 等）	0	0.00%	12	1.19%	23	5.75%	101	41.91%	136	8.10%
10	輸血副作用	7	20.59%	548	54.53%	329	82.25%	217	90.04%	1101	65.54%
11	細胞治療（再生医療等製品）	1	2.94%	9	0.90%	10	2.50%	54	22.41%	74	4.40%
12	ベッドサイドで患者と製剤の認証	6	17.65%	352	35.02%	184	46.00%	142	58.92%	684	40.71%
13	輸血手帳	0	0.00%	6	0.60%	2	0.50%	9	3.73%	17	1.01%
14	その他	1	2.94%	23	2.29%	14	3.50%	16	6.64%	54	3.21%
	回答施設合計	34		1005		400		241		1680	

1-21. 輸血業務の部門システムで容易に検索できる受血者（輸血を受ける患者）の情報は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	年齢	36	92.31%	894	86.80%	368	92.23%	225	93.36%	1523	89.12%
2	性別	37	94.87%	931	90.39%	384	96.24%	229	95.02%	1581	92.51%
3	血液型	35	89.74%	989	96.02%	390	97.74%	234	97.10%	1648	96.43%
4	不規則抗体の有無	26	66.67%	811	78.74%	378	94.74%	232	96.27%	1447	84.67%
5	診療科	26	66.67%	865	83.98%	369	92.48%	235	97.51%	1495	87.48%
6	入院・外来の別	25	64.10%	861	83.59%	332	83.21%	200	82.99%	1418	82.97%
7	輸血場所・部門	12	30.77%	535	51.94%	294	73.68%	206	85.48%	1047	61.26%
8	疾患名	10	25.64%	160	15.53%	63	15.79%	45	18.67%	278	16.27%
9	手術術式	0	0.00%	120	11.65%	84	21.05%	51	21.16%	255	14.92%
10	使用した血液製剤の種類	23	58.97%	844	81.94%	379	94.99%	235	97.51%	1481	86.66%
11	使用した血液製剤の量（単位）	22	56.41%	819	79.51%	376	94.24%	232	96.27%	1449	84.79%
12	輸血目的（理由）	8	20.51%	218	21.17%	127	31.83%	73	30.29%	426	24.93%
13	廃棄した血液製剤の量（単位）	10	25.64%	595	57.77%	315	78.95%	200	82.99%	1120	65.54%
14	廃棄理由	5	12.82%	368	35.73%	239	59.90%	160	66.39%	772	45.17%
15	輸血関連有害事象の有無	5	12.82%	308	29.90%	230	57.64%	173	71.78%	716	41.90%
16	輸血関連有害事象の種類	3	7.69%	235	22.82%	190	47.62%	154	63.90%	582	34.06%
	回答施設合計	39		1030		399		241		1709	

1-22. 血漿分画製剤管理業務に部門システム（検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム）を導入していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	10	1.22%	414	13.63%	226	57.51%	191	79.92%	841	18.73%
2	導入していない	811	98.78%	2624	86.37%	167	42.49%	48	20.08%	3650	81.27%
	回答施設合計	821		3038		393		239		4491	

1-23. 問 1-22 で「(1)導入している」を選択した施設にお尋ねします。システムを利用している範囲は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤（アルブミン製剤）	8	88.89%	377	91.28%	210	92.92%	187	97.91%	782	93.21%
2	血漿分画製剤（アルブミン製剤以外）	6	66.67%	282	68.28%	108	47.79%	86	45.03%	482	57.45%
3	血漿分画製剤投与後の副作用	2	22.22%	101	24.46%	97	42.92%	110	57.59%	310	36.95%
4	細胞治療（再生医療等製品）	0	0.00%	3	0.73%	3	1.33%	39	20.42%	45	5.36%
5	ベッドサイドで患者と製剤の認証	3	33.33%	135	32.69%	93	41.15%	103	53.93%	334	39.81%
6	その他	0	0.00%	5	1.21%	4	1.77%	2	1.05%	11	1.31%
	回答施設合計	9		413		226		191		839	

1-2) 血液製剤の納入状況について

1-24. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血用血液製剤(全血製剤、赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	796	94.31%	3066	97.46%	418	100.00%	243	100.00%	4523	97.25%
2	導入していない	48	5.69%	80	2.54%	0	0.00%	0	0.00%	128	2.75%
	回答施設合計	844		3146		418		243		4651	

1-25. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	58	7.49%	867	28.76%	395	94.50%	230	96.64%	1550	34.87%
2	システムを使用していないので手作業	716	92.51%	2148	71.24%	23	5.50%	8	3.36%	2895	65.13%
	回答施設合計	774		3015		418		238		4445	

1-26. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で全血製剤(人全血液・LR、照射人全血液・LR)を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	62	8.02%	104	3.44%	2	0.48%	2	0.82%	170	3.82%
2	購入していない	711	91.98%	2915	96.56%	413	99.52%	241	99.18%	4280	96.18%
	回答施設合計	773		3019		415		243		4450	

1-27. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した全血製剤(人全血液・LR、照射人全血液・LR)の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人全血液(人全血液・LR-1、照射人全血液・LR-1 製剤)袋(本)	0 床	17	1	32	7.41	126	7.79
	1～299 床	24	1	74	10.54	253	16.04
	300～499 床	1	121	121	121.00	121	
	500 床以上						
	全体	42	1	121	11.90	500	21.63
(2) 人全血液(人全血液・LR-2、照射人全血液・LR-2 製剤)袋(本)	0 床	36	1	127	14.97	539	24.76
	1～299 床	58	1	246	31.67	1837	44.09
	300～499 床	1	1338	1338	1338.00	1338	
	500 床以上						
	全体	95	1	1338	39.09	3714	140.04

【特別集計：全血製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
全血製剤購入／袋(本)	0 床	47	1	137	14.15	665	24.47
	1～299 床	65	1	273	32.15	2090	48.60
	300～499 床	1	1459	1459	1459.00	1459	
	500 床以上						
	全体	113	1	1459	37.29	4214	141.01
全血製剤購入／単位	0 床	47	2	264	25.62	1204	46.67
	1～299 床	65	2	519	60.42	3927	90.91
	300～499 床	1	2797	2797	2797.00	2797	
	500 床以上						
	全体	113	2	2797	70.16	7928	269.99

1-28. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球製剤を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	745	95.27%	2950	97.17%	417	100.00%	240	99.59%	4352	97.23%
2	購入していない	37	4.73%	86	2.83%	0	0.00%	1	0.41%	124	2.77%
	回答施設合計	782		3036		417		241		4476	

1-29. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	266	1	124	9.34	2484	14.58
	1～299 床	1540	1	1626	29.99	46185	80.99
	300～499 床	279	1	869	45.63	12732	111.42
	500 床以上	211	1	1310	112.40	23717	189.09
	全体	2296	1	1626	37.07	85118	99.26
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	615	1	534	25.62	15755	45.63
	1～299 床	2703	1	5203	207.50	560878	323.73
	300～499 床	403	1	7416	1548.91	624211	991.29
	500 床以上	234	102	11752	4438.23	1038545	2107.41
	全体	3955	1	11752	566.22	2239389	1246.06
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	23	1	52	7.39	170	13.97
	1～299 床	62	1	117	10.89	675	18.40
	300～499 床	4	1	130	36.50	146	62.44
	500 床以上	8	1	74	15.75	126	24.80
	全体	97	1	130	11.52	1117	21.41
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	39	1	114	15.41	601	23.29
	1～299 床	177	1	1359	64.02	11331	147.26
	300～499 床	57	1	1876	65.68	3744	278.72
	500 床以上	87	1	2344	56.36	4903	274.83
	全体	360	1	2344	57.16	20579	202.79

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1 製剤)／袋(本)	0 床	1	5	5	5.00	5	
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	3	2	5	3.00	9	1.73
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2 製剤)／袋(本)	0 床	2	2	4	3.00	6	1.41
	1～299 床	12	1	141	27.92	335	49.48
	300～499 床	5	1	6	2.60	13	2.07
	500 床以上	5	2	8	4.60	23	2.61
	全体	24	1	141	15.71	377	36.45
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1 製剤／袋(本)	0 床	1	9	9	9.00	9	
	1～299 床						
	300～499 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	6	1	9	2.33	14	3.27
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2 製剤／袋(本)	0 床	3	1	11	5.67	17	5.03
	1～299 床						
	300～499 床	5	1	8	2.40	12	3.13
	500 床以上	13	1	6	2.31	30	1.38
	全体	21	1	11	2.81	59	2.66

【特別集計：赤血球製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0 床	726	1	584	26.24	19047	46.76
	1～299 床	2896	1	5271	213.88	619406	333.17
	300～499 床	410	1	7416	1563.08	640862	1006.40
	500 床以上	236	14	11761	4522.66	1067347	2213.90
	全体	4268	1	11761	549.83	2346662	1239.98
赤血球製剤総単位数	0 床	726	1	1118	48.80	35426	89.36
	1～299 床	2896	1	10475	411.58	1191950	647.88
	300～499 床	410	2	14832	3094.74	1268842	2001.29
	500 床以上	236	28	23514	8944.27	2110848	4346.77
	全体	4268	1	23514	1079.44	4607066	2450.60

1-30. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血小板製剤を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	89	11.51%	1557	51.40%	407	97.84%	242	100.00%	2295	51.46%
2	購入していない	684	88.49%	1472	48.60%	9	2.16%	0	0.00%	2165	48.54%
	回答施設合計	773		3029		416		242		4460	

1-31. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	5	1	7	2.60	13	2.61
	1～299 床	12	1	30	6.17	74	8.88
	300～499 床	4	1	19	7.25	29	8.50
	500 床以上	7	1	9	5.43	38	3.51
	全体	28	1	30	5.50	154	6.79
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	4	1	20	12.00	48	8.45
	1～299 床	16	1	193	31.56	505	58.57
	300～499 床	5	1	91	22.00	110	39.12
	500 床以上	8	1	23	5.25	42	7.46
	全体	33	1	193	21.36	705	44.11

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤)袋(本)	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	181	1	248	4.92	890	19.62
	300～499 床	159	1	342	8.19	1303	28.63
	500 床以上	179	1	629	32.88	5886	77.63
	全体	521	1	629	15.51	8081	51.04
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤)袋(本)	0 床	61	1	73	7.77	474	10.72
	1～299 床	1410	1	4498	45.65	64367	176.89
	300～499 床	400	1	3607	340.29	136117	444.64
	500 床以上	237	17	14086	1495.13	354345	1404.09
	全体	2108	1	14086	263.43	555303	696.12
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)袋(本)	0 床	11	1	5	1.64	18	1.21
	1～299 床	296	1	516	10.74	3178	50.47
	300～499 床	222	1	372	19.26	4275	37.15
	500 床以上	177	1	2445	85.00	15045	234.80
	全体	706	1	2445	31.89	22516	127.37
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)袋(本)	0 床	20	1	108	10.20	204	25.52
	1～299 床	482	1	399	14.24	6863	38.09
	300～499 床	255	1	1147	49.65	12661	119.46
	500 床以上	180	1	1007	105.75	19035	159.77
	全体	937	1	1147	41.37	38763	103.58
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	54	1	78	15.80	853	19.03
	300～499 床	87	1	240	31.60	2749	39.28
	500 床以上	150	1	559	54.30	8145	73.38
	全体	291	1	559	40.37	11747	59.38
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	14	1	67	12.43	174	18.73
	300～499 床	54	1	32	5.26	284	6.43
	500 床以上	86	1	73	5.17	445	8.54
	全体	154	1	73	5.86	903	9.43

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)袋(本)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	13	1	292	28.77	374	79.75
	300～499 床	26	1	46	12.08	314	15.51
	500 床以上	44	1	277	21.05	926	45.94
	全体	84	1	292	19.23	1615	46.06
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・LR-10 製剤)袋(本)	0 床	2	13	26	19.50	39	9.19
	1～299 床	44	1	415	44.84	1973	84.15
	300～499 床	56	1	232	34.02	1905	43.20
	500 床以上	100	1	370	55.46	5546	80.97
	全体	202	1	415	46.85	9463	73.12
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	9	1	45	16.00	144	15.98
	300～499 床	14	1	47	14.64	205	15.02
	500 床以上	31	1	43	9.58	297	11.42
	全体	54	1	47	11.96	646	13.26

【特別集計：血小板製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0 床	82	1	138	9.74	799	18.16
	1～299 床	1530	1	5652	51.89	79395	207.56
	300～499 床	401	1	4006	398.88	159952	492.94
	500 床以上	237	20	14719	1728.90	409750	1523.70
	全体	2250	1	14719	288.84	649896	760.18
血小板製剤総単位数	0 床	82	1	2460	117.30	9619	300.19
	1～299 床	1530	1	62400	571.19	873924	2259.76
	300～499 床	401	10	40245	4350.15	1744409	5320.30
	500 床以上	237	230	146880	18331.02	4344452	15769.54
	全体	2250	1	146880	3098.85	6972404	8000.28

1-32. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血漿製剤を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	34	4.39%	1325	43.86%	400	96.15%	241	100.00%	2000	44.92%
2	購入していない	740	95.61%	1696	56.14%	16	3.85%	0	0.00%	2452	55.08%
	回答施設合計	774		3021		416		241		4452	

1-33. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120 製剤) 袋(本)	0 床	6	1	8	2.67	16	2.73
	1～299 床	222	1	582	16.16	3587	61.18
	300～499 床	87	1	450	21.66	1884	68.92
	500 床以上	140	1	2035	81.69	11437	216.61
	全体	455	1	2035	37.20	16924	134.08
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240 製剤) 袋(本)	0 床	22	1	78	9.77	215	17.45
	1～299 床	1173	1	1921	60.80	71318	160.92
	300～499 床	380	1	4824	373.71	142010	491.07
	500 床以上	233	2	8476	1377.26	320902	1371.92
	全体	1808	1	8476	295.60	534445	705.66
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480 製剤) 袋(本)	0 床	8	1	942	119.75	958	332.24
	1～299 床	453	1	799	30.04	13608	69.24
	300～499 床	268	1	1681	115.34	30911	201.14
	500 床以上	217	2	5066	511.85	111072	697.00
	全体	946	1	5066	165.49	156549	403.31

【特別集計：血漿製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤 総袋(本)数	0 床	27	1	942	44.04	1189	180.19
	1～299 床	1295	1	1990	68.35	88513	167.11
	300～499 床	393	1	4824	444.80	174805	527.15
	500 床以上	237	61	10721	1870.93	443411	1590.05
	全体	1952	1	10721	362.66	707918	846.89
新鮮凍結血漿製剤 総単位数	0 床	27	2	3768	158.44	4278	722.12
	1～299 床	1295	1	4169	154.95	200655	367.08
	300～499 床	393	2	9648	1042.11	409548	1223.82
	500 床以上	237	159	21671	4630.92	1097529	3844.64
	全体	1952	1	21671	877.05	1712010	2062.95

1-3) 血液製剤の廃棄状況について

1-34. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血用血液製剤(全血製剤、赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	139	16.77%	1721	55.05%	409	98.08%	243	100.00%	2512	54.43%
2	廃棄していない	690	83.23%	1405	44.95%	8	1.92%	0	0.00%	2103	45.57%
	回答施設合計	829		3126		417		243		4615	

1-35. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	5	3.70%	621	36.51%	382	94.09%	229	97.03%	1237	49.92%
2	システムを使用していないので手作業	130	96.30%	1080	63.49%	24	5.91%	7	2.97%	1241	50.08%
	回答施設合計	135		1701		406		236		2478	

1-36. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で全血製剤(人全血液・LR、照射人全血液・LR)を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	11	8.40%	47	2.88%	4	1.04%	4	1.72%	66	2.77%
2	廃棄していない	120	91.60%	1587	97.12%	379	98.96%	229	98.28%	2315	97.23%
	回答施設合計	131		1634		383		233		2381	

1-37. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した全血製剤(人全血液・LR、照射人全血液・LR)の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人全血液(人全血液・LR-1、照射人全血液・LR-1 製剤)袋(本)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	5	1	5	2.20	11	1.64
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	7	1	5	1.86	13	1.46
(2) 人全血液(人全血液・LR-2、照射人全血液・LR-2 製剤)袋(本)	0 床	4	1	2	1.25	5	0.50
	1～299 床	26	1	12	2.54	66	2.37
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	30	1	12	2.37	71	2.25

【特別集計：全血製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
全血製剤廃棄／袋(本)	0 床	5	1	2	1.20	6	0.45
	1～299 床	29	1	12	2.66	77	2.64
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	35	1	12	2.40	84	2.46
全血製剤廃棄／単位	0 床	5	1	4	2.20	11	1.10
	1～299 床	29	1	24	4.93	143	4.91
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	35	1	24	4.43	155	4.61

1-38. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で全血製剤を廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床						
	1～299 床	17	1	12	3.29	56	3.26
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	17	1	12	3.29	56	3.26
(2) 破損	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 保管管理不良	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 転用ができない	0 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	1～299 床	6	1	3	1.50	9	0.84
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	9	1	3	1.44	13	0.73
(5) その他	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	5	1	2	1.20	6	0.45
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	7	1	2	1.14	8	0.38

1-39. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球製剤を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	127	93.38%	1643	96.31%	404	99.26%	242	99.59%	2416	96.95%
2	廃棄していない	9	6.62%	63	3.69%	3	0.74%	1	0.41%	76	3.05%
	回答施設合計	136		1706		407		243		2492	

1-40. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	24	1	25	2.83	68	4.85
	1～299 床	336	1	187	6.83	2295	17.49
	300～499 床	62	1	94	5.35	332	12.74
	500 床以上	48	1	27	3.79	182	4.77
	全体	470	1	187	6.12	2877	15.64
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	104	1	12	1.79	186	1.38
	1～299 床	1512	1	268	15.05	22760	25.63
	300～499 床	391	1	209	28.96	11323	26.87
	500 床以上	239	1	242	27.16	6492	28.82
	全体	2246	1	268	18.15	40761	26.53
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	10	1	4	1.90	19	1.20
	300～499 床	2	13	27	20.00	40	9.90
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	13	1	27	4.62	60	7.48
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	4	1	2	1.25	5	0.50
	1～299 床	56	1	83	7.25	406	13.79
	300～499 床	13	1	62	10.00	130	17.19
	500 床以上	20	1	12	3.05	61	3.24
	全体	93	1	83	6.47	602	12.66

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	300～499 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500 床以上	3	1	3	1.67	5	1.15
	全体	7	1	3	1.71	12	0.95
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1 製剤袋(本)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2 製剤袋(本)	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	4	2	2	2.00	8	0.00
	全体	6	1	2	1.67	10	0.52

【特別集計：赤血球製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤廃棄 総袋(本)数	0 床	124	1	25	2.09	259	2.49
	1～299 床	1618	1	268	15.75	25485	27.49
	300～499 床	399	1	209	29.65	11830	27.85
	500 床以上	240	1	242	28.13	6750	29.36
	全体	2381	1	268	18.62	44324	27.92
赤血球製剤廃棄 総単位数	0 床	124	1	25	3.63	450	3.27
	1～299 床	1618	1	536	30.07	48655	51.96
	300～499 床	399	1	418	58.37	23288	54.40
	500 床以上	240	2	484	55.48	13316	58.16
	全体	2381	1	536	36.00	85709	53.57

1-41. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球製剤を廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床	41	1	12	2.02	83	1.98
	1～299 床	1244	1	263	17.56	21849	29.21
	300～499 床	378	1	209	26.40	9979	26.35
	500 床以上	204	1	232	21.30	4346	28.52
	全体	1867	1	263	19.42	36257	28.57
(2) 破損	0 床	4	1	2	1.50	6	0.58
	1～299 床	76	1	10	1.37	104	1.33
	300～499 床	88	1	7	1.55	136	1.03
	500 床以上	99	1	7	2.17	215	1.48
	全体	267	1	10	1.73	461	1.33
(3) 保管管理不良	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	126	1	9	1.74	219	1.38
	300～499 床	126	1	12	2.87	362	2.31
	500 床以上	147	1	42	4.67	687	5.50
	全体	400	1	42	3.17	1269	3.85

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 転用ができない	0 床	53	1	4	1.57	83	0.97
	1～299 床	388	1	82	6.10	2368	11.13
	300～499 床	109	1	78	6.92	754	11.25
	500 床以上	97	1	67	7.54	731	11.90
	全体	647	1	82	6.08	3936	10.89
(2) 破損	0 床	32	1	25	2.25	72	4.24
	1～299 床	145	1	36	1.90	276	3.09
	300～499 床	85	1	62	3.27	278	7.00
	500 床以上	93	1	30	4.15	386	5.36
	全体	355	1	62	2.85	1012	5.04

1-42. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血小板製剤を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	7	5.19%	191	11.41%	230	56.79%	207	85.54%	635	25.86%
2	廃棄していない	128	94.81%	1483	88.59%	175	43.21%	35	14.46%	1821	74.14%
	回答施設合計	135		1674		405		242		2456	

1-43. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	2	1	6	3.50	7	3.54
	300～499 床						
	500 床以上	1	4	4	4.00	4	
	全体	4	1	6	3.00	12	2.45
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	7	1	8	3.29	23	2.69
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	11	1	8	2.64	29	2.29

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	3	1	6	3.00	9	2.65
	300～499 床	5	1	4	1.80	9	1.30
	500 床以上	14	1	7	1.93	27	1.73
	全体	22	1	7	2.05	45	1.73
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤)袋(本)	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	154	1	13	1.63	251	1.62
	300～499 床	202	1	13	2.32	468	2.01
	500 床以上	197	1	70	4.95	976	6.48
	全体	555	1	70	3.06	1697	4.37
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	7	1	1	1.00	7	0.00
	300～499 床	14	1	3	1.14	16	0.53
	500 床以上	22	1	3	1.32	29	0.57
	全体	43	1	3	1.21	52	0.51
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	20	1	9	1.80	36	1.88
	300～499 床	43	1	5	1.56	67	0.93
	500 床以上	36	1	5	1.72	62	1.19
	全体	99	1	9	1.67	165	1.25
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	300～499 床	4	1	10	3.25	13	4.50
	500 床以上	9	1	4	1.44	13	1.01
	全体	16	1	10	1.81	29	2.32
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	7	1	2	1.14	8	0.38
	全体	10	1	2	1.10	11	0.32
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【特別集計：血小板製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤廃棄 総袋(本)数	0 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	1～299 床	182	1	14	1.87	340	2.07
	300～499 床	226	1	14	2.56	578	2.36
	500 床以上	204	1	70	5.51	1124	6.82
	全体	615	1	70	3.33	2045	4.60
血小板製剤廃棄 総単位数	0 床	3	1	10	7.00	21	5.20
	1～299 床	182	1	200	19.36	3523	23.31
	300～499 床	226	2	160	28.61	6466	26.81
	500 床以上	204	2	700	57.94	11820	69.81
	全体	615	1	700	35.50	21830	47.97

1-44. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血小板製剤を廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床						
	1～299 床	99	1	11	1.90	188	2.01
	300～499 床	110	1	14	2.25	247	2.05
	500 床以上	98	1	70	5.41	530	8.32
	全体	307	1	70	3.14	965	5.21
(2) 破損	0 床						
	1～299 床	7	1	2	1.14	8	0.38
	300～499 床	14	1	9	1.57	22	2.14
	500 床以上	25	1	4	1.24	31	0.66
	全体	46	1	9	1.33	61	1.27
(3) 保管管理不良	0 床						
	1～299 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	300～499 床	7	1	2	1.43	10	0.53
	500 床以上	18	1	10	1.94	35	2.26
	全体	27	1	10	1.78	48	1.87
(4) 転用ができない	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	58	1	4	1.31	76	0.68
	300～499 床	87	1	12	2.33	203	2.24
	500 床以上	99	1	16	3.68	364	3.26
	全体	245	1	16	2.63	644	2.65
(5) その他	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	29	1	3	1.24	36	0.58
	300～499 床	49	1	9	1.76	86	1.66
	500 床以上	58	1	8	2.10	122	1.46
	全体	138	1	9	1.78	246	1.43

1-45. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血漿製剤を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	4	2.99%	712	42.56%	370	91.58%	240	98.77%	1326	54.03%
2	廃棄していない	130	97.01%	961	57.44%	34	8.42%	3	1.23%	1128	45.97%
	回答施設合計	134		1673		404		243		2454	

1-46. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120 製剤)／袋(本)	0 床						
	1～299 床	58	1	65	5.60	325	9.51
	300～499 床	19	1	25	4.84	92	7.56
	500 床以上	44	1	16	3.32	146	3.66
	全体	121	1	65	4.65	563	7.58
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240 製剤)／袋(本)	0 床						
	1～299 床	593	1	58	6.98	4137	7.95
	300～499 床	336	1	59	10.14	3407	9.44
	500 床以上	208	1	67	14.09	2931	12.97
	全体	1137	1	67	9.21	10475	9.86
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480 製剤)／袋(本)	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	147	1	16	2.74	403	2.63
	300～499 床	101	1	20	3.90	394	3.50
	500 床以上	129	1	53	6.78	874	7.50
	全体	378	1	53	4.43	1675	5.30

【特別集計：血漿製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総袋(本)数	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	696	1	65	6.99	4865	8.23
	300～499 床	367	1	78	10.61	3893	10.01
	500 床以上	237	1	97	16.67	3951	15.71
	全体	1301	1	97	9.77	12713	11.06
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総単位数	0 床	1	16	16	16.00	16	
	1～299 床	696	1	116	14.67	10211	16.05
	300～499 床	367	2	131	23.11	8482	20.24
	500 床以上	237	2	252	40.10	9504	38.42
	全体	1301	1	252	21.69	28213	24.69

1-47. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血漿製剤を廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	589	1	65	6.79	3998	8.01
	300～499 床	295	1	78	9.06	2674	9.81
	500 床以上	139	1	50	6.39	888	7.47
	全体	1024	1	78	7.39	7564	8.56
(2) 破損	0 床						
	1～299 床	74	1	7	1.51	112	1.00
	300～499 床	106	1	16	1.75	186	1.79
	500 床以上	155	1	30	3.83	593	4.37
	全体	335	1	30	2.66	891	3.35
(3) 保管管理不良	0 床						
	1～299 床	28	1	8	2.18	61	1.85
	300～499 床	53	1	27	4.11	218	6.18
	500 床以上	93	1	36	3.72	346	4.71
	全体	174	1	36	3.59	625	4.92
(4) 転用ができない	0 床						
	1～299 床	121	1	22	2.98	361	3.38
	300～499 床	102	1	24	4.14	422	3.94
	500 床以上	115	1	47	8.77	1008	8.70
	全体	338	1	47	5.30	1791	6.39
(5) その他	0 床						
	1～299 床	39	1	27	2.33	91	4.26
	300～499 床	75	1	12	2.60	195	2.37
	500 床以上	106	1	40	6.44	683	6.30
	全体	220	1	40	4.40	969	5.29

1-4) 血漿分画製剤の購入状況について

1-48. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	183	22.00%	2080	68.17%	384	97.71%	234	98.73%	2881	63.84%
2	購入していない	649	78.00%	971	31.83%	9	2.29%	3	1.27%	1632	36.16%
	回答施設合計	832		3051		393		237		4513	

1-49. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	16	9.30%	775	38.25%	311	83.83%	214	95.11%	1316	47.10%
2	システムを使用していないので手作業	156	90.70%	1251	61.75%	60	16.17%	11	4.89%	1478	52.90%
	回答施設合計	172		2026		371		225		2794	

1-50. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、)を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	160	89.89%	1958	95.61%	377	100.00%	229	100.00%	2724	96.19%
2	購入していない	18	10.11%	90	4.39%	0	0.00%	0	0.00%	108	3.81%
	回答施設合計	178		2048		377		229		2832	

1-51. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0 床	4	6	36	17.25	69	14.03
	1～299 床	28	1	550	78.36	2194	128.80
	300～499 床	11	2	1000	217.64	2394	307.91
	500 床以上	15	2	395	109.20	1638	134.08
	全体	58	1	1000	108.53	6295	179.57
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0 床	8	2	41	19.63	157	14.72
	1～299 床	606	1	1400	79.86	48398	141.97
	300～499 床	284	2	4167	434.41	123373	531.19
	500 床以上	214	12	7740	1428.92	305789	1373.93
	全体	1112	1	7740	429.60	477717	839.67
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0 床	3	2	3	2.33	7	0.58
	1～299 床	18	2	660	197.06	3547	253.53
	300～499 床	10	2	450	116.20	1162	154.40
	500 床以上	35	1	900	85.00	2975	167.24
	全体	66	1	900	116.53	7691	194.10
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0 床	25	1	399	32.72	818	80.57
	1～299 床	430	1	2881	173.05	74413	277.82
	300～499 床	126	10	3100	723.74	91191	645.55
	500 床以上	90	4	7959	1380.40	124236	1445.08
	全体	671	1	7959	433.17	290658	768.51
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0 床	6	2	94	31.83	191	32.13
	1～299 床	41	1	859	127.49	5227	192.79
	300～499 床	12	2	1220	235.17	2822	383.58
	500 床以上	21	3	2530	312.14	6555	625.77
	全体	80	1	2530	184.94	14795	382.99
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0 床	116	1	399	37.16	4311	61.34
	1～299 床	1398	1	2251	140.60	196563	216.93
	300～499 床	240	4	7046	743.88	178530	766.27
	500 床以上	164	4	12090	1750.46	287076	1461.82
	全体	1918	1	12090	347.49	666480	717.30

【特別集計：アルブミン製剤購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）	0 床	12	25.0	512.5	192.29	2307.5	170.32
	1～299 床	629	5.0	17500.0	979.24	615945.0	1757.00
	300～499 床	290	15.0	52087.5	5359.08	1554132.5	6612.21
	500 床以上	215	150.0	96750.0	17816.52	3830552.5	17191.34
	全体	1146	5.0	96750.0	5238.17	6002937.5	10387.91
(2) 高張アルブミン製剤（20%）	0 床	28	8.0	3990.0	293.14	8208.0	766.16
	1～299 床	446	8.0	28810.0	1700.26	758318.0	2749.34
	300～499 床	130	24.0	31000.0	7050.45	916558.0	6445.78
	500 床以上	104	4.0	79590.0	12060.19	1254260.0	14265.57
	全体	708	4.0	79590.0	4148.79	2937344.0	7558.77
(3) 高張アルブミン製剤（25%）	0 床	122	10.0	4987.5	449.53	54842.5	751.17
	1～299 床	1432	5.0	28137.5	1734.06	2483172.5	2690.74
	300～499 床	246	10.0	88075.0	9129.00	2245735.0	9534.92
	500 床以上	169	50.0	151125.0	21427.37	3621225.0	18236.26
	全体	1969	5.0	151125.0	4268.65	8404975.0	8878.14
(4) アルブミン製剤合計	0 床	154	8.0	4987.5	424.40	65358.0	744.69
	1～299 床	1923	5.0	36512.5	2005.95	3857435.5	3251.69
	300～499 床	357	15.0	140162.5	13211.28	4716425.5	13191.03
	500 床以上	220	2800.0	207375.0	39572.90	8706037.5	30946.31
	全体	2654	5.0	207375.0	6535.51	17345256.5	14954.65

1-52. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で加熱人血漿蛋白（等張アルブミン製剤：4.4%）を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	9	5.11%	277	13.85%	52	14.73%	18	8.37%	356	12.97%
2	購入していない	167	94.89%	1723	86.15%	301	85.27%	197	91.63%	2388	87.03%
	回答施設合計	176		2000		353		215		2744	

1-53. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した加熱人血漿蛋白(等張アルブミン製剤:4.4%)の総本数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (100mL) 本	0 床	1	12	12	12.00	12	
	1～299 床	16	1	289	28.38	454	70.45
	300～499 床	6	31	154	94.17	565	55.09
	500 床以上	1	7	7	7.00	7	
	全体	24	1	289	43.25	1038	69.48
(2)加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (250mL) 本	0 床	5	1	708	221.00	1105	316.88
	1～299 床	251	1	780	55.65	13967	106.80
	300～499 床	42	2	1080	193.07	8109	211.16
	500 床以上	13	25	2380	435.23	5658	666.10
	全体	311	1	2380	92.73	28839	203.05

【特別集計：加熱人血漿蛋白製剤購入量 (g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤	0 床	6	11.0	7788.0	2034.63	12207.8	3265.40
	1～299 床	267	4.4	8580.0	582.90	155634.6	1147.20
	300～499 床	47	22.0	11880.0	1950.74	91685.0	2253.11
	500 床以上	14	30.8	26180.0	4447.77	62268.8	7153.48
	全体	334	4.4	26180.0	963.46	321796.2	2166.83

1-54. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を購入しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	28	15.82%	1187	59.47%	316	94.61%	199	97.55%	1730	63.81%
2	購入していない	149	84.18%	809	40.53%	18	5.39%	5	2.45%	981	36.19%
	回答施設合計	177		1996		334		204		2711	

1-55. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で購入した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL) 本	0 床	2	5	8	6.50	13	2.12
	1～299 床	55	1	235	33.71	1854	53.08
	300～499 床	67	1	230	35.43	2374	50.43
	500 床以上	106	1	799	85.77	9092	110.99
	全体	230	1	799	57.97	13333	87.84
(2)免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL) 本	0 床	1	10	10	10.00	10	
	1～299 床	10	2	78	20.40	204	25.79
	300～499 床	9	5	104	25.44	229	34.06
	500 床以上	7	3	79	36.14	253	29.03
	全体	27	2	104	25.78	696	28.83
(3)免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL) 本	0 床	17	1	176	18.65	317	41.47
	1～299 床	788	1	5122	88.90	70057	240.09
	300～499 床	235	1	3562	241.94	56856	364.81
	500 床以上	163	1	7516	781.69	127416	1237.92
	全体	1203	1	7516	211.68	254646	569.96
(4)免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL) 本	0 床	4	2	163	78.75	315	86.68
	1～299 床	486	1	3910	104.65	50859	255.27
	300～499 床	205	4	2126	320.34	65669	372.59
	500 床以上	158	12	6340	1074.37	169750	1032.86
	全体	853	1	6340	335.98	286593	631.62
(5)免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL) 本	0 床	2	10	15	12.50	25	3.54
	1～299 床	36	2	1107	106.50	3834	228.87
	300～499 床	42	5	371	93.00	3906	93.17
	500 床以上	40	5	1140	275.60	11024	265.10
	全体	120	2	1140	156.58	18789	220.74
(6)免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL) 本	0 床						
	1～299 床	10	1	155	28.50	285	46.99
	300～499 床	21	1	690	59.43	1248	149.31
	500 床以上	48	2	475	67.90	3259	98.07
	全体	79	1	690	60.66	4792	109.23

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7)免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL) 本	0 床						
	1～299 床	84	1	659	59.27	4979	116.28
	300～499 床	79	1	750	65.06	5140	125.79
	500 床以上	74	2	2411	187.03	13840	358.30
	全体	237	1	2411	101.09	23959	230.37
(8)免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL) 本	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	141	1	399	41.23	5814	62.06
	300～499 床	118	1	953	142.73	16842	156.42
	500 床以上	120	13	3170	490.53	58864	543.37
	全体	380	1	3170	214.53	81523	372.42
(9)免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL) 本	0 床	1	25	25	25.00	25	
	1～299 床	43	1	264	35.16	1512	47.64
	300～499 床	64	1	630	78.48	5023	93.12
	500 床以上	63	6	640	171.67	10815	142.62
	全体	171	1	640	101.61	17375	119.85
(10)免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL) 本	0 床						
	1～299 床	25	2	170	25.24	631	37.56
	300～499 床	23	2	191	40.04	921	47.48
	500 床以上	36	3	549	93.31	3359	107.73
	全体	84	2	549	58.46	4911	82.78

【特別集計：免疫グロブリン製剤購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0 床	25	2.5	837.5	115.96	2899.0	227.16
	1～299 床	1172	0.5	34800.0	459.31	538308.5	1509.57
	300～499 床	291	2.5	13712.5	2327.47	677295.0	2354.25
	500 床以上	186	32.5	46347.5	9614.02	1788208.5	8011.74
	全体	1674	0.5	46347.5	1796.12	3006711.0	4218.14

1-5) 血漿分画製剤の廃棄状況について

1-56. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、血漿分画製剤(参考資料 3:該当する血漿分画製剤参照)を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	10	1.24%	336	11.42%	132	36.26%	156	69.96%	634	14.62%
2	廃棄していない	797	98.76%	2606	88.58%	232	63.74%	67	30.04%	3702	85.38%
	回答施設合計	807		2942		364		223		4336	

1-57. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	0	0.00%	88	27.16%	96	72.73%	123	82.00%	307	49.84%
2	システムを使用していないので手作業	10	100.00%	236	72.84%	36	27.27%	27	18.00%	309	50.16%
	回答施設合計	10		324		132		150		616	

1-58. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、)を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	7	77.78%	183	55.45%	110	83.33%	148	94.87%	448	71.45%
2	廃棄していない	2	22.22%	147	44.55%	22	16.67%	8	5.13%	179	28.55%
	回答施設合計	9		330		132		156		627	

1-59. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) 本	0 床						
	1～299 床	5	1	4	2.40	12	1.34
	300～499 床	3	1	4	2.33	7	1.53
	500 床以上	6	1	5	2.17	13	1.83
	全体	14	1	5	2.29	32	1.49
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) 本	0 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	1～299 床	80	1	8	2.04	163	1.55
	300～499 床	65	1	8	1.60	104	1.21
	500 床以上	107	1	17	3.22	345	3.06
	全体	254	1	17	2.42	615	2.36
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) 本	0 床						
	1～299 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	300～499 床	2	2	7	4.50	9	3.54
	500 床以上	9	1	8	3.44	31	2.65
	全体	13	1	8	3.31	43	2.56
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) 本	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	35	1	7	2.17	76	1.60
	300～499 床	21	1	4	1.57	33	0.81
	500 床以上	34	1	15	3.65	124	4.38
	全体	91	1	15	2.57	234	2.99
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) 本	0 床						
	1～299 床	6	1	4	2.83	17	1.33
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	4	2	6	4.25	17	2.06
	全体	11	1	6	3.27	36	1.68
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) 本	0 床	3	1	3	2.00	6	1.00
	1～299 床	71	1	30	2.63	187	3.80
	300～499 床	43	1	11	2.00	86	1.69
	500 床以上	70	1	23	2.91	204	3.23
	全体	187	1	30	2.58	483	3.18

【特別集計：アルブミン製剤廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）	0 床	2	12.5	25.0	18.75	37.5	8.84
	1～299 床	84	5.0	100.0	24.97	2097.5	19.32
	300～499 床	68	5.0	100.0	19.63	1335.0	14.93
	500 床以上	109	5.0	212.5	40.16	4377.5	38.61
	全体	263	5.0	212.5	29.84	7847.5	29.49
(2) 高張アルブミン製剤（20%）	0 床	1	10.0	10.0	10.00	10.0	
	1～299 床	37	4.0	70.0	20.86	772.0	15.96
	300～499 床	22	8.0	40.0	16.64	366.0	9.31
	500 床以上	41	4.0	150.0	33.27	1364.0	42.56
	全体	101	4.0	150.0	24.87	2512.0	29.78
(3) 高張アルブミン製剤（25%）	0 床	3	12.5	37.5	25.00	75.0	12.50
	1～299 床	77	5.0	375.0	31.46	2422.5	45.85
	300～499 床	44	10.0	137.5	24.66	1085.0	21.00
	500 床以上	71	12.5	287.5	37.11	2635.0	40.35
	全体	195	5.0	375.0	31.88	6217.5	39.15
(4) アルブミン製剤合計	0 床	6	10.0	37.5	20.42	122.5	10.66
	1～299 床	177	5.0	385.0	29.90	5292.0	34.37
	300～499 床	106	5.0	150.0	26.28	2786.0	23.26
	500 床以上	144	4.0	400.0	58.17	8376.5	64.46
	全体	433	4.0	400.0	38.28	16577.0	46.79

1-60. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間でアルブミン製剤を廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床	5	1	3	1.60	8	0.89
	1～299 床	106	1	8	2.58	274	1.87
	300～499 床	10	1	7	1.80	18	1.87
	500 床以上	12	1	8	2.83	34	2.33
	全体	133	1	8	2.51	334	1.89
(2) 破損	0 床						
	1～299 床	50	1	5	1.54	77	1.07
	300～499 床	68	1	7	1.88	128	1.45
	500 床以上	115	1	33	3.27	376	4.07
	全体	233	1	33	2.49	581	3.10
(3) 保管管理不良	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	5	2.33	7	2.31
	500 床以上	4	1	4	2.00	8	1.41
	全体	7	1	5	2.14	15	1.68
(4) 転用ができない	0 床						
	1～299 床	15	1	5	1.53	23	1.25
	300～499 床	20	1	9	1.70	34	1.78
	500 床以上	45	1	28	4.04	182	5.05
	全体	80	1	28	2.99	239	4.08
(5) その他	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	15	1	30	3.27	49	7.42
	300～499 床	34	1	4	1.38	47	0.74
	500 床以上	43	1	12	2.07	89	2.12
	全体	93	1	30	2.00	186	3.32

1-61. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を廃棄しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	1	12.50%	126	38.77%	38	34.86%	68	51.52%	233	40.59%
2	廃棄していない	7	87.50%	199	61.23%	71	65.14%	64	48.48%	341	59.41%
	回答施設合計	8		325		109		132		574	

1-62. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL) 本	0 床						
	1～299 床	9	1	2	1.33	12	0.50
	300～499 床	10	1	10	2.60	26	3.20
	500 床以上	12	1	10	3.08	37	2.94
	全体	31	1	10	2.42	75	2.62
(2)免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL) 本	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	2	1.33	4	0.58
(3)免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL) 本	0 床						
	1～299 床	87	1	18	3.02	263	2.85
	300～499 床	16	1	10	2.25	36	2.70
	500 床以上	30	1	14	3.03	91	2.82
	全体	133	1	18	2.93	390	2.82
(4)免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL) 本	0 床						
	1～299 床	26	1	7	2.38	62	1.92
	300～499 床	14	1	4	1.71	24	0.99
	500 床以上	37	1	9	1.95	72	1.72
	全体	77	1	9	2.05	158	1.69

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5)免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL) 本	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	300～499 床						
	500 床以上	5	1	1	1.00	5	0.00
	全体	8	1	2	1.13	9	0.35
(6)免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL) 本	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	4	1	2	1.25	5	0.50
	全体	5	1	3	1.60	8	0.89
(7)免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL) 本	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	3	1.67	5	1.15
(8)免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL) 本	0 床						
	1～299 床	2	1	4	2.50	5	2.12
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	8	1	8	2.63	21	2.33
	全体	11	1	8	2.45	27	2.11
(9)免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL) 本	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(10)免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL) 本	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00

【特別集計：免疫グロブリン製剤廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0 床						
	1～299 床	123	0.5	45.0	8.68	1068.0	8.18
	300～499 床	37	0.5	25.0	6.30	233.0	6.02
	500 床以上	67	0.5	87.5	12.34	827.0	14.00
	全体	227	0.5	87.5	9.37	2128.0	10.18

1-63. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤（静注）の廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0 床						
	1～299 床	98	1	18	2.74	269	2.53
	300～499 床	17	1	10	2.94	50	3.51
	500 床以上	17	1	11	2.94	50	2.63
	全体	132	1	18	2.80	369	2.67
(2) 破損	0 床						
	1～299 床	12	1	5	1.75	21	1.54
	300～499 床	8	1	3	1.50	12	0.93
	500 床以上	41	1	18	1.61	66	2.66
	全体	61	1	18	1.62	99	2.30
(3) 保管管理不良	0 床						
	1～299 床	2	2	4	3.00	6	1.41
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	5	1	4	2.00	10	1.22
(4) 転用ができない	0 床						
	1～299 床	8	1	2	1.25	10	0.46
	300～499 床	6	1	2	1.17	7	0.41
	500 床以上	15	1	12	3.27	49	3.20
	全体	29	1	12	2.28	66	2.51

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) その他	0 床						
	1～299 床	5	1	2	1.20	6	0.45
	300～499 床	7	1	4	1.71	12	1.11
	500 床以上	20	1	7	2.20	44	1.64
	全体	32	1	7	1.94	62	1.44

【2】 輸血療法の体制について

2-1) 血液製剤の管理について

1-64. 輸血検査を行っている部門はどこですか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	4	0.48%	124	3.97%	134	32.45%	180	73.77%	442	9.57%
2	検査部門	211	25.15%	2084	66.71%	275	66.59%	63	25.82%	2633	56.99%
3	院外の検査機関に委託	549	65.44%	789	25.26%	3	0.73%	0	0.00%	1341	29.03%
4	その他	75	8.94%	127	4.07%	1	0.24%	1	0.41%	204	4.42%
	回答施設合計	839		3124		413		244		4620	

1-65. 輸血用血液製剤を管理している部門はどこですか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	9	1.09%	148	4.77%	136	33.01%	187	76.95%	480	10.46%
2	検査部門	244	29.43%	1900	61.21%	272	66.02%	56	23.05%	2472	53.88%
3	院外の検査機関に委託	155	18.70%	205	6.60%	0	0.00%	0	0.00%	360	7.85%
4	その他	421	50.78%	851	27.42%	4	0.97%	0	0.00%	1276	27.81%
	回答施設合計	829		3104		412		243		4588	

1-66. 輸血責任医師（輸血業務担当や責任者として病院等から任命されている医師）はいますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる（専任）	27	3.26%	95	3.08%	85	20.48%	111	45.49%	318	6.95%
2	いる（兼任）	224	27.02%	1572	50.91%	298	71.81%	129	52.87%	2223	48.58%
3	いない	578	69.72%	1421	46.02%	32	7.71%	4	1.64%	2035	44.47%
	回答施設合計	829		3088		415		244		4576	

1-67. 貴施設に臨床検査技師はいますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	388	46.86%	2530	80.96%	415	100.00%	244	100.00%	3577	77.56%
2	いない	440	53.14%	595	19.04%	0	0.00%	0	0.00%	1035	22.44%
	回答施設合計	828		3125		415		244		4612	

1-68. 臨床検査技師の配置状況について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	平日のみ日勤帯配置（夜間オンコール無し）	202	53.02%	455	18.08%	8	1.93%	0	0.00%	665	18.72%
2	平日のみ日勤帯配置（夜間オンコール有り）	72	18.90%	1080	42.93%	24	5.80%	2	0.83%	1178	33.16%
3	全日日勤帯のみ配置（夜間オンコール無し）	33	8.66%	55	2.19%	0	0.00%	0	0.00%	88	2.48%
4	全日日勤帯のみ配置（夜間オンコール有り）	22	5.77%	423	16.81%	22	5.31%	3	1.24%	470	13.23%
5	24 時間体制で配置	1	0.26%	385	15.30%	358	86.47%	237	97.93%	981	27.61%
6	必要時のみ配置	15	3.94%	25	0.99%	0	0.00%	0	0.00%	40	1.13%
7	その他	36	9.45%	93	3.70%	2	0.48%	0	0.00%	131	3.69%
	回答施設合計	381		2516		414		242		3553	

1-69. 輸血検査業務全体を担当し責任を持つ臨床検査技師「輸血担当技師」はいますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる（専任）	10	2.61%	160	6.37%	224	54.11%	226	92.62%	620	17.46%
2	いる（兼任）	134	34.99%	1477	58.84%	180	43.48%	18	7.38%	1809	50.94%
3	いない	239	62.40%	873	34.78%	10	2.42%	0	0.00%	1122	31.60%
	回答施設合計	383		2510		414		244		3551	

1-70. 輸血療法委員会又は同様の機能を持つ委員会はありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	159	19.23%	1927	61.96%	411	99.04%	244	100.00%	2741	59.64%
2	ない	668	80.77%	1183	38.04%	4	0.96%	0	0.00%	1855	40.36%
	回答施設合計	827		3110		415		244		4596	

1-71. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血療法委員会の開催回数は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	0 回	14	8.97%	45	2.35%	0	0.00%	0	0.00%	59	2.17%
2	1～5 回	68	43.59%	381	19.90%	10	2.43%	0	0.00%	459	16.85%
3	6 回	32	20.51%	1021	53.32%	320	77.86%	202	83.47%	1575	57.82%
4	7 回以上	42	26.92%	468	24.44%	81	19.71%	40	16.53%	631	23.16%
	回答施設合計	156		1915		411		242		2724	

1-72. 委員の出席率は何%でしょうか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほぼ 100%	79	52.67%	544	28.78%	28	6.86%	13	5.39%	664	24.69%
2	81～99%	52	34.67%	851	45.03%	155	37.99%	105	43.57%	1163	43.25%
3	61～80%	14	9.33%	403	21.32%	192	47.06%	103	42.74%	712	26.48%
4	41～60%	2	1.33%	67	3.54%	30	7.35%	18	7.47%	117	4.35%
5	21～40%	0	0.00%	15	0.79%	3	0.74%	2	0.83%	20	0.74%
6	0～20%	3	2.00%	10	0.53%	0	0.00%	0	0.00%	13	0.48%
	回答施設合計	150		1890		408		241		2689	

2-2) 輸血関連の検査体制について

1-73. 日中勤務時間帯(各施設の定める所定労働時間における夜間・休日を除く日中の勤務時間帯を指す)の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	5	0.61%	150	4.83%	163	39.37%	184	75.72%	502	10.94%
2	検査部門の臨床検査技師	170	20.58%	1999	64.36%	305	73.67%	89	36.63%	2563	55.85%
3	院内の検査センター技師	2	0.24%	142	4.57%	14	3.38%	5	2.06%	163	3.55%
4	看護師	21	2.54%	70	2.25%	0	0.00%	0	0.00%	91	1.98%
5	担当医	32	3.87%	76	2.45%	0	0.00%	1	0.41%	109	2.38%
6	院外の検査機関に委託	639	77.36%	1197	38.54%	6	1.45%	0	0.00%	1842	40.14%
7	検査を実施していない	26	3.15%	20	0.64%	0	0.00%	0	0.00%	46	1.00%
8	その他	8	0.97%	15	0.48%	0	0.00%	0	0.00%	23	0.50%
	回答施設合計	826		3106		414		243		4589	

1-74. 夜間・休日勤務時間帯の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	3	0.37%	122	3.92%	131	31.80%	167	69.29%	423	9.24%
2	検査部門の臨床検査技師	85	10.42%	1807	58.08%	392	95.15%	214	88.80%	2498	54.54%
3	院内の検査センター技師	1	0.12%	109	3.50%	19	4.61%	6	2.49%	135	2.95%
4	看護師	11	1.35%	90	2.89%	0	0.00%	0	0.00%	101	2.21%
5	担当医	18	2.21%	108	3.47%	0	0.00%	2	0.83%	128	2.79%
6	院外の検査機関に委託	369	45.22%	842	27.07%	3	0.73%	0	0.00%	1214	26.51%
7	検査を実施していない	350	42.89%	437	14.05%	3	0.73%	0	0.00%	790	17.25%
8	その他	22	2.70%	29	0.93%	1	0.24%	0	0.00%	52	1.14%
	回答施設合計	816		3111		412		241		4580	

1-75. 日中勤務時間帯の不規則抗体スクリーニング検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	2	0.24%	144	4.63%	163	39.37%	184	75.72%	493	10.75%
2	検査部門の臨床検査技師	68	8.28%	1338	43.05%	295	71.26%	83	34.16%	1784	38.90%
3	院内の検査センター技師	0	0.00%	90	2.90%	12	2.90%	4	1.65%	106	2.31%
4	看護師	13	1.58%	22	0.71%	0	0.00%	0	0.00%	35	0.76%
5	担当医	20	2.44%	21	0.68%	0	0.00%	0	0.00%	41	0.89%
6	院外の検査機関に委託	662	80.63%	1511	48.62%	8	1.93%	0	0.00%	2181	47.56%
7	検査を実施していない	81	9.87%	211	6.79%	1	0.24%	0	0.00%	293	6.39%
8	その他	9	1.10%	14	0.45%	0	0.00%	0	0.00%	23	0.50%
	回答施設合計	821		3108		414		243		4586	

1-76. 夜間・休日勤務時間帯の不規則抗体スクリーニング検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	3	0.37%	113	3.65%	117	28.26%	142	58.68%	375	8.22%
2	検査部門の臨床検査技師	41	5.07%	1269	40.99%	340	82.13%	174	71.90%	1824	39.99%
3	院内の検査センター技師	0	0.00%	68	2.20%	13	3.14%	6	2.48%	87	1.91%
4	看護師	3	0.37%	16	0.52%	0	0.00%	0	0.00%	19	0.42%
5	担当医	13	1.61%	16	0.52%	0	0.00%	0	0.00%	29	0.64%
6	院外の検査機関に委託	362	44.75%	1027	33.17%	3	0.72%	0	0.00%	1392	30.52%
7	検査を実施していない	386	47.71%	781	25.23%	57	13.77%	41	16.94%	1265	27.74%
8	その他	23	2.84%	29	0.94%	1	0.24%	0	0.00%	53	1.16%
	回答施設合計	809		3096		414		242		4561	

1-77. 日中勤務時間帯の交差適合試験の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	3	0.36%	149	4.80%	162	39.32%	185	76.13%	499	10.89%
2	検査部門の臨床検査技師	191	23.24%	2022	65.08%	302	73.30%	84	34.57%	2599	56.70%
3	院内の検査センター技師	5	0.61%	137	4.41%	11	2.67%	4	1.65%	157	3.42%
4	看護師	26	3.16%	68	2.19%	0	0.00%	0	0.00%	94	2.05%
5	担当医	50	6.08%	115	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	165	3.60%
6	院外の検査機関に委託	567	68.98%	866	27.87%	1	0.24%	0	0.00%	1434	31.28%
7	検査を実施していない	27	3.28%	38	1.22%	0	0.00%	0	0.00%	65	1.42%
8	その他	13	1.58%	23	0.74%	0	0.00%	0	0.00%	36	0.79%
	回答施設合計	822		3107		412		243		4584	

1-78. 夜間・休日勤務時間帯の交差適合試験の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	4	0.49%	126	4.06%	127	30.75%	171	70.95%	428	9.37%
2	検査部門の臨床検査技師	91	11.22%	1835	59.16%	393	95.16%	210	87.14%	2529	55.38%
3	院内の検査センター技師	2	0.25%	104	3.35%	14	3.39%	6	2.49%	126	2.76%
4	看護師	12	1.48%	75	2.42%	0	0.00%	0	0.00%	87	1.90%
5	担当医	29	3.58%	122	3.93%	0	0.00%	0	0.00%	151	3.31%
6	院外の検査機関に委託	337	41.55%	699	22.53%	1	0.24%	0	0.00%	1037	22.71%
7	検査を実施していない	353	43.53%	421	13.57%	4	0.97%	1	0.41%	779	17.06%
8	その他	17	2.10%	32	1.03%	1	0.24%	0	0.00%	50	1.09%
	回答施設合計	811		3102		413		241		4567	

1-79. 血液型検査で行っている主な検査方法は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	225	31.73%	1813	61.50%	68	16.50%	5	2.07%	2111	48.97%
2	カラム凝集法	139	19.61%	654	22.18%	319	77.43%	231	95.45%	1343	31.15%
3	マイクロプレート法	145	20.45%	181	6.14%	23	5.58%	6	2.48%	355	8.23%
4	その他(不明)	200	28.21%	300	10.18%	2	0.49%	0	0.00%	502	11.64%
	回答施設合計	709		2948		412		242		4311	

1-80. 血液型検査で行っている検査内容は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	抗 A、抗 B 試薬によるオモテ検査	598	95.99%	2770	98.16%	408	99.03%	243	100.00%	4019	98.02%
2	A 血球、B 血球によるウラ検査	478	76.73%	2531	89.69%	411	99.76%	243	100.00%	3663	89.34%
3	抗 D 血清を用いた D 抗原検査	480	77.05%	2573	91.18%	408	99.03%	242	99.59%	3703	90.32%
	回答施設合計	623		2822		412		243		4100	

1-81. 血液型検査の二重チェックを同一患者の異なる時点での2検体で行い、同一検体については異なる2人の検査者がそれぞれに検査していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	39	6.90%	327	11.82%	101	24.57%	82	33.74%	549	13.78%
2	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	67	11.86%	594	21.48%	69	16.79%	21	8.64%	751	18.85%
3	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯・夜勤帯両方）	33	5.84%	463	16.74%	199	48.42%	125	51.44%	820	20.58%
4	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯のみ）	33	5.84%	112	4.05%	6	1.46%	9	3.70%	160	4.02%
5	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	40	7.08%	246	8.89%	18	4.38%	3	1.23%	307	7.70%
6	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	98	17.35%	388	14.03%	12	2.92%	0	0.00%	498	12.50%
7	どちらも実施していない	255	45.13%	636	22.99%	6	1.46%	3	1.23%	900	22.58%
	回答施設合計	565		2766		411		243		3985	

1-82. 不規則抗体スクリーニング検査で行っている主な検査方法は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	140	22.36%	950	35.66%	47	11.38%	12	4.96%	1149	29.13%
2	カラム凝集法	253	40.42%	1181	44.33%	342	82.81%	225	92.98%	2001	50.72%
3	固相法	10	1.60%	48	1.80%	21	5.08%	5	2.07%	84	2.13%
4	その他(不明)	223	35.62%	485	18.21%	3	0.73%	0	0.00%	711	18.02%
	回答施設合計	626		2664		413		242		3945	

1-83. 不規則抗体スクリーニング検査で行っている検査内容は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	179	27.20%	1045	38.62%	61	14.84%	24	9.92%	1309	32.59%
2	酵素法	223	33.89%	1201	44.38%	259	63.02%	159	65.70%	1842	45.86%
3	間接抗グロブリン法	294	44.68%	1970	72.80%	406	98.78%	242	100.00%	2912	72.49%
4	その他(不明)	297	45.14%	587	21.69%	3	0.73%	1	0.41%	888	22.11%
	回答施設合計	658		2706		411		242		4017	

1-84. 交差適合試験で行っている主な検査方法は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	344	52.92%	1783	62.10%	116	28.29%	117	48.55%	2360	56.57%
2	カラム凝集法	92	14.15%	723	25.18%	280	68.29%	123	51.04%	1218	29.19%
3	固相法	7	1.08%	32	1.11%	11	2.68%	0	0.00%	50	1.20%
4	その他(不明)	207	31.85%	333	11.60%	3	0.73%	1	0.41%	544	13.04%
	回答施設合計	650		2871		410		241		4172	

1-85. 交差適合試験で行っている検査内容は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	406	58.76%	1872	63.76%	139	33.82%	113	46.69%	2530	59.11%
2	酵素法	177	25.62%	897	30.55%	45	10.95%	30	12.40%	1149	26.85%
3	間接抗グロブリン法	372	53.84%	2386	81.27%	408	99.27%	240	99.17%	3406	79.58%
4	その他(不明)	247	35.75%	407	13.86%	3	0.73%	2	0.83%	659	15.40%
	回答施設合計	691		2936		411		242		4280	

1-86. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で臨床検査技師以外の職員が交差適合試験を行って、赤血球輸血を施行した症例はありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	41	5.48%	122	4.11%	1	0.24%	2	0.82%	166	3.80%
2	ない	672	89.84%	2809	94.71%	410	99.51%	241	99.18%	4132	94.58%
3	不明	35	4.68%	35	1.18%	1	0.24%	0	0.00%	71	1.63%
	回答施設合計	748		2966		412		243		4369	

1-87. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、交差適合試験を省略して O 型 RBC-LR を使用していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	5	0.68%	140	4.69%	217	52.93%	212	87.97%	574	13.14%
2	使用していない	656	89.13%	1798	60.30%	26	6.34%	1	0.41%	2481	56.79%
3	未だ使用していないが、マニュアルで使用を明記	43	5.84%	997	33.43%	164	40.00%	28	11.62%	1232	28.20%
4	不明	32	4.35%	47	1.58%	3	0.73%	0	0.00%	82	1.88%
	回答施設合計	736		2982		410		241		4369	

交差適合試験を省略して O 型 RBC-LR を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	1	1	1	1.00	1	
1～299 床	83	1	19	2.07	172	2.51
300～499 床	141	1	44	6.66	939	9.63
500 床以上	149	1	120	20.53	3059	20.82
全体	374	1	120	11.15	4171	16.42

1-88. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、AB 型 FFP-LR を使用していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	5	0.67%	73	2.45%	134	32.60%	185	77.08%	397	9.08%
2	使用していない	678	91.01%	1966	66.02%	46	11.19%	7	2.92%	2697	61.66%
3	未だ使用していないが、マニュアルで使用を明記	29	3.89%	887	29.79%	228	55.47%	48	20.00%	1192	27.25%
4	不明	33	4.43%	52	1.75%	3	0.73%	0	0.00%	88	2.01%
	回答施設合計	745		2978		411		240		4374	

AB 型 FFP-LR を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	1	1	1	1.00	1	
1～299 床	34	1	10	2.44	83	2.41
300～499 床	68	1	39	5.29	360	7.82
500 床以上	119	1	95	14.83	1765	17.16
全体	222	1	95	9.95	2209	14.33

1-89. 血液型が確定しているが緊急輸血時などに、ABO 血液型同型 RBC-LR を、交差適合試験を省略して使用していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	13	1.75%	208	6.95%	213	52.21%	173	72.38%	607	13.85%
2	使用していない	676	90.86%	1977	66.10%	76	18.63%	49	20.50%	2778	63.40%
3	未だ使用していないが、マニュアルで使用を明記	28	3.76%	752	25.14%	116	28.43%	15	6.28%	911	20.79%
4	不明	27	3.63%	54	1.81%	3	0.74%	2	0.84%	86	1.96%
	回答施設合計	744		2991		408		239		4382	

ABO 血液型同型 RBC-LR を、交差適合試験を省略して使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	4	1	2	1.25	5	0.50
1～299 床	107	1	100	3.81	408	11.09
300～499 床	107	1	129	7.69	777	14.88
500 床以上	98	1	216	23.21	2275	35.63
全体	310	1	216	11.18	3465	24.13

1-90. ABO 血液型、RhD 血液、不規則抗体スクリーニングを事前に行い、臨床的に問題となる抗体が検出されない場合に、コンピュータークロスマッチを実施していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すべての症例で実施している	21	3.06%	60	2.04%	48	11.74%	42	17.43%	171	4.00%
2	T & S (type and screen) 症例のみ実施している	3	0.44%	93	3.17%	73	17.85%	46	19.09%	215	5.03%
3	手術時の追加依頼の場合に実施している	3	0.44%	17	0.58%	9	2.20%	6	2.49%	35	0.82%
4	実施していない	624	90.83%	2668	90.84%	271	66.26%	137	56.85%	3700	86.57%
5	その他	36	5.24%	99	3.37%	8	1.96%	10	4.15%	153	3.58%
	回答施設合計	687		2937		409		241		4274	

2-3) 輸血前の検体保管状況と感染症検査の実施状況について

1-91. 輸血前検体の保存について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則的に全ての患者さんの検体を凍結保存している	239	30.60%	2014	65.95%	398	96.14%	239	98.35%	2890	64.34%
2	原則的に全ての患者さんの検体を冷蔵保存している	85	10.88%	211	6.91%	9	2.17%	4	1.65%	309	6.88%
3	特別な場合以外、ほとんど保存していない	82	10.50%	186	6.09%	1	0.24%	0	0.00%	269	5.99%
4	保存していない	375	48.02%	643	21.05%	6	1.45%	0	0.00%	1024	22.80%
	回答施設合計	781		3054		414		243		4492	

1-92. 検体保存期間は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0 ヶ月～6.0 ヶ月	80	25.89%	219	9.94%	7	1.72%	5	2.07%	311	9.84%
2	6.1 ヶ月～12.0 ヶ月	18	5.83%	103	4.67%	7	1.72%	3	1.24%	131	4.14%
3	12.1 ヶ月～24.0 ヶ月	65	21.04%	575	26.09%	106	26.11%	66	27.27%	812	25.69%
4	24.1 ヶ月以上（永久保存を除く）	130	42.07%	1199	54.40%	278	68.47%	164	67.77%	1771	56.03%
5	永久保存	16	5.18%	108	4.90%	8	1.97%	4	1.65%	136	4.30%
	回答施設合計	309		2204		406		242		3161	

1-93. 輸血前検体保存の方法について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査や交差適合試験の残りをそのまま保存している	197	62.34%	1352	61.26%	132	32.51%	58	23.87%	1739	54.82%
2	血液型検査や交差適合試験の残りを核酸検査に適合する試験管などに入れ保存している	25	7.91%	349	15.81%	120	29.56%	67	27.57%	561	17.69%
3	専用の採血管に採血し未開封のまま保存している	60	18.99%	350	15.86%	122	30.05%	100	41.15%	632	19.92%
4	その他	34	10.76%	156	7.07%	32	7.88%	18	7.41%	240	7.57%
	回答施設合計	316		2207		406		243		3172	

1-94. 輸血前に感染症マーカーの検査(輸血前感染症検査)を行っていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血前検査として、原則として全ての症例で行っている	164	21.19%	849	27.70%	116	28.02%	69	28.51%	1198	26.65%
2	輸血前検査として、症例によって行っている	63	8.14%	182	5.94%	33	7.97%	24	9.92%	302	6.72%
3	入院時検査や術前検査と合わせて行っている	258	33.33%	1565	51.06%	230	55.56%	130	53.72%	2183	48.57%
4	行っていない	289	37.34%	469	15.30%	35	8.45%	19	7.85%	812	18.06%
	回答施設合計	774		3065		414		242		4495	

1-95. 輸血前に実施している感染症検査の項目は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	HBs 抗原(*)	452	95.56%	2510	97.78%	378	100.00%	221	99.10%	3561	97.80%
2	HBs 抗体(*)	217	45.88%	963	37.51%	188	49.74%	135	60.54%	1503	41.28%
3	HBc 抗体(*)	127	26.85%	677	26.37%	159	42.06%	116	52.02%	1079	29.63%
4	HBe 抗原	18	3.81%	63	2.45%	2	0.53%	2	0.90%	85	2.33%
5	HBe 抗体	18	3.81%	36	1.40%	0	0.00%	3	1.35%	57	1.57%
6	HBV-DNA 核酸増幅検査	12	2.54%	17	0.66%	3	0.79%	1	0.45%	33	0.91%
7	HCV 抗体(*)	445	94.08%	2466	96.07%	372	98.41%	220	98.65%	3503	96.21%
8	HCV コア抗原(*)	81	17.12%	579	22.56%	128	33.86%	87	39.01%	875	24.03%
9	HCV-RNA 核酸増幅検査	13	2.75%	20	0.78%	1	0.26%	0	0.00%	34	0.93%
10	HIV 抗体(*)	80	16.91%	491	19.13%	149	39.42%	114	51.12%	834	22.91%
11	HIV 抗原／HIV 抗体同時測定	51	10.78%	623	24.27%	131	34.66%	80	35.87%	885	24.31%
12	HTLV- I 抗体	11	2.33%	142	5.53%	8	2.12%	9	4.04%	170	4.67%
	回答施設合計	473		2567		378		223		3641	

(*)厚生労働省の推奨する検査項目

2-4) 輸血後の検体保管状況と感染症検査の実施状況について

1-96. 輸血後検体の保存について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則的に全ての患者さんの検体を凍結保存している	81	10.41%	471	15.51%	76	18.49%	47	19.42%	675	15.11%
2	原則的に全ての患者さんの検体を冷蔵保存している	50	6.43%	169	5.56%	29	7.06%	16	6.61%	264	5.91%
3	特別な場合以外、ほとんど保存していない	109	14.01%	643	21.17%	123	29.93%	78	32.23%	953	21.33%
4	保存していない	538	69.15%	1754	57.75%	183	44.53%	101	41.74%	2576	57.65%
	回答施設合計	778		3037		411		242		4468	

1-97. 検体保存期間は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0 ヶ月～6.0 ヶ月	55	42.97%	212	33.70%	28	27.18%	18	28.57%	313	33.91%
2	6.1 ヶ月～12.0 ヶ月	9	7.03%	49	7.79%	5	4.85%	3	4.76%	66	7.15%
3	12.1 ヶ月～24.0 ヶ月	29	22.66%	117	18.60%	19	18.45%	16	25.40%	181	19.61%
4	24.1 ヶ月以上（永久保存を除く）	31	24.22%	228	36.25%	50	48.54%	25	39.68%	334	36.19%
5	永久保存	4	3.13%	23	3.66%	1	0.97%	1	1.59%	29	3.14%
	回答施設合計	128		629		103		63		923	

1-98. 輸血後検体保存の方法について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	検査の残りをそのまま保存している	98	76.56%	456	72.27%	58	55.77%	35	55.56%	647	69.87%
2	検査の残りを核酸検査に適合する試験管などに入れ保存している	9	7.03%	65	10.30%	17	16.35%	9	14.29%	100	10.80%
3	専用の採血管に採血し未開封のまま保存している	7	5.47%	71	11.25%	24	23.08%	13	20.63%	115	12.42%
4	その他	14	10.94%	39	6.18%	5	4.81%	6	9.52%	64	6.91%
	回答施設合計	128		631		104		63		926	

1-99. 輸血後に感染症マーカーの検査（輸血後感染症検査）を行っていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則として全ての症例で行っている	267	34.14%	1153	37.90%	206	50.24%	115	47.52%	1741	38.90%
2	症例によって行っている	98	12.53%	759	24.95%	181	44.15%	123	50.83%	1161	25.94%
3	行っていない	417	53.32%	1130	37.15%	23	5.61%	4	1.65%	1574	35.17%
	回答施設合計	782		3042		410		242		4476	

1-100. 輸血後に実施している感染症検査の項目は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	HBs 抗原	194	55.43%	700	37.19%	93	24.03%	54	22.69%	1041	36.44%
2	HBs 抗体	76	21.71%	153	8.13%	22	5.68%	14	5.88%	265	9.28%
3	HBc 抗体	37	10.57%	72	3.83%	12	3.10%	12	5.04%	133	4.66%
4	HBe 抗原	13	3.71%	27	1.43%	3	0.78%	0	0.00%	43	1.51%
5	HBe 抗体	9	2.57%	18	0.96%	2	0.52%	0	0.00%	29	1.02%
6	HBV-DNA 核酸増幅検査(*)	154	44.00%	1196	63.55%	314	81.14%	187	78.57%	1851	64.79%
7	HCV 抗体	178	50.86%	655	34.80%	86	22.22%	49	20.59%	968	33.88%
8	HCV コア抗原(*)	172	49.14%	1250	66.42%	311	80.36%	189	79.41%	1922	67.27%
9	HCV-RNA 核酸増幅検査	20	5.71%	29	1.54%	7	1.81%	4	1.68%	60	2.10%
10	HIV 抗体(*)	116	33.14%	698	37.09%	192	49.61%	147	61.76%	1153	40.36%
11	HIV 抗原／HIV 抗体同時測定	114	32.57%	836	44.42%	174	44.96%	87	36.55%	1211	42.39%
12	HTLV- I 抗体	5	1.43%	45	2.39%	8	2.07%	2	0.84%	60	2.10%
	回答施設合計	350		1882		387		238		2857	

(*)厚生労働省の推奨する検査項目

2-5) 輸血の同意書に記載しているHBV, HCV, HIVの残存リスクについて

1-101. 輸血用血液製剤投与に際して患者又は家族へ説明し、同意を得る場合の同意書(輸血同意書)がありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	有る	792	95.54%	3037	98.32%	409	100.00%	243	100.00%	4481	98.05%
2	無い	30	3.62%	41	1.33%	0	0.00%	0	0.00%	71	1.55%
3	血液製剤の使用実績なし	7	0.84%	11	0.36%	0	0.00%	0	0.00%	18	0.39%
	回答施設合計	829		3089		409		243		4570	

1-102. HBV の残存リスクについて記載がありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	有る（数値の記載あり）	107	14.30%	675	22.98%	170	42.18%	111	46.64%	1063	24.57%
2	有る（数値の記載無し）	328	43.85%	1348	45.90%	175	43.42%	103	43.28%	1954	45.17%
3	記載していない	313	41.84%	914	31.12%	58	14.39%	24	10.08%	1309	30.26%
	回答施設合計	748		2937		403		238		4326	

1-103. 記載している HBV の残存リスクの数値は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1／13 万人	10	11.49%	62	9.81%	13	8.07%	9	8.49%	94	9.53%
2	1／30 万人	22	25.29%	193	30.54%	55	34.16%	25	23.58%	295	29.92%
3	1／74 万人	8	9.20%	39	6.17%	17	10.56%	14	13.21%	78	7.91%
4	1／160 万人	6	6.90%	49	7.75%	17	10.56%	14	13.21%	86	8.72%
5	その他	41	47.13%	289	45.73%	59	36.65%	44	41.51%	433	43.91%
	回答施設合計	87		632		161		106		986	

「その他」の場合、数値を記入して下さい

別紙 設問 1-103 その他詳細.xlsx を参照

1-104. HCV の残存リスクについて記載がありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	有る（数値の記載あり）	93	12.72%	598	20.49%	157	39.35%	97	40.76%	945	22.05%
2	有る（数値の記載無し）	330	45.14%	1402	48.05%	185	46.37%	116	48.74%	2033	47.43%
3	記載していない	308	42.13%	918	31.46%	57	14.29%	25	10.50%	1308	30.52%
	回答施設合計	731		2918		399		238		4286	

1-105. 記載している HCV の残存リスクの数値は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1／2200 万人	21	25.93%	222	39.43%	63	41.72%	37	38.95%	343	38.54%
2	推定困難	14	17.28%	54	9.59%	21	13.91%	14	14.74%	103	11.57%
3	その他	46	56.79%	287	50.98%	67	44.37%	44	46.32%	444	49.89%
	回答施設合計	81		563		151		95		890	

「その他」の場合、数値を記入して下さい

別紙 設問 1-105 その他詳細.xlsx を参照

1-106. HIV の残存リスクについて記載がありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	有る（数値の記載あり）	91	12.50%	658	22.64%	157	39.25%	95	39.92%	1001	23.43%
2	有る（数値の記載無し）	339	46.57%	1317	45.30%	188	47.00%	118	49.58%	1962	45.92%
3	記載していない	298	40.93%	932	32.06%	55	13.75%	25	10.50%	1310	30.66%
	回答施設合計	728		2907		400		238		4273	

1-107. 記載している HIV の残存リスクの数値は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1／1100 万人	23	28.75%	260	41.27%	59	39.33%	29	31.52%	371	38.97%
2	1／8400 万人	6	7.50%	42	6.67%	19	12.67%	14	15.22%	81	8.51%
3	その他	51	63.75%	328	52.06%	72	48.00%	49	53.26%	500	52.52%
	回答施設合計	80		630		150		92		952	

「その他」の場合、数値を記入して下さい

別紙 設問 1-107 その他詳細.xlsx を参照

2-6) 業務手順書の整備状況について

1-108. 輸血療法に関する院内マニュアルはありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	595	74.28%	2629	86.14%	407	99.27%	243	100.00%	3874	85.97%
2	作成する予定である	45	5.62%	111	3.64%	2	0.49%	0	0.00%	158	3.51%
3	作成していない	146	18.23%	294	9.63%	0	0.00%	0	0.00%	440	9.76%
4	使用実績がない	15	1.87%	18	0.59%	1	0.24%	0	0.00%	34	0.75%
	回答施設合計	801		3052		410		243		4506	

1-109. 宗教的輸血拒否に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	55	6.91%	946	31.31%	351	85.61%	230	95.44%	1582	35.41%
2	作成する予定である	23	2.89%	165	5.46%	16	3.90%	4	1.66%	208	4.66%
3	作成していない	560	70.35%	1564	51.77%	36	8.78%	6	2.49%	2166	48.48%
4	使用実績がない	158	19.85%	346	11.45%	7	1.71%	1	0.41%	512	11.46%
	回答施設合計	796		3021		410		241		4468	

1-110. 自己血輸血に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	27	3.42%	1143	37.57%	388	94.40%	241	99.18%	1799	40.10%
2	作成する予定である	11	1.39%	52	1.71%	6	1.46%	1	0.41%	70	1.56%
3	作成していない	433	54.81%	966	31.76%	6	1.46%	0	0.00%	1405	31.32%
4	使用実績がない	319	40.38%	881	28.96%	11	2.68%	1	0.41%	1212	27.02%
	回答施設合計	790		3042		411		243		4486	

2-7) 業務手順書の実施のための処置の状況について

1-111. 血液製剤の使用について業務手順書の実施を浸透させるために行った病院としての取り組みは

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会等で検討し、病院全体で取り組んでいる。	182	24.53%	1510	50.76%	352	86.49%	220	92.05%	2264	51.89%
2	病院全体での取組はなく、担当部署にまかされている。	384	51.75%	1184	39.80%	50	12.29%	18	7.53%	1636	37.50%
3	わからない。	176	23.72%	281	9.45%	5	1.23%	1	0.42%	463	10.61%
	回答施設合計	742		2975		407		239		4363	

1-112. 血液製剤の使用について業務手順書の実施を浸透させるために行った具体的な取り組みは

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	マニュアルの配布	478	73.43%	2212	79.28%	350	86.63%	206	86.92%	3246	79.52%
2	輸血前・後の評価システム導入	31	4.76%	148	5.30%	27	6.68%	26	10.97%	232	5.68%
3	アンケート実施	4	0.61%	60	2.15%	11	2.72%	19	8.02%	94	2.30%
4	手順書の改定	271	41.63%	1489	53.37%	258	63.86%	181	76.37%	2199	53.87%
5	輸血療法委員会で手順書について話し合った	92	14.13%	1022	36.63%	260	64.36%	154	64.98%	1528	37.43%
6	輸血療法委員会の回数増加	13	2.00%	87	3.12%	13	3.22%	13	5.49%	126	3.09%
7	専任の輸血担当医師の任命	20	3.07%	87	3.12%	51	12.62%	58	24.47%	216	5.29%
8	専任の輸血担当技師の任命	10	1.54%	81	2.90%	66	16.34%	66	27.85%	223	5.46%
9	その他	77	11.83%	205	7.35%	29	7.18%	33	13.92%	344	8.43%
	回答施設合計	651		2790		404		237		4082	

「その他」の内容を具体的に、50 文字以内で記入して下さい

別紙 設問 1-112 その他詳細.xlsx を参照

2-8) その他輸血療法の安全管理について

1-113. 不適合輸血(過誤輸血)を防ぐための対策について

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査検体と交差適合試験用検体は別の時点で採血した検体を用いることを徹底する	344	45.81%	1841	61.28%	347	84.22%	194	80.17%	2726	61.83%
2	血液型検査用検体は一患者分のみ の採血管を用意し採血する	362	48.20%	1316	43.81%	134	32.52%	122	50.41%	1934	43.86%
3	輸血担当検査技師を配置する	22	2.93%	440	14.65%	270	65.53%	207	85.54%	939	21.30%
4	検査技師による輸血検査の 24 時間 実施体制	29	3.86%	1300	43.28%	372	90.29%	239	98.76%	1940	44.00%
5	自動輸血検査機器の導入	3	0.40%	278	9.25%	335	81.31%	236	97.52%	852	19.32%
6	血液型検査において同一患者の二 重チェック、同一検体の二重チェッ クの徹底	274	36.48%	1521	50.63%	240	58.25%	157	64.88%	2192	49.72%
7	輸血の準備および実施は、原則とし て 1 回一患者ごと行う	498	66.31%	2003	66.68%	294	71.36%	191	78.93%	2986	67.73%
8	輸血担当検査技師による当直技師 への輸血教育の実施	4	0.53%	358	11.92%	291	70.63%	209	86.36%	862	19.55%
9	血液型記入時の 2 名の医療従事者 によるダブルチェックその他	375	49.93%	1682	55.99%	152	36.89%	107	44.21%	2316	52.53%
10	電子機器による確認・照合	25	3.33%	738	24.57%	336	81.55%	236	97.52%	1335	30.28%
11	輸血前に患者自身に名前、生年月 日、血液型などを名乗ってもらう	227	30.23%	1214	40.41%	220	53.40%	174	71.90%	1835	41.62%
12	輸血責任医師を任命する	51	6.79%	502	16.71%	219	53.16%	185	76.45%	957	21.71%
13	輸血療法委員会等で不適合輸血予 防策を検討し、マニュアルを作成し 実施する	69	9.19%	803	26.73%	250	60.68%	174	71.90%	1296	29.39%
14	看護手順等に不適合輸血予防策に ついて記載して実施している	101	13.45%	657	21.87%	161	39.08%	148	61.16%	1067	24.20%
15	輸血医療に専門性を有する医療従 事者（医師、看護師、検査技師、薬 剤師など）が巡視し指導・教育する	24	3.20%	111	3.70%	61	14.81%	99	40.91%	295	6.69%
16	院内輸血講習会を行う	46	6.13%	555	18.48%	186	45.15%	137	56.61%	924	20.96%
17	院外講師を呼んで輸血講演を行う	46	6.13%	580	19.31%	125	30.34%	59	24.38%	810	18.37%
	回答施設合計	751		3004		412		242		4409	

【3】 使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について

1-114. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血を実施した件数について

輸血実施件数（件）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	(1) 同種血のみ	741	1	584	21.60	16008	44.87
	(2) 自己血のみ	3	4	260	90.00	270	147.23
	(3) 同種血、自己血併用	1	8	8	8.00	8	
	(4) 実施件数合計	742	1	584	21.95	16286	45.76
1～299 床	(1) 同種血のみ	2824	1	11640	171.16	483363	371.91
	(2) 自己血のみ	712	1	1030	40.34	28722	85.37
	(3) 同種血、自己血併用	213	1	1411	17.35	3695	106.61
	(4) 実施件数合計	2854	1	11690	181.41	517732	379.40
300～499 床	(1) 同種血のみ	324	1	29610	1618.71	524461	2107.99
	(2) 自己血のみ	282	1	1259	64.98	18323	114.65
	(3) 同種血、自己血併用	163	1	7230	50.67	8260	565.88
	(4) 実施件数合計	329	1	29654	1698.33	558749	2138.44
500 床以上	(1) 同種血のみ	171	22	13111	4670.49	798654	3140.44
	(2) 自己血のみ	168	2	948	127.77	21465	138.84
	(3) 同種血、自己血併用	133	1	1453	27.53	3662	127.89
	(4) 実施件数合計	172	176	13299	4845.54	833433	3185.53
全体	(1) 同種血のみ	4060	1	29610	448.89	1822486	1345.46
	(2) 自己血のみ	1165	1	1259	59.04	68780	106.46
	(3) 同種血、自己血併用	510	1	7230	30.64	15625	333.31
	(4) 実施件数合計	4097	1	29654	470.15	1926200	1382.03

1-115. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血を実施した患者集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	60	7.67%	751	25.52%	316	89.77%	181	93.78%	1308	30.63%
2	システムを使用していないので手作業	722	92.33%	2192	74.48%	36	10.23%	12	6.22%	2962	69.37%
	回答施設合計	782		2943		352		193		4270	

1-116. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血を実施した実患者数について

輸血実施患者数（人）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	(1) 同種血のみ	738	1	559	9.06	6683	24.45
	(2) 自己血のみ	3	2	130	45.00	135	73.61
	(3) 同種血、自己血併用	1	2	2	2.00	2	
	(4) 実患者数合計	739	1	559	9.23	6820	24.88
1～299 床	(1) 同種血のみ	2803	1	1144	66.68	186917	98.08
	(2) 自己血のみ	721	1	900	32.29	23283	64.68
	(3) 同種血、自己血併用	230	1	200	5.53	1273	19.38
	(4) 実患者数合計	2832	1	1411	74.90	212106	110.70
300～499 床	(1) 同種血のみ	356	1	5500	513.05	182645	483.98
	(2) 自己血のみ	318	1	737	51.19	16277	73.67
	(3) 同種血、自己血併用	196	1	99	5.48	1074	9.95
	(4) 実患者数合計	360	1	5567	558.59	201091	494.46
500 床以上	(1) 同種血のみ	211	22	6380	1125.16	237409	650.94
	(2) 自己血のみ	208	2	455	101.67	21148	94.29
	(3) 同種血、自己血併用	176	1	1453	18.94	3334	109.45
	(4) 実患者数合計	214	39	6565	1236.76	264667	670.52
全体	(1) 同種血のみ	4108	1	6380	149.38	613654	342.30
	(2) 自己血のみ	603	1	1453	9.42	5683	60.79
	(3) 同種血、自己血併用	603	1	1453	9.42	5683	60.79
	(4) 実患者数合計	4145	1	6565	165.18	684684	368.00

1-117. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血を実施した患者集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	60	7.95%	743	26.22%	323	89.47%	204	95.77%	1330	31.95%
2	システムを使用していないので手作業	695	92.05%	2091	73.78%	38	10.53%	9	4.23%	2833	68.05%
	回答施設合計	755		2834		361		213		4163	

3-2) 輸血用血液製剤の使用実績について

1-118. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血用血液製剤(全血製剤、赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	749	89.92%	2971	95.78%	411	99.76%	242	100.00%	4373	95.29%
2	使用していない	84	10.08%	131	4.22%	1	0.24%	0	0.00%	216	4.71%
	回答施設合計	833		3102		412		242		4589	

1-119. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した輸血用血液製剤の集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	55	7.71%	841	28.91%	381	93.84%	230	97.05%	1507	35.33%
2	システムを使用していないので手作業	658	92.29%	2068	71.09%	25	6.16%	7	2.95%	2758	64.67%
	回答施設合計	713		2909		406		237		4265	

3-3) 全血製剤の使用実績について(全体)

1-120. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で全血製剤(人全血液-LR、照射人全血液-LR)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	42	5.59%	64	2.14%	2	0.49%	2	0.83%	110	2.51%
2	使用していない	710	94.41%	2921	97.86%	407	99.51%	238	99.17%	4276	97.49%
	回答施設合計	752		2985		409		240		4386	

1-121. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した全血製剤(人全血液-LR、照射人全血液-LR)の使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人全血液(人全血液-LR-1、照射人全血液-LR-1 製剤)袋(本)	0 床	16	1	22	5.38	86	5.32
	1～299 床	16	1	21	7.81	125	6.62
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	32	1	22	6.59	211	6.03
(2) 人全血液(人全血液-LR-2、照射人全血液-LR-2 製剤)袋(本)	0 床	21	1	26	8.05	169	6.86
	1～299 床	41	1	75	13.15	539	17.09
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	62	1	75	11.42	708	14.59

【特別集計：全血製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
全血製剤使用／袋(本)	0 床	36	1	26	7.08	255	6.33
	1～299 床	47	1	88	14.13	664	17.95
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	83	1	88	11.07	919	14.50
全血製剤使用／単位	0 床	36	1	52	11.78	424	12.11
	1～299 床	47	1	162	25.60	1203	34.11
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	83	1	162	19.60	1627	27.62

【特別集計：一般病床数あたりの全血製剤使用量】

一般病床数あたりの全血製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 全血製剤／単位	1～299 床	47	0.0172	7.8947	1.25538	59.0031	1.53
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	47	0.0172	7.8947	1.25538	59.0031	1.53

3-4) 赤血球製剤の使用実績について(全体)

1-122. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球製剤を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	729	95.29%	2901	97.22%	410	100.00%	240	100.00%	4280	97.29%
2	使用していない	36	4.71%	83	2.78%	0	0.00%	0	0.00%	119	2.71%
	回答施設合計	765		2984		410		240		4399	

1-123. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤の総袋（本）数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液・LR-1、照射赤血球液・LR-1 製剤)袋(本)	0 床	267	1	124	9.29	2481	15.25
	1～299 床	1497	1	1051	27.31	40888	65.46
	300～499 床	272	1	825	47.34	12877	114.24
	500 床以上	213	1	1305	112.65	23994	190.11
	全体	2249	1	1305	35.68	80240	92.56
(2) 人赤血球液(赤血球液・LR-2、照射赤血球液・LR-2 製剤)袋(本)	0 床	597	1	534	25.69	15338	46.18
	1～299 床	2667	1	5201	200.19	533908	315.99
	300～499 床	399	1	7496	1511.84	603226	1015.46
	500 床以上	236	81	11700	4430.85	1045681	2121.72
	全体	3899	1	11700	563.77	2198153	1255.98
(3) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液・LR-1、照射洗浄赤血球液・LR-1 製剤)袋(本)	0 床	24	1	85	11.88	285	20.61
	1～299 床	68	1	130	12.81	871	24.83
	300～499 床	3	1	18	8.00	24	8.89
	500 床以上	6	1	74	22.50	135	27.43
	全体	101	1	130	13.02	1315	23.59
(4) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液・LR-2、照射洗浄赤血球液・LR-2 製剤)袋(本)	0 床	47	1	114	16.94	796	24.59
	1～299 床	189	1	1541	79.22	14972	174.54
	300～499 床	61	1	2611	156.46	9544	510.80
	500 床以上	84	1	2321	58.79	4938	277.17
	全体	381	1	2611	79.40	30250	273.22
(5) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液・LR-1、照射解凍赤血球液・LR-1 製剤)袋(本)	0 床	1	31	31	31.00	31	
	1～299 床	1	15	15	15.00	15	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	2	15	31	23.00	46	11.31
(6) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液・LR-2、照射解凍赤血球液・LR-2 製剤)袋(本)	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	9	1	16	6.33	57	5.29
	300～499 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	500 床以上	6	1	8	3.50	21	2.88
	全体	19	1	16	4.42	84	4.34

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1 製剤袋(本)	0 床	1	9	9	9.00	9	
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上						
	全体	4	1	9	3.25	13	3.86
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2 製剤袋(本)	0 床	4	1	11	5.75	23	4.11
	1～299 床	3	2	9	5.00	15	3.61
	300～499 床	4	1	8	3.00	12	3.37
	500 床以上	11	1	3	1.73	19	0.65
	全体	22	1	11	3.14	69	2.88

【特別集計：赤血球製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0 床	716	1	584	26.49	18965	47.07
	1～299 床	2861	1	5269	206.48	590728	324.42
	300～499 床	405	1	7496	1544.91	625689	1019.93
	500 床以上	237	92	11708	4534.97	1074788	2218.60
	全体	4219	1	11708	547.56	2310170	1249.25
赤血球製剤総単位数	0 床	716	1	1118	49.06	35124	89.85
	1～299 床	2861	1	10471	398.35	1139680	632.90
	300～499 床	405	2	14992	3057.96	1238475	2030.55
	500 床以上	237	173	23408	8968.13	2125447	4350.65
	全体	4219	1	23408	1075.78	4538726	2468.66

【特別集計：一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】

一般病床数あたりの製剤別血液製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤／単位	1～299 床	2861	0.0080	66.0000	4.04305	11567.1754	5.11
	300～499 床	405	0.0047	43.9648	7.97620	3230.3627	5.13
	500 床以上	237	0.3252	38.2484	12.81787	3037.8372	4.96
	全体	3503	0.0047	66.0000	5.09145	17835.3753	5.65

1-124. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤の使用理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 急性あるいは慢性の出血に対する治療	0 床	154	1	108	9.32	1435	16.40
	1～299 床	711	1	918	47.46	33742	93.81
	300～499 床	68	1	2659	397.15	27006	535.36
	500 床以上	33	103	6117	1239.15	40892	1258.78
	全体	966	1	6117	106.70	103075	364.50
(2) 貧血の急速な補正を必要とする病態に使用	0 床	429	1	584	16.16	6933	42.30
	1～299 床	892	1	1353	49.81	44429	111.01
	300～499 床	69	4	3175	602.46	41570	663.31
	500 床以上	31	5	5214	2110.03	65411	1503.66
	全体	1421	1	5214	111.43	158343	425.62
(3) その他	0 床	27	1	155	12.93	349	29.86
	1～299 床	141	1	1034	67.40	9504	164.10
	300～499 床	33	1	1797	218.39	7207	354.29
	500 床以上	21	1	2232	435.29	9141	653.39
	全体	222	1	2232	118.02	26201	296.69

1-125. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤の診療科別(参考資料 1:診療科分類を参照)に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	97	1	1764	284.69	27615	358.78
	300～499 床	141	1	2222	419.25	59114	416.35
	500 床以上	193	14	5788	780.12	150564	740.85
	全体	432	1	5788	549.29	237294	612.64
(2) 消化器外科	0 床	12	2	25	12.75	153	7.45
	1～299 床	535	1	863	94.90	50774	107.70
	300～499 床	180	1	880	196.07	35292	128.55
	500 床以上	158	43	1847	393.52	62176	278.12
	全体	885	1	1847	167.68	148395	192.10

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 脳神経外科	0 床	3	12	59	29.67	89	25.58
	1～299 床	325	1	334	25.88	8412	38.95
	300～499 床	247	1	258	34.35	8485	36.57
	500 床以上	205	1	400	64.58	13239	56.62
	全体	780	1	400	38.75	30225	46.32
(4) 呼吸器外科	0 床	1	24	24	24.00	24	
	1～299 床	63	1	148	23.32	1469	29.05
	300～499 床	125	1	162	23.51	2939	30.12
	500 床以上	159	1	710	52.54	8354	82.16
	全体	348	1	710	36.74	12786	61.31
(5) 整形外科	0 床	15	1	106	16.13	242	27.16
	1～299 床	1041	1	1012	67.23	69987	82.34
	300～499 床	311	2	687	142.90	44443	103.19
	500 床以上	208	5	677	207.09	43074	119.85
	全体	1575	1	1012	100.16	157746	105.50
(6) 産婦人科	0 床	7	2	36	11.00	77	12.58
	1～299 床	323	1	300	16.68	5388	26.74
	300～499 床	252	1	371	60.77	15315	58.12
	500 床以上	205	11	763	192.35	39431	146.00
	全体	787	1	763	76.51	60211	109.52
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	94	1	123	13.04	1226	22.47
	300～499 床	161	1	117	11.86	1909	16.59
	500 床以上	189	1	320	32.97	6232	39.35
	全体	444	1	320	21.10	9367	31.10
(8) 泌尿器科	0 床	28	1	166	16.39	459	32.96
	1～299 床	405	1	507	31.25	12656	44.28
	300～499 床	284	1	297	64.06	18194	49.54
	500 床以上	209	5	876	139.21	29094	105.22
	全体	926	1	876	65.23	60403	77.09

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科	0 床	13	1	79	23.62	307	28.13
	1～299 床	559	1	716	61.04	34123	82.80
	300～499 床	244	1	1374	143.12	34921	157.20
	500 床以上	186	1	2326	243.79	45345	315.14
	全体	1002	1	2326	114.47	114696	182.19
(10) 血液内科	0 床	33	1	264	44.21	1459	67.00
	1～299 床	261	1	4331	182.47	47625	369.46
	300～499 床	181	2	2821	540.20	97776	490.69
	500 床以上	183	42	8030	1305.23	238857	842.79
	全体	658	1	8030	586.20	385717	735.57
(11) 循環器内科	0 床	32	1	35	7.25	232	7.32
	1～299 床	527	1	571	51.19	26978	71.37
	300～499 床	269	1	1210	120.70	32467	156.30
	500 床以上	201	8	2426	247.49	49746	237.02
	全体	1029	1	2426	106.34	109423	160.38
(12) 消化器内科	0 床	59	1	526	22.00	1298	69.17
	1～299 床	704	1	791	82.45	58043	94.72
	300～499 床	264	2	1320	249.40	65841	177.18
	500 床以上	200	10	1091	387.29	77458	187.85
	全体	1227	1	1320	165.15	202640	179.79
(13) 呼吸器内科	0 床	5	2	13	8.40	42	4.88
	1～299 床	225	1	161	20.89	4701	24.73
	300～499 床	191	1	271	43.87	8379	43.57
	500 床以上	182	1	238	63.93	11636	41.66
	全体	603	1	271	41.06	24758	40.87
(14) 腎臓内科	0 床	214	1	137	17.80	3810	23.40
	1～299 床	495	1	880	39.80	19701	62.07
	300～499 床	171	1	627	69.10	11816	75.80
	500 床以上	172	1	467	99.35	17088	79.21
	全体	1052	1	880	49.82	52415	67.75

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 神経内科	0 床	7	1	51	10.43	73	18.08
	1～299 床	122	1	183	14.41	1758	19.90
	300～499 床	134	1	90	11.66	1563	14.12
	500 床以上	165	1	108	16.45	2714	16.04
	全体	428	1	183	14.27	6108	16.79
(16) 膠原病リウマチ科	0 床	2	1	14	7.50	15	9.19
	1～299 床	48	1	49	11.13	534	13.28
	300～499 床	53	1	87	18.30	970	20.42
	500 床以上	100	1	267	37.66	3766	39.86
	全体	203	1	267	26.03	5285	32.65
(17) 内分泌代謝科	0 床	5	1	9	3.00	15	3.39
	1～299 床	92	1	161	14.97	1377	21.90
	300～499 床	108	1	56	13.14	1419	12.36
	500 床以上	140	1	252	14.43	2020	30.05
	全体	345	1	252	14.00	4831	23.27
(18) その他の内科	0 床	229	1	584	25.55	5850	45.68
	1～299 床	1156	1	811	70.76	81804	92.73
	300～499 床	228	1	2040	190.56	43448	279.88
	500 床以上	148	1	2269	163.01	24126	340.06
	全体	1761	1	2269	88.15	155228	167.97
(19) 精神科・心療内科	0 床	27	1	504	36.48	985	96.88
	1～299 床	34	1	149	14.59	496	27.27
	300～499 床	25	1	35	6.92	173	9.64
	500 床以上	67	1	40	5.76	386	7.23
	全体	153	1	504	13.33	2040	43.95
(20) 小児科	0 床	5	2	6	3.00	15	1.73
	1～299 床	51	1	225	25.76	1314	44.90
	300～499 床	113	1	332	19.56	2210	48.75
	500 床以上	165	1	1321	159.67	26346	232.32
	全体	334	1	1321	89.48	29885	180.33

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 腫瘍治療科	0 床	2	5	47	26.00	52	29.70
	1～299 床	26	1	262	45.65	1187	68.27
	300～499 床	38	2	526	89.97	3419	128.87
	500 床以上	71	1	5229	150.17	10662	618.80
	全体	137	1	5229	111.82	15320	452.01
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	113	1	940	70.72	7991	128.37
	300～499 床	165	1	1318	164.05	27069	227.47
	500 床以上	182	3	2467	502.66	91485	477.18
	全体	460	1	2467	275.10	126545	384.12
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	33	1	31	6.33	209	7.52
	300～499 床	53	1	33	5.04	267	6.92
	500 床以上	103	1	213	14.31	1474	25.17
	全体	189	1	213	10.32	1950	19.64
(24) その他の診療科	0 床	61	1	170	28.07	1712	35.30
	1～299 床	319	1	597	41.14	13124	71.05
	300～499 床	175	1	703	51.61	9031	94.73
	500 床以上	139	1	1092	108.25	15047	186.23
	全体	694	1	1092	56.07	38914	110.93

1-126. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤の使用場所別に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	277	1	584	35.88	9938	62.06
	1～299 床	2270	1	3725	142.26	322934	203.87
	300～499 床	254	1	2387	825.33	209633	500.78
	500 床以上	159	43	6625	2268.45	360684	1064.39
	全体	2960	1	6625	305.13	903189	609.64
(2) 外来	0 床	377	1	264	16.29	6140	26.97
	1～299 床	1109	1	1276	43.50	48243	78.49
	300～499 床	230	1	1477	229.99	52898	215.40
	500 床以上	157	31	1568	651.22	102241	353.44
	全体	1873	1	1568	111.86	209522	224.94
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	127	1	311	20.85	2648	39.74
	300～499 床	173	1	783	64.83	11216	89.21
	500 床以上	144	1	993	217.03	31253	198.75
	全体	444	1	993	101.61	45117	151.72
(4) 手術室	0 床	7	1	12	6.14	43	3.39
	1～299 床	603	1	1070	49.27	29711	109.05
	300～499 床	221	1	1787	270.55	59792	336.14
	500 床以上	158	49	7734	1083.23	171150	1042.31
	全体	989	1	7734	263.60	260696	583.94
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	109	2	1100	118.94	12964	143.29
	300～499 床	155	1	1433	238.03	36894	255.98
	500 床以上	145	37	2690	658.67	95507	551.70
	全体	409	1	2690	355.42	145365	436.41
(6) 医療機関外	0 床	72	1	155	16.65	1199	30.99
	1～299 床	28	1	137	17.50	490	32.28
	300～499 床	1	14	14	14.00	14	
	500 床以上						
	全体	101	1	155	16.86	1703	31.04

1-127. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤の患者の入院・外来別に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	272	1	584	37.24	10128	62.78
	1～299 床	2407	1	3993	167.60	403423	257.09
	300～499 床	292	1	6650	1232.90	360007	886.49
	500 床以上	181	92	78952	4267.66	772446	5928.18
	全体	3152	1	78952	490.48	1546004	1760.37
(2) 外来患者	0 床	399	1	264	15.83	6315	26.06
	1～299 床	1198	1	1276	44.78	53648	80.83
	300～499 床	268	1	1662	295.21	79117	262.62
	500 床以上	179	6	2249	804.51	144007	457.64
	全体	2044	1	2249	138.50	283087	285.30
(3) 医療機関外患者	0 床	57	1	155	19.30	1100	34.04
	1～299 床	27	1	137	15.48	418	30.10
	300～499 床	3	6	15	11.67	35	4.93
	500 床以上						
	全体	87	1	155	17.85	1553	32.15

3-5) 赤血球製剤の使用実績について(個別製剤)

1-128. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球製剤種別の集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	61	8.75%	652	23.72%	289	81.41%	204	94.01%	1206	30.01%
2	システムを使用していないので手作業	636	91.25%	2097	76.28%	66	18.59%	13	5.99%	2812	69.99%
	回答施設合計	697		2749		355		217		4018	

1-129. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で**使用した赤血球液の、製剤種別、診療科別**(参考資料 1:診療科分類を参照)、**使用袋(本)数と輸血件数、投与患者平均年齢**、を記入してください。

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	21	2	406	47.52	998	98.36
	300～499 床	33	1	146	15.82	522	30.48
	500 床以上	71	2	439	39.41	2798	95.72
	全体	125	1	439	34.54	4318	84.30
(2) 消化器外科	0 床	2	4	6	5.00	10	1.41
	1～299 床	63	1	183	14.90	939	32.02
	300～499 床	36	1	143	12.39	446	25.96
	500 床以上	54	1	334	20.37	1100	49.26
	全体	155	1	334	16.10	2495	37.59
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	23	1	48	8.91	205	13.65
	300～499 床	26	1	44	6.50	169	9.65
	500 床以上	51	1	164	8.37	427	23.19
	全体	100	1	164	8.01	801	18.37
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	5	1	8	3.60	18	2.70
	300～499 床	5	1	4	2.20	11	1.10
	500 床以上	21	2	33	7.14	150	7.47
	全体	31	1	33	5.77	179	6.52
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	116	1	115	12.97	1505	23.37
	300～499 床	69	1	88	10.96	756	17.97
	500 床以上	53	1	332	14.08	746	45.64
	全体	238	1	332	12.63	3007	28.56

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 産婦人科	0 床	2	1	6	3.50	7	3.54
	1～299 床	17	1	10	3.47	59	2.72
	300～499 床	31	1	32	5.90	183	6.87
	500 床以上	49	2	230	12.63	619	33.70
	全体	99	1	230	8.77	868	24.24
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	8	1	9	3.25	26	2.55
	300～499 床	5	1	4	2.40	12	1.14
	500 床以上	30	1	66	6.03	181	11.89
	全体	43	1	66	5.09	219	10.04
(8) 泌尿器科	0 床	2	2	11	6.50	13	6.36
	1～299 床	34	1	38	6.00	204	7.66
	300～499 床	39	1	35	6.31	246	8.06
	500 床以上	50	1	77	9.64	482	14.78
	全体	125	1	77	7.56	945	11.18
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	71	1	72	8.38	595	12.91
	300～499 床	49	1	64	9.14	448	13.69
	500 床以上	51	1	447	26.76	1365	72.90
	全体	171	1	447	14.08	2408	41.87
(10) 血液内科	0 床	4	5	17	11.00	44	6.38
	1～299 床	32	1	207	23.69	758	43.86
	300～499 床	50	1	310	28.12	1406	58.71
	500 床以上	95	1	1707	78.47	7455	217.35
	全体	181	1	1707	53.39	9663	163.24
(11) 循環器内科	0 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	1～299 床	64	1	123	12.91	826	22.18
	300～499 床	55	1	117	14.75	811	24.93
	500 床以上	62	1	112	11.82	733	18.39
	全体	183	1	123	12.97	2374	21.70

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 消化器内科	0 床	5	2	74	19.40	97	30.71
	1～299 床	78	1	239	17.04	1329	33.12
	300～499 床	57	1	172	19.79	1128	36.76
	500 床以上	68	1	445	23.66	1609	62.17
	全体	208	1	445	20.01	4163	45.28
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	22	1	75	8.50	187	16.38
	300～499 床	22	1	50	7.68	169	12.37
	500 床以上	31	1	82	7.87	244	14.51
	全体	75	1	82	8.00	600	14.32
(14) 腎臓内科	0 床	6	2	29	9.83	59	10.61
	1～299 床	28	1	67	11.75	329	16.95
	300～499 床	21	1	49	10.14	213	12.65
	500 床以上	39	1	109	8.38	327	17.49
	全体	94	1	109	9.87	928	15.84
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	15	1	12	4.20	63	2.96
	300～499 床	8	1	3	1.88	15	0.64
	500 床以上	11	1	10	3.36	37	2.73
	全体	34	1	12	3.38	115	2.63
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	2	8	4.33	13	3.21
	500 床以上	12	1	18	6.50	78	5.55
	全体	15	1	18	6.07	91	5.15
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	9	2	6	3.44	31	1.67
	300～499 床	9	2	23	5.33	48	6.84
	500 床以上	10	1	11	3.90	39	3.63
	全体	28	1	23	4.21	118	4.44

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(18) その他の内科	0 床	7	1	47	16.71	117	17.25
	1～299 床	119	1	111	11.64	1385	14.75
	300～499 床	45	1	199	19.69	886	41.47
	500 床以上	27	1	34	5.26	142	6.67
	全体	198	1	199	12.78	2530	23.44
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床	4	1	7	3.00	12	2.71
	300～499 床	4	2	4	2.50	10	1.00
	500 床以上	7	1	10	2.71	19	3.25
	全体	15	1	10	2.73	41	2.52
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	22	1	90	18.05	397	24.84
	300～499 床	48	1	68	9.17	440	16.47
	500 床以上	123	1	582	63.33	7790	100.49
	全体	193	1	582	44.70	8627	84.67
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	2	2	4	3.00	6	1.41
	300～499 床	3	6	7	6.33	19	0.58
	500 床以上	13	2	123	16.85	219	34.53
	全体	19	2	123	12.95	246	28.82
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	12	1	45	12.92	155	15.73
	300～499 床	21	1	112	17.57	369	27.36
	500 床以上	56	1	212	17.20	963	32.16
	全体	89	1	212	16.71	1487	29.15
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上	10	1	2	1.70	17	0.48
	全体	11	1	3	1.82	20	0.60

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) その他の診療科	0 床	3	4	15	9.00	27	5.57
	1～299 床	34	1	254	26.47	900	63.89
	300～499 床	17	1	130	19.06	324	38.95
	500 床以上	29	1	63	7.86	228	13.46
	全体	83	1	254	17.82	1479	45.50

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	15	1	101	15.67	235	27.95
	300～499 床	24	1	57	7.13	171	14.37
	500 床以上	53	1	248	16.08	852	42.60
	全体	92	1	248	13.67	1258	34.99
(2) 消化器外科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	51	1	70	7.43	379	11.79
	300～499 床	28	1	34	4.21	118	6.48
	500 床以上	41	1	63	6.95	285	11.17
	全体	121	1	70	6.48	784	10.52
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	20	1	28	5.70	114	8.09
	300～499 床	20	1	10	2.75	55	3.01
	500 床以上	41	1	18	3.05	125	3.75
	全体	81	1	28	3.63	294	5.11
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	6	1	11	4.67	28	4.03
	300～499 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500 床以上	15	1	27	4.60	69	6.62
	全体	23	1	27	4.39	101	5.68

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	99	1	60	8.05	797	12.55
	300～499 床	56	1	55	6.05	339	10.66
	500 床以上	42	1	40	3.93	165	6.16
	全体	197	1	60	6.60	1301	11.01
(6) 産婦人科	0 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	1～299 床	15	1	5	1.93	29	1.22
	300～499 床	21	1	9	3.10	65	2.47
	500 床以上	35	1	53	5.09	178	9.20
	全体	73	1	53	3.78	276	6.61
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	5	1	8	2.80	14	3.03
	300～499 床	4	1	2	1.25	5	0.50
	500 床以上	23	1	8	2.30	53	2.03
	全体	32	1	8	2.25	72	2.08
(8) 泌尿器科	0 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	1～299 床	27	1	18	3.59	97	4.40
	300～499 床	31	1	19	3.48	108	4.57
	500 床以上	37	1	65	5.46	202	10.77
	全体	97	1	65	4.23	410	7.50
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	58	1	59	5.40	313	9.25
	300～499 床	36	1	32	5.28	190	7.66
	500 床以上	38	1	268	22.08	839	59.00
	全体	132	1	268	10.17	1342	33.07
(10) 血液内科	0 床	4	2	17	7.50	30	6.56
	1～299 床	27	1	170	20.30	548	40.72
	300～499 床	41	1	163	17.32	710	32.87
	500 床以上	74	1	1844	52.08	3854	216.06
	全体	146	1	1844	35.22	5142	156.19

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 循環器内科	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	49	1	120	8.94	438	20.12
	300～499 床	40	1	48	7.08	283	11.84
	500 床以上	49	1	43	5.61	275	8.57
	全体	140	1	120	7.13	998	14.39
(12) 消化器内科	0 床	4	1	10	4.00	16	4.08
	1～299 床	67	1	91	9.48	635	15.85
	300～499 床	41	1	74	8.56	351	13.66
	500 床以上	51	1	154	10.22	521	22.07
	全体	163	1	154	9.34	1523	17.33
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	20	1	47	5.20	104	10.48
	300～499 床	19	1	24	3.32	63	5.22
	500 床以上	24	1	10	3.04	73	3.06
	全体	63	1	47	3.81	240	6.78
(14) 腎臓内科	0 床	6	1	29	7.50	45	11.24
	1～299 床	24	1	34	7.50	180	9.00
	300～499 床	16	1	43	6.06	97	11.04
	500 床以上	31	1	26	3.87	120	5.33
	全体	77	1	43	5.74	442	8.41
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	15	1	7	2.73	41	2.02
	300～499 床	6	1	3	1.50	9	0.84
	500 床以上	8	1	7	2.13	17	2.10
	全体	29	1	7	2.31	67	1.87
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	4	2.67	8	1.53
	500 床以上	9	1	16	4.56	41	5.98
	全体	12	1	16	4.08	49	5.21

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	8	1	6	2.13	17	1.73
	300～499 床	7	1	19	3.86	27	6.69
	500 床以上	9	1	6	1.78	16	1.64
	全体	24	1	19	2.50	60	3.79
(18) その他の内科	0 床	7	1	19	9.14	64	6.72
	1～299 床	100	1	62	7.12	712	9.64
	300～499 床	38	1	98	7.61	289	16.28
	500 床以上	20	1	17	3.25	65	4.01
	全体	165	1	98	6.85	1130	11.02
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床	4	1	7	2.75	11	2.87
	300～499 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500 床以上	4	1	7	2.50	10	3.00
	全体	11	1	7	2.18	24	2.40
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	20	1	90	13.75	275	22.12
	300～499 床	41	1	68	7.85	322	15.90
	500 床以上	88	1	513	63.89	5622	98.46
	全体	149	1	513	41.74	6219	80.90
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	300～499 床	2	3	3	3.00	6	0.00
	500 床以上	11	1	120	13.09	144	35.49
	全体	16	1	120	9.69	155	29.45
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	9	1	27	7.67	69	10.72
	300～499 床	16	1	47	9.88	158	14.54
	500 床以上	45	1	90	7.60	342	14.04
	全体	70	1	90	8.13	569	13.63

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上	8	1	1	1.00	8	0.00
	全体	9	1	3	1.22	11	0.67
(24) その他の診療科	0 床	3	3	4	3.33	10	0.58
	1～299 床	27	1	198	15.93	430	41.63
	300～499 床	14	1	61	8.86	124	19.51
	500 床以上	20	1	57	6.05	121	12.66
	全体	64	1	198	10.70	685	29.39

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	14	2	89	65.36	915	27.42
	300～499 床	17	46	92	71.24	1211	10.08
	500 床以上	46	1	87	52.93	2435	29.01
	全体	77	1	92	59.23	4561	26.67
(2) 消化器外科	0 床	1	49	49	49.00	49	
	1～299 床	43	48	98	76.05	3270	9.64
	300～499 床	21	52	89	73.48	1543	9.22
	500 床以上	36	1	84	61.03	2197	22.54
	全体	101	1	98	69.89	7059	16.90
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	15	3	93	67.73	1016	21.43
	300～499 床	15	2	89	66.87	1003	23.36
	500 床以上	34	1	91	43.21	1469	34.49
	全体	64	1	93	54.50	3488	31.52

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	3	70	89	81.00	243	9.85
	300～499 床	1	71	71	71.00	71	
	500 床以上	15	2	85	61.67	925	23.79
	全体	19	2	89	65.21	1239	22.47
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	79	52	96	81.22	6416	9.15
	300～499 床	42	49	97	82.21	3453	8.50
	500 床以上	37	6	94	69.03	2554	20.98
	全体	158	6	97	78.63	12423	13.78
(6) 産婦人科	0 床	2	64	71	67.50	135	4.95
	1～299 床	12	31	55	40.58	487	7.93
	300～499 床	18	29	82	58.11	1046	14.13
	500 床以上	32	4	87	53.56	1714	17.51
	全体	64	4	87	52.84	3382	16.11
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	4	3	96	68.00	272	43.58
	300～499 床	2	68	74	71.00	142	4.24
	500 床以上	21	2	87	58.62	1231	26.43
	全体	27	2	96	60.93	1645	27.87
(8) 泌尿器科	0 床	2	71	88	79.50	159	12.02
	1～299 床	23	63	94	79.17	1821	8.16
	300～499 床	23	61	92	78.00	1794	7.45
	500 床以上	32	17	94	74.44	2382	15.32
	全体	80	17	94	76.95	6156	11.51
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	45	1	96	73.69	3316	21.28
	300～499 床	27	1	89	64.19	1733	23.27
	500 床以上	32	1	87	57.38	1836	27.66
	全体	104	1	96	66.20	6885	24.70

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) 血液内科	0 床	4	74	87	80.50	322	6.95
	1～299 床	21	4	90	68.62	1441	27.55
	300～499 床	32	3	83	70.19	2246	13.86
	500 床以上	64	31	92	68.34	4374	11.48
	全体	121	3	92	69.28	8383	15.86
(11) 循環器内科	0 床	2	85	92	88.50	177	4.95
	1～299 床	45	1	99	76.87	3459	21.99
	300～499 床	29	47	96	78.59	2279	11.38
	500 床以上	44	48	100	77.80	3423	12.50
	全体	120	1	100	77.82	9338	16.38
(12) 消化器内科	0 床	4	70	82	75.25	301	5.12
	1～299 床	53	48	95	78.04	4136	9.85
	300～499 床	26	46	90	76.23	1982	11.11
	500 床以上	43	40	91	71.63	3080	9.11
	全体	126	40	95	75.39	9499	10.07
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	17	40	90	74.18	1261	12.14
	300～499 床	16	67	94	78.13	1250	7.63
	500 床以上	22	50	91	71.91	1582	9.57
	全体	55	40	94	74.42	4093	10.11
(14) 腎臓内科	0 床	6	53	88	70.50	423	12.85
	1～299 床	18	60	90	75.78	1364	7.62
	300～499 床	12	4	85	66.75	801	21.39
	500 床以上	26	55	95	72.35	1881	9.52
	全体	62	4	95	72.08	4469	12.62
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	12	9	86	62.00	744	27.03
	300～499 床	5	6	92	61.60	308	34.15
	500 床以上	8	53	86	72.25	578	11.23
	全体	25	6	92	65.20	1630	24.30

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	71	83	77.33	232	6.03
	500 床以上	9	48	77	61.89	557	11.62
	全体	12	48	83	65.75	789	12.40
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	6	45	87	72.33	434	16.97
	300～499 床	6	7	77	56.67	340	26.97
	500 床以上	8	53	90	71.38	571	12.19
	全体	20	7	90	67.25	1345	19.30
(18) その他の内科	0 床	7	68	89	80.29	562	7.99
	1～299 床	80	52	99	81.45	6516	8.45
	300～499 床	30	6	92	76.50	2295	15.32
	500 床以上	17	37	89	74.18	1261	14.28
	全体	134	6	99	79.36	10634	11.36
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床	3	85	87	86.00	258	1.00
	300～499 床	4	34	77	64.00	256	20.12
	500 床以上	4	22	70	51.00	204	20.49
	全体	11	22	87	65.27	718	21.42
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	13	1	44	9.15	119	12.04
	300～499 床	15	1	23	4.27	64	5.62
	500 床以上	53	1	17	3.23	171	2.93
	全体	81	1	44	4.37	354	6.12
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	78	78	78.00	78	
	1～299 床	2	45	71	58.00	116	18.38
	300～499 床	2	73	82	77.50	155	6.36
	500 床以上	9	4	79	54.78	493	21.18
	全体	14	4	82	60.14	842	19.92

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	4	66	84	74.25	297	8.66
	300～499 床	11	61	88	75.82	834	7.93
	500 床以上	40	1	94	53.20	2128	26.52
	全体	55	1	94	59.25	3259	24.97
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	6	52	83	67.33	404	12.04
	全体	6	52	83	67.33	404	12.04
(24) その他の診療科	0 床	3	67	83	76.00	228	8.19
	1～299 床	19	2	92	72.58	1379	25.95
	300～499 床	7	62	75	69.86	489	3.98
	500 床以上	14	1	85	55.79	781	27.99
	全体	43	1	92	66.91	2877	24.49

1-129. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で**使用した赤血球液の、製剤種別、診療科別**(参考資料 1:診療科分類を参照)、**使用袋(本)数と輸血件数、投与患者平均年齢**、を記入してください。

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	55	1	1670	288.87	15888	371.33
	300～499 床	98	1	1833	437.04	42830	395.40
	500 床以上	168	14	5786	805.98	135404	850.38
	全体	321	1	5786	604.74	194122	703.61
(2) 消化器外科	0 床	2	6	10	8.00	16	2.83
	1～299 床	179	1	497	99.55	17819	96.75
	300～499 床	126	1	659	200.31	25239	118.90
	500 床以上	137	38	1842	402.96	55205	297.88
	全体	444	1	1842	221.35	98279	226.97
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	138	1	293	26.01	3589	38.83
	300～499 床	179	1	181	31.06	5560	31.51
	500 床以上	181	1	391	63.52	11497	57.09
	全体	498	1	391	41.46	20646	47.27
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	26	1	115	20.38	530	24.21
	300～499 床	93	1	162	23.54	2189	28.76
	500 床以上	138	1	381	48.01	6626	60.78
	全体	257	1	381	36.36	9345	49.90
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	359	1	773	74.47	26734	82.30
	300～499 床	229	3	619	136.14	31175	100.21
	500 床以上	183	1	898	210.00	38430	129.25
	全体	771	1	898	124.95	96339	114.09

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 産婦人科	0 床	2	2	6	4.00	8	2.83
	1～299 床	112	1	100	18.43	2064	21.46
	300～499 床	190	1	265	57.34	10895	49.99
	500 床以上	180	5	763	193.11	34760	154.32
	全体	484	1	763	98.61	47727	124.24
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	52	1	142	13.29	691	24.81
	300～499 床	119	1	117	12.76	1519	17.62
	500 床以上	167	1	187	30.41	5079	33.14
	全体	338	1	187	21.57	7289	28.63
(8) 泌尿器科	0 床	3	6	15	10.33	31	4.51
	1～299 床	171	1	499	34.49	5898	50.81
	300～499 床	209	1	297	61.96	12950	49.79
	500 床以上	184	12	525	136.21	25063	83.34
	全体	567	1	525	77.50	43942	75.66
(9) その他の外科	0 床	2	2	8	5.00	10	4.24
	1～299 床	235	1	714	70.41	16547	89.09
	300～499 床	187	1	658	132.67	24809	124.36
	500 床以上	168	1	2326	247.96	41658	339.92
	全体	592	1	2326	140.24	83024	214.42
(10) 血液内科	0 床	8	1	264	65.38	523	98.74
	1～299 床	122	2	4321	242.97	29642	482.61
	300～499 床	135	2	2708	547.74	73945	486.04
	500 床以上	162	2	6958	1312.33	212598	843.44
	全体	427	1	6958	741.70	316708	790.61
(11) 循環器内科	0 床	7	1	33	13.00	91	11.73
	1～299 床	211	1	452	58.18	12276	67.22
	300～499 床	200	1	1176	114.41	22882	151.26
	500 床以上	175	9	2424	261.38	45742	254.64
	全体	593	1	2424	136.58	80991	188.40

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 消化器内科	0 床	4	4	452	119.00	476	222.04
	1～299 床	242	1	956	107.87	26105	106.74
	300～499 床	195	1	1320	244.77	47730	177.01
	500 床以上	178	10	1083	394.87	70287	194.84
	全体	619	1	1320	233.60	144598	197.98
(13) 呼吸器内科	0 床	2	8	9	8.50	17	0.71
	1～299 床	101	1	102	20.88	2109	21.11
	300～499 床	141	1	271	45.32	6390	44.67
	500 床以上	159	1	238	65.06	10344	42.84
	全体	403	1	271	46.80	18860	42.85
(14) 腎臓内科	0 床	10	1	29	12.20	122	11.68
	1～299 床	147	1	238	35.93	5281	39.62
	300～499 床	127	1	627	69.09	8774	85.81
	500 床以上	150	1	467	100.21	15031	82.22
	全体	434	1	627	67.30	29208	76.03
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	53	1	48	12.53	664	11.67
	300～499 床	106	1	112	11.42	1211	15.55
	500 床以上	145	1	103	16.49	2391	16.35
	全体	304	1	112	14.03	4266	15.48
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	22	1	75	12.23	269	18.21
	300～499 床	41	1	86	16.63	682	19.00
	500 床以上	87	1	267	41.21	3585	40.76
	全体	150	1	267	30.24	4536	35.66
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	42	1	48	11.29	474	12.29
	300～499 床	83	1	94	13.22	1097	14.45
	500 床以上	128	1	252	15.63	2000	31.69
	全体	253	1	252	14.11	3571	24.52

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(18) その他の内科	0 床	16	1	58	11.50	184	16.42
	1～299 床	318	1	641	84.91	27000	97.73
	300～499 床	168	1	1587	182.79	30708	271.66
	500 床以上	127	1	2269	158.14	20084	328.38
	全体	629	1	2269	123.97	77976	219.87
(19) 精神科・心療内科	0 床	2	1	46	23.50	47	31.82
	1～299 床	12	2	93	18.00	216	24.67
	300～499 床	20	1	32	5.50	110	7.38
	500 床以上	60	1	40	5.68	341	7.43
	全体	94	1	93	7.60	714	12.32
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	29	1	171	24.41	708	40.55
	300～499 床	74	1	332	18.23	1349	52.09
	500 床以上	138	1	983	123.08	16985	183.51
	全体	241	1	983	79.01	19042	151.18
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	43	43	43.00	43	
	1～299 床	15	1	262	45.13	677	68.00
	300～499 床	26	2	520	113.27	2945	140.47
	500 床以上	62	1	5171	162.08	10049	654.15
	全体	104	1	5171	131.87	13714	510.54
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	59	1	391	57.02	3364	80.05
	300～499 床	127	1	1318	152.77	19402	225.58
	500 床以上	155	3	2369	521.16	80780	489.49
	全体	341	1	2369	303.65	103546	411.22
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	13	1	14	3.15	41	3.56
	300～499 床	36	1	33	5.42	195	7.21
	500 床以上	92	1	201	15.05	1385	27.92
	全体	141	1	201	11.50	1621	23.35

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《使用袋（本）数 単位：袋（本）》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) その他の診療科	0 床	6	2	29	8.67	52	10.15
	1～299 床	119	1	382	34.76	4137	62.19
	300～499 床	127	1	771	56.70	7201	117.50
	500 床以上	122	1	1089	107.52	13117	202.48
	全体	374	1	1089	65.53	24507	141.93

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	36	1	502	89.92	3237	124.82
	300～499 床	61	1	1081	170.43	10396	217.22
	500 床以上	113	11	1268	251.35	28402	223.78
	全体	210	1	1268	200.17	42035	216.24
(2) 消化器外科	0 床	1	10	10	10.00	10	
	1～299 床	143	1	434	62.70	8966	73.20
	300～499 床	92	2	463	127.20	11702	87.56
	500 床以上	95	12	827	220.48	20946	146.57
	全体	331	1	827	125.75	41624	122.01
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	108	1	124	15.71	1697	20.85
	300～499 床	126	1	133	22.67	2856	23.43
	500 床以上	122	1	310	39.52	4821	41.12
	全体	356	1	310	26.33	9374	31.62
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	21	1	115	16.52	347	25.59
	300～499 床	64	1	77	16.80	1075	18.96
	500 床以上	95	1	164	25.54	2426	28.74
	全体	180	1	164	21.38	3848	25.55

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	301	1	332	52.03	15661	54.50
	300～499 床	163	3	542	106.85	17417	89.30
	500 床以上	124	1	582	141.55	17552	93.02
	全体	588	1	582	86.11	50630	83.04
(6) 産婦人科	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	94	1	96	11.89	1118	15.32
	300～499 床	131	1	198	33.67	4411	33.62
	500 床以上	120	2	524	106.07	12728	85.66
	全体	347	1	524	52.62	18259	67.85
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	37	1	112	9.03	334	19.30
	300～499 床	83	1	95	8.72	724	13.29
	500 床以上	114	1	129	21.19	2416	24.36
	全体	234	1	129	14.85	3474	21.12
(8) 泌尿器科	0 床	3	2	10	5.00	15	4.36
	1～299 床	138	1	462	23.62	3259	43.60
	300～499 床	151	1	218	45.56	6879	41.59
	500 床以上	124	6	369	87.12	10803	58.84
	全体	416	1	462	50.38	20956	54.26
(9) その他の外科	0 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	1～299 床	195	1	455	46.08	8986	57.47
	300～499 床	132	1	801	93.31	12317	112.94
	500 床以上	109	1	736	124.71	13593	125.76
	全体	438	1	801	79.68	34901	101.45
(10) 血液内科	0 床	8	1	257	54.88	439	92.66
	1～299 床	102	1	4321	241.94	24678	510.26
	300～499 床	95	2	2638	452.48	42986	481.10
	500 床以上	111	1	2685	997.62	110736	622.88
	全体	316	1	4321	565.95	178839	631.19

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 循環器内科	0 床	7	1	17	7.86	55	6.74
	1～299 床	162	1	199	36.27	5876	36.76
	300～499 床	141	1	428	63.67	8977	61.38
	500 床以上	117	9	725	146.47	17137	120.76
	全体	427	1	725	75.05	32045	88.37
(12) 消化器内科	0 床	3	2	4	3.00	9	1.00
	1～299 床	198	1	423	74.19	14690	75.17
	300～499 床	135	1	540	160.79	21707	112.30
	500 床以上	119	40	672	253.88	30212	135.18
	全体	455	1	672	146.41	66618	128.15
(13) 呼吸器内科	0 床	2	4	9	6.50	13	3.54
	1～299 床	80	1	72	14.34	1147	15.00
	300～499 床	98	1	193	32.35	3170	30.78
	500 床以上	107	1	135	47.29	5060	29.46
	全体	287	1	193	32.72	9390	29.73
(14) 腎臓内科	0 床	10	1	29	9.50	95	11.62
	1～299 床	114	1	221	27.73	3161	36.05
	300～499 床	94	1	483	52.90	4973	71.67
	500 床以上	103	1	340	76.58	7888	65.25
	全体	321	1	483	50.21	16117	61.40
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	47	1	34	10.00	470	9.76
	300～499 床	75	1	83	9.08	681	11.61
	500 床以上	101	1	89	11.93	1205	11.55
	全体	223	1	89	10.57	2356	11.24
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	18	1	26	7.67	138	8.72
	300～499 床	30	1	75	10.50	315	13.70
	500 床以上	60	1	250	34.40	2064	39.97
	全体	108	1	250	23.31	2517	33.16

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	35	1	35	7.89	276	8.57
	300～499 床	54	1	69	12.28	663	13.57
	500 床以上	85	1	1887	30.44	2587	204.11
	全体	174	1	1887	20.26	3526	142.83
(18) その他の内科	0 床	15	1	42	7.80	117	12.31
	1～299 床	273	1	554	63.48	17330	77.59
	300～499 床	119	1	1303	157.24	18711	249.62
	500 床以上	83	1	2167	135.42	11240	335.92
	全体	490	1	2167	96.73	47398	198.28
(19) 精神科・心療内科	0 床	2	1	46	23.50	47	31.82
	1～299 床	10	1	20	8.30	83	5.70
	300～499 床	10	1	30	6.10	61	9.31
	500 床以上	42	1	31	4.43	186	6.09
	全体	64	1	46	5.89	377	8.33
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	20	1	171	25.65	513	43.53
	300～499 床	47	1	221	10.94	514	33.84
	500 床以上	91	1	805	92.22	8392	136.07
	全体	158	1	805	59.61	9419	112.47
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	6	6	6.00	6	
	1～299 床	13	1	170	32.62	424	44.69
	300～499 床	17	3	468	103.76	1764	131.31
	500 床以上	46	1	401	64.24	2955	87.95
	全体	77	1	468	66.87	5149	95.30
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	45	1	145	26.64	1199	34.70
	300～499 床	82	1	351	72.60	5953	84.76
	500 床以上	103	3	1085	239.07	24624	223.48
	全体	230	1	1085	138.16	31776	183.25

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《輸血件数 単位：件》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	8	1	14	2.88	23	4.52
	300～499 床	22	1	8	2.77	61	2.27
	500 床以上	61	1	131	11.00	671	21.26
	全体	91	1	131	8.30	755	17.87
(24) その他の診療科	0 床	5	1	8	4.00	20	2.92
	1～299 床	94	1	327	24.82	2333	48.76
	300～499 床	90	1	624	36.19	3257	86.59
	500 床以上	83	1	906	70.51	5852	136.44
	全体	272	1	906	42.14	11462	96.44

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	31	2	93	67.87	2104	22.53
	300～499 床	49	55	81	72.69	3562	4.99
	500 床以上	104	23	80	68.88	7163	8.88
	全体	184	2	93	69.72	12829	11.73
(2) 消化器外科	0 床	1	88	88	88.00	88	
	1～299 床	120	58	89	75.99	9119	5.52
	300～499 床	76	30	79	72.83	5535	5.59
	500 床以上	87	7	80	69.87	6079	7.84
	全体	284	7	89	73.31	20821	6.87
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	83	3	91	71.92	5969	16.40
	300～499 床	102	2	87	72.72	7417	9.24
	500 床以上	109	38	84	65.74	7166	9.05
	全体	294	2	91	69.90	20552	12.05

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	15	52	88	73.07	1096	8.94
	300～499 床	55	38	87	72.42	3983	8.42
	500 床以上	87	44	83	68.74	5980	6.40
	全体	157	38	88	70.44	11059	7.61
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	239	53	95	81.97	19591	7.34
	300～499 床	132	12	93	80.25	10593	7.73
	500 床以上	112	52	86	74.06	8295	6.89
	全体	483	12	95	79.67	38479	7.99
(6) 産婦人科	0 床	2	64	77	70.50	141	9.19
	1～299 床	78	17	82	48.22	3761	13.34
	300～499 床	104	23	73	49.74	5173	8.96
	500 床以上	110	29	76	51.74	5691	6.50
	全体	294	17	82	50.22	14766	9.79
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	26	39	90	71.46	1858	13.21
	300～499 床	68	1	88	70.63	4803	14.08
	500 床以上	101	38	88	68.11	6879	9.07
	全体	195	1	90	69.44	13540	11.63
(8) 泌尿器科	0 床	3	70	75	73.00	219	2.65
	1～299 床	109	53	94	78.36	8541	6.60
	300～499 床	122	58	90	75.86	9255	4.81
	500 床以上	112	53	81	72.17	8083	4.72
	全体	346	53	94	75.43	26098	5.94
(9) その他の外科	0 床	1	58	58	58.00	58	
	1～299 床	150	1	93	72.89	10934	11.59
	300～499 床	109	6	90	70.94	7732	8.96
	500 床以上	98	21	79	66.15	6483	8.51
	全体	358	1	93	70.41	25207	10.40

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) 血液内科	0 床	7	76	91	84.57	592	6.08
	1～299 床	82	9	94	75.39	6182	15.49
	300～499 床	75	11	84	70.55	5291	12.22
	500 床以上	101	48	87	68.01	6869	6.49
	全体	265	9	94	71.45	18934	12.10
(11) 循環器内科	0 床	7	73	92	85.00	595	5.83
	1～299 床	131	1	98	78.97	10345	13.33
	300～499 床	116	6	93	77.95	9042	8.76
	500 床以上	107	51	84	75.34	8061	5.04
	全体	361	1	98	77.68	28043	10.00
(12) 消化器内科	0 床	3	70	77	73.67	221	3.51
	1～299 床	166	6	95	76.32	12669	8.59
	300～499 床	110	49	82	73.76	8114	4.42
	500 床以上	109	57	83	71.30	7772	3.82
	全体	388	6	95	74.16	28776	6.74
(13) 呼吸器内科	0 床	2	74	85	79.50	159	7.78
	1～299 床	70	62	97	78.99	5529	7.76
	300～499 床	83	65	90	75.60	6275	5.35
	500 床以上	97	61	81	71.90	6974	4.45
	全体	252	61	97	75.15	18937	6.49
(14) 腎臓内科	0 床	10	65	91	74.60	746	9.54
	1～299 床	92	37	90	74.77	6879	7.56
	300～499 床	68	4	90	73.54	5001	9.74
	500 床以上	95	53	82	70.97	6742	5.83
	全体	265	4	91	73.09	19368	7.86
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	40	9	94	70.48	2819	19.34
	300～499 床	60	18	93	73.32	4399	13.49
	500 床以上	91	37	91	71.19	6478	8.22
	全体	191	9	94	71.71	13696	12.91

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	16	60	93	75.75	1212	8.70
	300～499 床	24	40	82	73.33	1760	8.97
	500 床以上	59	39	83	68.36	4033	7.43
	全体	99	39	93	70.76	7005	8.50
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	28	62	93	79.86	2236	7.47
	300～499 床	49	9	99	74.06	3629	12.15
	500 床以上	79	50	88	71.18	5623	8.55
	全体	156	9	99	73.64	11488	10.11
(18) その他の内科	0 床	15	52	91	75.80	1137	10.52
	1～299 床	220	56	97	79.50	17491	6.42
	300～499 床	92	12	91	73.84	6793	10.39
	500 床以上	76	28	84	70.28	5341	10.28
	全体	403	12	97	76.33	30762	9.18
(19) 精神科・心療内科	0 床	2	70	77	73.50	147	4.95
	1～299 床	9	47	85	70.56	635	13.42
	300～499 床	9	34	80	66.67	600	14.53
	500 床以上	39	14	83	59.69	2328	15.42
	全体	59	14	85	62.88	3710	15.24
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	16	2	52	20.81	333	16.63
	300～499 床	29	1	77	21.55	625	20.76
	500 床以上	68	1	34	8.01	545	5.38
	全体	113	1	77	13.30	1503	14.31
(21) 腫瘍治療科	0 床	1	80	80	80.00	80	
	1～299 床	11	51	79	65.09	716	9.75
	300～499 床	17	56	76	67.59	1149	5.94
	500 床以上	42	52	73	64.43	2706	4.87
	全体	71	51	80	65.51	4651	6.35

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

《投与患者平均年齢 単位：才》

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	29	26	89	72.52	2103	11.26
	300～499 床	63	7	86	71.25	4489	9.87
	500 床以上	93	43	85	68.26	6348	7.46
	全体	185	7	89	69.95	12940	9.11
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	6	37	88	65.83	395	17.75
	300～499 床	21	36	90	71.76	1507	15.67
	500 床以上	57	40	91	69.39	3955	9.37
	全体	84	36	91	69.73	5857	11.82
(24) その他の診療科	0 床	5	67	93	74.60	373	10.92
	1～299 床	71	3	101	71.20	5055	19.52
	300～499 床	64	34	90	72.45	4637	9.52
	500 床以上	67	47	90	69.31	4644	8.84
	全体	207	3	101	71.06	14709	13.66

1-130. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した赤血球液の、製剤種別、使用場所別に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	6	1	74	23.33	140	28.66
	1～299 床	293	1	427	21.95	6431	45.03
	300～499 床	134	1	705	35.54	4763	93.69
	500 床以上	139	1	803	82.08	11409	120.13
	全体	572	1	803	39.76	22743	84.75
(2) 外来	0 床	12	1	13	5.17	62	3.79
	1～299 床	69	1	163	8.12	560	20.29
	300～499 床	57	1	101	13.05	744	19.24
	500 床以上	70	1	1720	45.84	3209	204.62
	全体	208	1	1720	22.00	4575	120.36

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	9	2	112	14.78	133	36.48
	300～499 床	16	1	15	6.69	107	4.42
	500 床以上	22	1	45	7.45	164	9.99
	全体	47	1	112	8.60	404	17.11
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	43	1	364	26.93	1158	71.02
	300～499 床	45	1	71	9.87	444	14.26
	500 床以上	70	1	374	30.40	2128	67.98
	全体	158	1	374	23.61	3730	59.29
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	19	1	251	27.74	527	61.69
	300～499 床	42	1	120	12.81	538	22.99
	500 床以上	75	1	179	32.44	2433	43.12
	全体	136	1	251	25.72	3498	42.01
(6) 医療機関外	0 床	10	1	26	7.30	73	7.35
	1～299 床	1	18	18	18.00	18	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	11	1	26	8.27	91	7.68

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	13	1	452	66.46	864	120.45
	1～299 床	521	1	3667	238.36	124188	270.09
	300～499 床	204	2	2382	835.19	170379	487.42
	500 床以上	153	260	5552	2186.79	334579	956.21
	全体	891	1	5552	707.08	630010	876.32
(2) 外来	0 床	26	1	264	29.96	779	58.78
	1～299 床	326	1	1273	73.86	24078	117.23
	300～499 床	187	1	1431	238.72	44641	217.92
	500 床以上	150	5	2213	637.61	95641	368.38
	全体	689	1	2213	239.68	165139	313.14
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	81	1	284	21.88	1772	43.00
	300～499 床	147	1	783	63.50	9335	91.90
	500 床以上	135	1	927	215.70	29120	191.27
	全体	363	1	927	110.82	40227	155.37
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	245	1	1014	65.25	15987	129.79
	300～499 床	183	2	1684	271.05	49602	322.98
	500 床以上	150	38	6972	1076.78	161517	968.16
	全体	578	1	6972	392.92	227106	673.76
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	61	2	494	110.89	6764	100.08
	300～499 床	128	1	1430	233.63	29905	251.80
	500 床以上	139	37	2539	638.24	88715	524.67
	全体	328	1	2539	382.27	125384	439.17
(6) 医療機関外	0 床	13	1	48	12.15	158	16.73
	1～299 床	3	1	119	45.00	135	64.47
	300～499 床	2	14	16	15.00	30	1.41
	500 床以上						
	全体	18	1	119	17.94	323	29.02

1-131. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球液を使用した患者の製剤種別、入院・外来別に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 人赤血球液（赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	6	1	74	30.33	182	28.12
	1～299 床	300	1	792	29.22	8766	79.17
	300～499 床	148	1	756	39.57	5857	105.61
	500 床以上	149	1	1265	111.43	16603	182.69
	全体	603	1	1265	52.09	31408	123.39
(2) 外来患者	0 床	14	1	264	24.14	338	69.14
	1～299 床	75	1	166	10.00	750	24.27
	300～499 床	65	1	101	12.32	801	18.77
	500 床以上	79	1	332	30.48	2408	48.70
	全体	233	1	332	18.44	4297	37.89
(3) 医療機関外患者	0 床	3	1	6	3.33	10	2.52
	1～299 床	1	18	18	18.00	18	
	300～499 床	1	13	13	13.00	13	
	500 床以上	1	16	16	16.00	16	
	全体	6	1	18	9.50	57	7.12

【(2) 人赤血球液（赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	13	1	452	67.92	883	119.70
	1～299 床	545	1	3929	299.74	163358	342.59
	300～499 床	223	2	4327	1225.39	273261	788.41
	500 床以上	167	438	28848	3943.13	658503	2837.12
	全体	948	1	28848	1156.12	1096005	1852.97
(2) 外来患者	0 床	31	1	264	26.94	835	54.37
	1～299 床	359	1	1272	75.24	27011	117.80
	300～499 床	210	1	1658	290.49	61002	248.16
	500 床以上	165	6	3973	804.92	132811	508.48
	全体	765	1	3973	289.75	221659	400.89

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床	9	1	48	11.44	103	15.63
	1～299 床	3	1	119	45.00	135	64.47
	300～499 床	1	14	14	14.00	14	
	500 床以上						
	全体	13	1	119	19.38	252	32.70

1-132. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で赤血球製剤を使用した患者の製剤種別に平均年齢を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液・LR-1、照射赤血球液・LR-1 製剤)／才	0 床	20	53	89	74.80	1496	9.97
	1～299 床	222	1	97	75.97	16865	17.55
	300～499 床	99	1	90	68.18	6750	20.17
	500 床以上	101	1	89	42.06	4248	28.58
	全体	442	1	97	66.42	29359	24.90
(2) 人赤血球液(赤血球液・LR-2、照射赤血球液・LR-2 製剤)／才	0 床	43	52	93	75.91	3264	9.77
	1～299 床	400	4	94	75.93	30372	11.42
	300～499 床	143	7	88	73.07	10449	7.03
	500 床以上	118	49	80	67.69	7987	5.94
	全体	704	4	94	73.97	52072	10.23
(3) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液・LR-1、照射洗浄赤血球液・LR-1 製剤)／才	0 床	1	82	82	82.00	82	
	1～299 床	5	4	84	59.40	297	33.11
	300～499 床	2	30	84	57.00	114	38.18
	500 床以上	5	1	51	21.60	108	25.16
	全体	13	1	84	46.23	601	33.89
(4) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液・LR-2、照射洗浄赤血球液・LR-2 製剤)／才	0 床	2	73	78	75.50	151	3.54
	1～299 床	25	10	100	77.84	1946	16.02
	300～499 床	22	28	94	67.27	1480	16.89
	500 床以上	44	17	87	61.61	2711	15.62
	全体	93	10	100	67.61	6288	17.12

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液・LR-1、照射解凍赤血球液・LR-1 製剤)／才	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液・LR-2、照射解凍赤血球液・LR-2 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	2	79	88	83.50	167	6.36
	300～499 床	3	36	80	61.67	185	22.90
	500 床以上	2	65	79	72.00	144	9.90
	全体	7	36	88	70.86	496	17.14
(7) 合成血液・LR-1、照射合成血液・LR-1 製剤／才	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 合成血液・LR-2、照射合成血液・LR-2 製剤／才	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						

3-6) 血小板製剤の使用実績について(全体製剤)

1-133. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血小板製剤を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	80	10.83%	1484	51.01%	396	98.02%	236	100.00%	2196	51.21%
2	使用していない	659	89.17%	1425	48.99%	8	1.98%	0	0.00%	2092	48.79%
	回答施設合計	739		2909		404		236		4288	

1-134. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の総袋（本）数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤) 袋(本)	0 床	4	1	7	3.25	13	2.63
	1～299 床	9	1	17	4.11	37	5.18
	300～499 床	4	1	19	7.25	29	8.50
	500 床以上	7	1	140	24.57	172	51.02
	全体	24	1	140	10.46	251	28.03
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤) 袋(本)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	12	1	189	32.92	395	55.59
	300～499 床	6	1	16	3.83	23	5.98
	500 床以上	8	1	23	5.38	43	7.46
	全体	27	1	189	17.11	462	39.21
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤) 袋(本)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	172	1	246	5.16	888	19.99
	300～499 床	153	1	489	11.82	1808	48.48
	500 床以上	179	1	629	33.58	6010	78.75
	全体	505	1	629	17.24	8707	56.47
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤) 袋(本)	0 床	61	1	73	7.56	461	10.60
	1～299 床	1350	1	4496	46.55	62844	179.93
	300～499 床	388	1	3607	332.44	128986	438.55
	500 床以上	233	17	14083	1511.20	352109	1407.52
	全体	2032	1	14083	267.91	544400	705.12

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)袋(本)	0 床	11	1	5	1.64	18	1.21
	1～299 床	283	1	508	9.25	2617	41.94
	300～499 床	215	1	372	18.53	3983	37.40
	500 床以上	172	1	1205	71.31	12265	152.14
	全体	681	1	1205	27.73	18883	87.47
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)袋(本)	0 床	21	1	108	9.67	203	24.90
	1～299 床	448	1	398	13.79	6179	38.23
	300～499 床	241	1	1147	47.78	11516	113.56
	500 床以上	177	1	1007	102.81	18198	148.73
	全体	887	1	1147	40.69	36096	99.06
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	59	1	78	14.97	883	18.75
	300～499 床	86	1	254	34.35	2954	46.17
	500 床以上	148	1	559	51.89	7680	69.86
	全体	293	1	559	39.31	11517	57.92
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	15	1	67	11.73	176	18.28
	300～499 床	51	1	32	5.25	268	6.56
	500 床以上	84	1	20	4.46	375	4.44
	全体	150	1	67	5.46	819	7.83
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	19	1	292	21.74	413	66.15
	300～499 床	24	1	46	12.42	298	16.02
	500 床以上	43	1	105	15.05	647	23.76
	全体	86	1	292	15.79	1358	35.87
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10 製剤)袋(本)	0 床	2	11	26	18.50	37	10.61
	1～299 床	43	1	415	45.91	1974	85.00
	300～499 床	55	1	232	35.96	1978	43.24
	500 床以上	99	1	370	53.74	5320	77.20
	全体	199	1	415	46.78	9309	71.12

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板・HLA-LR-10 製剤)袋(本)	0 床						
	1～299 床	12	1	45	15.83	190	15.30
	300～499 床	14	1	47	13.43	188	15.41
	500 床以上	32	1	61	12.00	384	15.12
	全体	58	1	61	13.14	762	15.03

【特別集計：血小板製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0 床	78	1	138	9.41	734	18.45
	1～299 床	1462	1	5650	52.39	76596	210.86
	300～499 床	390	1	4006	389.82	152031	486.82
	500 床以上	233	20	14716	1730.48	403203	1519.38
	全体	2163	1	14716	292.45	632564	766.07
血小板製剤総単位数	0 床	78	1	2460	119.62	9330	306.45
	1～299 床	1462	1	62380	573.13	837912	2287.87
	300～499 床	390	10	40245	4231.33	1650220	5234.31
	500 床以上	233	230	146850	18247.80	4251738	15576.06
	全体	2163	1	146850	3120.30	6749200	8006.36

【特別集計：一般病床数あたりの血小板製剤使用量】

一般病床数あたりの血小板製剤使用量（単位）（計算式：血小板製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤／単位	1～299 床	1462	0.0078	495.6667	4.49665	6574.1117	17.49
	300～499 床	390	0.0235	133.7043	11.11237	4333.8249	14.47
	500 床以上	233	0.4545	259.9115	25.72338	5993.5484	21.91
	全体	2085	0.0078	495.6667	8.10622	16901.4850	18.77

1-135. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の使用理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 活動性出血時	0 床	3	1	9	3.67	11	4.62
	1～299 床	60	1	440	13.53	812	57.20
	300～499 床	36	1	232	24.64	887	49.63
	500 床以上	25	2	4345	254.12	6353	859.38
	全体	124	1	4345	65.02	8063	394.34
(2) 血小板減少を呈する処置・外科手術時	0 床	4	1	23	7.00	28	10.71
	1～299 床	140	1	103	6.81	953	14.33
	300～499 床	40	1	453	47.30	1892	90.47
	500 床以上	25	1	2908	375.36	9384	770.12
	全体	209	1	2908	58.65	12257	289.91
(3) 大量輸血時	0 床						
	1～299 床	15	1	66	8.33	125	16.87
	300～499 床	13	1	19	5.00	65	5.07
	500 床以上	8	4	500	75.63	605	171.75
	全体	36	1	500	22.08	795	82.87
(4) 播種性血管内凝固(DIC)	0 床	3	1	3	2.00	6	1.00
	1～299 床	121	1	55	3.78	457	6.35
	300～499 床	29	1	70	11.90	345	15.22
	500 床以上	19	3	200	42.16	801	56.01
	全体	172	1	200	9.35	1609	23.24
(5) 造血器腫瘍(急性白血病、悪性リンパ腫や骨髄腫など)	0 床	10	1	4	1.30	13	0.95
	1～299 床	56	1	520	31.23	1749	83.66
	300～499 床	16	1	904	278.50	4456	303.04
	500 床以上	17	2	1797	694.65	11809	571.74
	全体	99	1	1797	182.09	18027	367.13
(6) 造血不全(再生不良性貧血や骨髄異形成症候群など)	0 床	13	1	45	10.77	140	14.46
	1～299 床	131	1	538	19.79	2592	60.96
	300～499 床	17	1	294	54.24	922	86.32
	500 床以上	17	3	1092	299.76	5096	304.55
	全体	178	1	1092	49.16	8750	136.32

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	0 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	1～299 床	34	1	10	2.03	69	1.77
	300～499 床	9	1	14	3.89	35	4.57
	500 床以上	13	4	54	15.15	197	12.74
	全体	59	1	54	5.15	304	8.22
(8) 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	0 床						
	1～299 床	5	1	2	1.60	8	0.55
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	7	1	2	1.43	10	0.53
(9) 血小板機能異常症	0 床	4	1	7	3.00	12	2.71
	1～299 床	15	1	12	3.27	49	3.79
	300～499 床	2	1	7	4.00	8	4.24
	500 床以上	5	1	53	20.00	100	21.21
	全体	26	1	53	6.50	169	11.26
(10) ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	300～499 床	3	1	8	3.33	10	4.04
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	9	1	8	1.78	16	2.33
(11) 固形腫瘍に対する化学療法時	0 床						
	1～299 床	23	1	62	10.78	248	14.88
	300～499 床	17	1	276	29.24	497	67.34
	500 床以上	12	11	375	96.00	1152	122.11
	全体	52	1	375	36.48	1897	76.70
(12) 自家・同種造血幹細胞移植時	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	2	263	93.33	280	147.08
	500 床以上	10	1	1414	253.70	2537	466.15
	全体	13	1	1414	216.69	2817	414.15

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) その他	0 床	8	1	3	1.50	12	0.93
	1～299 床	62	1	250	11.81	732	39.78
	300～499 床	31	1	306	35.74	1108	56.82
	500 床以上	24	2	3023	353.42	8482	662.70
	全体	125	1	3023	82.67	10334	317.32

1-136. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の診療科別(参考資料 1:診療科分類を参照)に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	73	1	520	76.89	5613	93.06
	300～499 床	127	1	645	97.12	12334	114.60
	500 床以上	191	2	1332	168.14	32114	178.83
	全体	391	1	1332	128.03	50061	151.69
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	273	1	79	9.45	2581	13.06
	300～499 床	163	1	80	14.87	2423	13.57
	500 床以上	155	1	570	50.42	7815	67.60
	全体	591	1	570	21.69	12819	40.26
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	139	1	37	5.87	816	7.02
	300～499 床	160	1	41	6.52	1043	6.94
	500 床以上	189	1	171	11.68	2208	18.44
	全体	488	1	171	8.33	4067	12.97
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	26	1	20	6.85	178	6.17
	300～499 床	66	1	36	5.42	358	6.47
	500 床以上	107	1	136	11.63	1244	20.68
	全体	199	1	136	8.94	1780	16.00

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	264	1	189	3.81	1005	11.96
	300～499 床	218	1	33	4.73	1032	5.14
	500 床以上	188	1	54	8.99	1690	8.32
	全体	670	1	189	5.56	3727	9.43
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	50	1	26	4.44	222	4.99
	300～499 床	143	1	47	6.15	880	6.37
	500 床以上	186	1	82	15.51	2885	15.39
	全体	379	1	82	10.52	3987	12.60
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	12	1	10	2.83	34	2.82
	300～499 床	34	1	32	3.47	118	5.60
	500 床以上	87	1	59	7.09	617	10.86
	全体	133	1	59	5.78	769	9.41
(8) 泌尿器科	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	134	1	44	5.96	799	7.77
	300～499 床	183	1	74	6.84	1252	8.36
	500 床以上	199	1	126	16.51	3285	18.86
	全体	517	1	126	10.33	5339	14.17
(9) その他の外科	0 床	5	1	9	3.00	15	3.39
	1～299 床	239	1	81	8.03	1920	11.68
	300～499 床	184	1	300	16.52	3039	25.65
	500 床以上	162	1	1505	49.10	7955	129.00
	全体	590	1	1505	21.91	12929	71.43
(10) 血液内科	0 床	11	1	73	18.82	207	21.48
	1～299 床	193	1	5202	175.51	33874	492.79
	300～499 床	156	1	1994	477.03	74416	481.48
	500 床以上	182	10	13904	1348.19	245371	1334.56
	全体	542	1	13904	652.89	353868	1004.75

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 循環器内科	0 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	1～299 床	178	1	128	9.04	1609	16.91
	300～499 床	185	1	113	13.52	2501	18.88
	500 床以上	188	1	325	28.74	5403	36.85
	全体	553	1	325	17.21	9518	27.25
(12) 消化器内科	0 床	5	1	17	4.20	21	7.16
	1～299 床	268	1	105	7.57	2028	12.42
	300～499 床	201	1	160	12.37	2486	15.27
	500 床以上	192	1	206	22.98	4413	24.21
	全体	666	1	206	13.44	8948	18.49
(13) 呼吸器内科	0 床	37	0	3	0.32	12	0.75
	1～299 床	438	0	250	1.67	732	15.42
	300～499 床	62	0	306	17.87	1108	43.73
	500 床以上	27	0	3023	314.15	8482	633.49
	全体	564	0	3023	18.32	10334	152.84
(14) 腎臓内科	0 床	6	1	20	7.50	45	7.40
	1～299 床	97	1	73	8.57	831	13.78
	300～499 床	100	1	68	7.77	777	10.98
	500 床以上	130	1	414	15.92	2069	38.37
	全体	333	1	414	11.18	3722	26.04
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	34	1	9	3.53	120	2.34
	300～499 床	50	1	31	4.18	209	5.28
	500 床以上	84	1	36	4.64	390	5.38
	全体	168	1	36	4.28	719	4.88
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	24	1	54	6.42	154	11.12
	300～499 床	32	1	59	7.78	249	11.99
	500 床以上	83	1	234	23.00	1909	33.69
	全体	139	1	234	16.63	2312	28.07

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	22	1	20	5.73	126	6.31
	300～499 床	39	1	30	4.85	189	6.03
	500 床以上	50	1	172	7.44	372	25.52
	全体	111	1	172	6.19	687	17.65
(18) その他の内科	0 床	33	1	23	4.67	154	5.35
	1～299 床	493	1	459	15.87	7826	39.05
	300～499 床	156	1	2066	55.47	8654	178.63
	500 床以上	105	1	1287	65.23	6849	181.50
	全体	787	1	2066	29.84	23483	109.79
(19) 精神科・心療内科	0 床	2	1	8	4.50	9	4.95
	1～299 床	2	2	90	46.00	92	62.23
	300～499 床	4	1	3	1.75	7	0.96
	500 床以上	15	1	7	2.13	32	1.73
	全体	23	1	90	6.09	140	18.39
(20) 小児科	0 床	3	3	13	6.67	20	5.51
	1～299 床	22	1	438	36.09	794	95.37
	300～499 床	50	1	127	16.32	816	31.74
	500 床以上	145	1	1830	176.24	25555	292.63
	全体	220	1	1830	123.57	27185	250.65
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	10	1	30	13.20	132	11.60
	300～499 床	26	1	385	59.50	1547	113.29
	500 床以上	51	1	4150	102.80	5243	578.94
	全体	87	1	4150	79.56	6922	446.73
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	42	1	78	13.45	565	19.29
	300～499 床	119	1	251	24.04	2861	39.99
	500 床以上	171	1	587	75.09	12840	91.19
	全体	332	1	587	48.99	16266	74.98

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	4	1	3	1.75	7	0.96
	300～499 床	11	1	4	1.73	19	1.01
	500 床以上	55	1	137	5.05	278	18.21
	全体	70	1	137	4.34	304	16.18
(24) その他の診療科	0 床	5	1	138	32.40	162	59.13
	1～299 床	80	1	145	14.03	1122	28.32
	300～499 床	83	1	249	14.58	1210	31.59
	500 床以上	95	1	616	40.59	3856	88.05
	全体	263	1	616	24.14	6350	59.57

1-137. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の使用場所別に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	47	1	23	5.15	242	5.43
	1～299 床	1184	1	4402	35.45	41972	168.55
	300～499 床	256	1	2154	253.53	64903	368.91
	500 床以上	164	6	5070	1265.50	207542	970.01
	全体	1651	1	5070	190.59	314659	517.74
(2) 外来	0 床	19	1	42	11.74	223	12.42
	1～299 床	299	1	1088	32.02	9575	96.60
	300～499 床	195	1	711	78.51	15309	110.59
	500 床以上	156	1	1227	225.10	35116	205.91
	全体	669	1	1227	90.02	60223	153.42
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	22	1	48	6.36	140	11.36
	300～499 床	81	1	35	4.74	384	6.03
	500 床以上	131	1	662	19.08	2499	60.45
	全体	234	1	662	12.92	3023	45.95
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	149	1	202	17.86	2661	35.72
	300～499 床	168	1	453	45.49	7642	76.57
	500 床以上	159	1	4844	193.48	30763	425.37
	全体	476	1	4844	86.27	41066	261.82
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	82	1	195	24.96	2047	36.06
	300～499 床	154	1	352	49.08	7558	53.92
	500 床以上	150	6	1050	201.29	30194	186.71
	全体	386	1	1050	103.11	39799	145.41
(6) 医療機関外	0 床	12	1	138	21.58	259	41.81
	1～299 床	4	1	59	17.75	71	27.66
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上						
	全体	18	1	138	18.44	332	36.18

1-138. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の患者の入院・外来別に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	48	1	23	5.13	246	5.37
	1～299 床	1265	1	4597	40.20	50851	173.38
	300～499 床	294	1	5190	327.17	96189	476.03
	500 床以上	183	6	6858	1543.19	282403	1156.13
	全体	1790	1	6858	240.05	429689	631.67
(2) 外来患者	0 床	18	1	33	10.17	183	10.23
	1～299 床	309	1	1088	32.42	10019	94.96
	300～499 床	235	1	685	81.98	19265	113.42
	500 床以上	174	1	1227	234.21	40752	209.89
	全体	736	1	1227	95.41	70219	157.19
(3) 医療機関外患者	0 床	10	1	138	29.40	294	44.63
	1～299 床	6	1	8	4.17	25	2.93
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	17	1	138	18.82	320	35.96

3-7) 血小板製剤の使用実績について(個別製剤)

1-139. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤種別の集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	9	7.96%	541	35.15%	300	83.57%	205	94.04%	1055	47.33%
2	システムを使用していないので手作業	104	92.04%	998	64.85%	59	16.43%	13	5.96%	1174	52.67%
	回答施設合計	113		1539		359		218		2229	

1-140. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で**使用した血小板製剤の、製剤種別、診療科別(参考資料 1:診療科分類を参照)に使用袋(本)数**を記入してください。

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	2	1	3	2.00	4	1.41

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	2	1	8	4.50	9	4.95
	300～499 床	3	1	19	7.00	21	10.39
	500 床以上	6	1	9	5.33	32	3.83
	全体	11	1	19	5.64	62	5.68
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	1	140	140	140.00	140	
	全体	2	1	140	70.50	141	98.29

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	2	3	5	4.00	8	1.41
	300～499 床	1	14	14	14.00	14	
	500 床以上						
	全体	3	3	14	7.33	22	5.86
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	1	189	189	189.00	189	
	300～499 床	1	8	8	8.00	8	
	500 床以上						
	全体	2	8	189	98.50	197	127.99
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	1	10	10	10.00	10	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	10	10	10.00	10	
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上						
	全体	2	1	4	2.50	5	2.12
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上						
	全体	2	1	10	5.50	11	6.36

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	7	7	7.00	7	
	500 床以上						
	全体	1	7	7	7.00	7	
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	13	13	13.00	13	
	500 床以上						
	全体	1	13	13	13.00	13	
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上						
	全体	1	10	10	10.00	10	
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	1	9	9	9.00	9	
	500 床以上						
	全体	2	2	9	5.50	11	4.95
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	31	31	31.00	31	
	500 床以上						
	全体	1	31	31	31.00	31	
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	1	17	17	17.00	17	
	300～499 床	1	103	103	103.00	103	
	500 床以上						
	全体	2	17	103	60.00	120	60.81

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	7	1	23	6.00	42	7.83
	全体	9	1	23	5.11	46	7.03
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上						
	全体	1	4	4	4.00	4	
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	10	1	23	4.70	47	6.67
	300～499 床	24	1	20	4.83	116	5.68
	500 床以上	64	1	38	4.36	279	5.80
	全体	98	1	38	4.51	442	5.80
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	7	1	2	1.57	11	0.53
	300～499 床	13	1	2	1.38	18	0.51
	500 床以上	26	1	17	3.19	83	3.92
	全体	46	1	17	2.43	112	3.07
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	5	1	5	2.00	10	1.73
	300～499 床	4	1	6	2.25	9	2.50
	500 床以上	14	1	58	5.93	83	15.03
	全体	23	1	58	4.43	102	11.77
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上	6	1	4	2.00	12	1.10
	全体	9	1	4	1.89	17	0.93
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	7	1	18	3.71	26	6.34
	300～499 床	8	1	3	1.63	13	0.74
	500 床以上	10	1	2	1.30	13	0.48
	全体	25	1	18	2.08	52	3.38
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	5	1	3	1.60	8	0.89
	500 床以上	14	1	7	2.21	31	1.58
	全体	20	1	7	2.00	40	1.41

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	2	1.75	7	0.50
	全体	4	1	2	1.75	7	0.50
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	5	1	2	1.60	8	0.55
	300～499 床	7	1	4	2.14	15	0.90
	500 床以上	16	1	10	2.38	38	2.25
	全体	28	1	10	2.18	61	1.76
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	8	1	8	2.25	18	2.38
	300～499 床	14	1	4	1.71	24	1.07
	500 床以上	20	1	8	2.40	48	1.79
	全体	42	1	8	2.14	90	1.70
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	20	1	193	16.00	320	42.70
	300～499 床	48	1	750	26.42	1268	115.68
	500 床以上	89	1	212	13.55	1206	31.10
	全体	157	1	750	17.80	2794	69.52
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	8	1	4	1.88	15	1.13
	300～499 床	13	1	7	2.31	30	1.70
	500 床以上	29	1	10	2.59	75	2.38
	全体	50	1	10	2.40	120	2.05
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	12	1	4	1.75	21	1.06
	300～499 床	16	1	3	1.56	25	0.73
	500 床以上	19	1	8	2.63	50	1.98
	全体	47	1	8	2.04	96	1.49

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.67	5	0.58
	300～499 床	11	1	4	1.73	19	0.90
	500 床以上	11	1	4	1.82	20	0.98
	全体	25	1	4	1.76	44	0.88
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.67	5	0.58
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上	8	1	3	1.50	12	0.76
	全体	13	1	3	1.54	20	0.66
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	4	1	6	2.50	10	2.38
	全体	6	1	6	2.17	13	1.94
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	8	1	2	1.38	11	0.52
	全体	8	1	2	1.38	11	0.52
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	4	1	6	2.75	11	2.22
	全体	5	1	6	2.40	12	2.07
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	19	1	29	3.26	62	6.30
	300～499 床	12	1	23	3.58	43	6.19
	500 床以上	10	1	4	2.10	21	0.99
	全体	41	1	29	3.07	126	5.38

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	4	2	54	15.00	60	26.00
	300～499 床	8	1	26	5.63	45	8.62
	500 床以上	72	1	488	36.19	2606	83.44
	全体	84	1	488	32.27	2711	77.99
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	2	2	2	2.00	4	0.00
	300～499 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500 床以上	6	1	629	108.00	648	255.26
	全体	10	1	629	65.60	656	197.98
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	9	1	2	1.56	14	0.53
	500 床以上	39	1	22	3.64	142	4.06
	全体	49	1	22	3.22	158	3.72
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	5	1	24	5.60	28	10.29
	300～499 床	5	1	20	5.20	26	8.32
	500 床以上	10	1	13	3.60	36	4.30
	全体	20	1	24	4.50	90	6.82

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	47	1	520	66.45	3123	93.74
	300～499 床	98	1	483	77.05	7551	92.59
	500 床以上	176	1	1096	131.49	23142	153.01
	全体	321	1	1096	105.35	33816	132.32
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	116	1	63	8.29	962	10.96
	300～499 床	125	1	80	13.25	1656	13.05
	500 床以上	143	1	559	43.55	6228	64.64
	全体	384	1	559	23.04	8846	43.53
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	83	1	32	5.42	450	6.77
	300～499 床	125	1	41	5.71	714	6.48
	500 床以上	173	1	127	9.82	1698	14.72
	全体	381	1	127	7.51	2862	11.23
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	18	1	30	5.22	94	7.24
	300～499 床	51	1	35	5.22	266	6.78
	500 床以上	99	1	83	10.54	1043	17.13
	全体	168	1	83	8.35	1403	14.08
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	122	1	23	3.31	404	3.55
	300～499 床	175	1	32	4.08	714	4.74
	500 床以上	169	1	35	8.11	1371	7.43
	全体	466	1	35	5.34	2489	6.01
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	30	1	26	4.77	143	5.14
	300～499 床	112	1	25	5.75	644	5.23
	500 床以上	169	1	81	13.20	2230	13.39
	全体	311	1	81	9.70	3017	11.14

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	6	1	8	3.83	23	2.64
	300～499 床	23	1	32	3.96	91	6.61
	500 床以上	75	1	49	6.76	507	10.63
	全体	104	1	49	5.97	621	9.62
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	78	1	34	5.45	425	7.20
	300～499 床	143	1	72	6.37	911	8.44
	500 床以上	178	1	125	14.22	2531	17.22
	全体	399	1	125	9.69	3867	13.56
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	115	1	81	6.58	757	8.71
	300～499 床	154	1	211	13.97	2152	20.93
	500 床以上	143	1	410	33.67	4815	50.05
	全体	412	1	410	18.75	7724	34.31
(10) 血液内科	0 床	2	1	20	10.50	21	13.44
	1～299 床	108	1	4114	196.27	21197	504.72
	300～499 床	137	1	15000	563.19	77157	1339.97
	500 床以上	166	9	13291	1236.29	205224	1285.59
	全体	413	1	15000	735.11	303599	1229.00
(11) 循環器内科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	98	1	58	6.47	634	9.13
	300～499 床	146	1	109	12.05	1760	17.43
	500 床以上	173	1	158	22.74	3934	28.20
	全体	418	1	158	15.14	6330	22.33
(12) 消化器内科	0 床	1	15	15	15.00	15	
	1～299 床	128	1	58	8.07	1033	10.67
	300～499 床	171	1	138	12.01	2054	16.49
	500 床以上	178	1	140	18.58	3307	18.39
	全体	478	1	140	13.41	6409	16.46

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	55	1	65	7.82	430	10.13
	300～499 床	126	1	59	10.02	1263	11.31
	500 床以上	155	1	55	16.27	2522	12.14
	全体	336	1	65	12.54	4215	12.02
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	46	1	47	6.35	292	9.57
	300～499 床	74	1	68	8.00	592	10.60
	500 床以上	116	1	99	12.01	1393	16.49
	全体	236	1	99	9.65	2277	13.83
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	17	1	7	3.29	56	2.14
	300～499 床	34	1	14	4.18	142	4.00
	500 床以上	74	1	40	5.01	371	6.74
	全体	125	1	40	4.55	569	5.66
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	11	1	17	5.27	58	5.33
	300～499 床	27	1	113	11.63	314	23.65
	500 床以上	76	1	232	19.12	1453	29.72
	全体	114	1	232	16.01	1825	27.20
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	8	1	19	7.00	56	7.67
	300～499 床	30	1	18	3.67	110	3.71
	500 床以上	46	1	166	7.28	335	25.72
	全体	84	1	166	5.96	501	19.27
(18) その他の内科	0 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	1～299 床	179	1	432	18.75	3356	47.76
	300～499 床	123	1	364	40.09	4931	71.73
	500 床以上	98	1	1226	59.71	5852	173.50
	全体	402	1	1226	35.18	14143	100.70

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床	2	2	9	5.50	11	4.95
	300～499 床	5	1	10	3.00	15	3.94
	500 床以上	15	1	53	5.47	82	13.24
	全体	22	1	53	4.91	108	11.05
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	17	1	379	38.00	646	94.40
	300～499 床	41	1	102	11.63	477	24.74
	500 床以上	134	1	1780	172.81	23157	285.38
	全体	192	1	1780	126.46	24280	250.24
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	6	1	17	7.83	47	7.31
	300～499 床	23	1	374	48.48	1115	96.97
	500 床以上	45	1	3370	94.93	4272	500.28
	全体	74	1	3370	73.43	5434	393.10
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	24	1	64	7.79	187	13.36
	300～499 床	94	1	122	17.98	1690	24.75
	500 床以上	158	1	411	67.09	10600	78.00
	全体	276	1	411	45.21	12477	65.92
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	300～499 床	5	1	4	1.80	9	1.30
	500 床以上	45	1	8	2.58	116	1.75
	全体	52	1	8	2.46	128	1.70
(24) その他の診療科	0 床	1	8	8	8.00	8	
	1～299 床	43	1	145	16.07	691	31.23
	300～499 床	67	1	249	12.43	833	33.43
	500 床以上	85	1	568	30.86	2623	73.60
	全体	196	1	568	21.20	4155	54.73

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	16	1	39	7.44	119	9.56
	300～499 床	46	1	25	4.93	227	5.19
	500 床以上	102	1	135	9.49	968	16.86
	全体	164	1	135	8.01	1314	14.00
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	23	1	10	2.17	50	2.19
	300～499 床	33	1	10	2.45	81	2.51
	500 床以上	54	1	50	4.61	249	7.04
	全体	110	1	50	3.45	380	5.31
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	11	1	4	2.27	25	1.27
	300～499 床	15	1	6	1.60	24	1.59
	500 床以上	35	1	29	3.00	105	4.95
	全体	61	1	29	2.52	154	3.89
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	2	1	5	3.00	6	2.83
	300～499 床	6	1	3	1.33	8	0.82
	500 床以上	13	1	24	3.77	49	6.17
	全体	21	1	24	3.00	63	4.96
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	9	1	3	1.44	13	0.73
	300～499 床	12	1	5	1.58	19	1.38
	500 床以上	33	1	7	2.03	67	1.40
	全体	54	1	7	1.83	99	1.31
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	300～499 床	15	1	4	1.40	21	0.83
	500 床以上	39	1	18	2.74	107	3.02
	全体	56	1	18	2.32	130	2.63

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	7	1	4	2.00	14	1.15
	全体	9	1	4	1.78	16	1.09
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	13	1	3	1.31	17	0.63
	300～499 床	23	1	4	1.52	35	0.79
	500 床以上	41	1	9	2.32	95	1.78
	全体	77	1	9	1.91	147	1.45
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	14	1	12	2.86	40	3.72
	300～499 床	38	1	9	2.11	80	1.66
	500 床以上	40	1	34	5.35	214	7.43
	全体	92	1	34	3.63	334	5.40
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	21	1	502	66.24	1391	141.63
	300～499 床	65	1	353	25.40	1651	54.18
	500 床以上	103	1	1103	58.87	6064	160.06
	全体	189	1	1103	48.18	9106	131.58
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	9	1	6	2.00	18	1.66
	300～499 床	36	1	17	2.44	88	2.99
	500 床以上	62	1	42	4.55	282	6.19
	全体	107	1	42	3.63	388	5.14
(12) 消化器内科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	24	1	5	1.92	46	1.25
	300～499 床	32	1	12	2.38	76	2.32
	500 床以上	50	1	32	5.16	258	6.17
	全体	107	1	32	3.56	381	4.67

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	8	1	5	2.00	16	1.41
	300～499 床	29	1	12	2.66	77	2.36
	500 床以上	37	1	17	3.59	133	3.28
	全体	74	1	17	3.05	226	2.82
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	5	1	6	2.20	11	2.17
	300～499 床	11	1	8	2.00	22	2.10
	500 床以上	24	1	12	2.29	55	2.26
	全体	40	1	12	2.20	88	2.15
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	9	1	2	1.22	11	0.44
	全体	14	1	2	1.21	17	0.43
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	2	1	5	4.00	8	1.41
	500 床以上	14	1	8	3.00	42	2.63
	全体	17	1	8	3.00	51	2.47
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	3	1	4	2.00	6	1.73
	全体	4	1	4	1.75	7	1.50
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	30	1	17	3.83	115	4.09
	300～499 床	32	1	34	4.66	149	7.63
	500 床以上	24	1	231	18.17	436	50.22
	全体	86	1	231	8.14	700	27.36

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	2	1	5	3.00	6	2.83
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	38	1	158	16.84	640	30.96
	全体	42	1	158	15.43	648	29.74
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	4	1	11	3.50	14	5.00
	500 床以上	15	1	23	5.67	85	6.10
	全体	20	1	23	5.05	101	5.72
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	2	1	8	4.50	9	4.95
	300～499 床	17	1	22	5.18	88	6.87
	500 床以上	64	1	34	5.92	379	6.11
	全体	83	1	34	5.73	476	6.19
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	4	1	1	1.00	4	0.00
	全体	5	1	1	1.00	5	0.00
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	6	1	9	3.33	20	3.14
	300～499 床	6	1	5	2.50	15	1.52
	500 床以上	23	1	88	7.74	178	18.07
	全体	35	1	88	6.09	213	14.79

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	22	1	151	33.91	746	39.30
	300～499 床	69	1	300	26.41	1822	42.25
	500 床以上	118	1	488	46.11	5441	68.17
	全体	209	1	488	38.32	8009	58.62
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	42	1	24	3.88	163	4.67
	300～499 床	56	1	28	4.59	257	5.36
	500 床以上	75	1	92	12.65	949	16.00
	全体	173	1	92	7.91	1369	11.91
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	18	1	12	2.83	51	3.47
	300～499 床	32	1	10	2.63	84	2.34
	500 床以上	55	1	21	3.49	192	3.81
	全体	105	1	21	3.11	327	3.36
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	3	1	8	3.67	11	3.79
	300～499 床	11	1	3	1.45	16	0.69
	500 床以上	25	1	29	4.20	105	6.78
	全体	39	1	29	3.38	132	5.61
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	23	1	7	1.87	43	1.63
	300～499 床	41	1	11	1.90	78	1.88
	500 床以上	51	1	18	2.84	145	3.19
	全体	115	1	18	2.31	266	2.54
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	9	1	4	1.89	17	1.17
	300～499 床	27	1	31	3.15	85	5.84
	500 床以上	75	1	31	3.88	291	4.55
	全体	111	1	31	3.54	393	4.74

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	7	1	4	1.57	11	1.13
	500 床以上	17	1	12	2.59	44	3.16
	全体	24	1	12	2.29	55	2.74
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	21	1	9	2.33	49	1.88
	300～499 床	46	1	16	2.50	115	2.80
	500 床以上	72	1	43	5.39	388	6.85
	全体	139	1	43	3.97	552	5.42
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	32	1	22	3.78	121	4.76
	300～499 床	56	1	83	5.20	291	11.20
	500 床以上	64	1	202	11.47	734	29.68
	全体	152	1	202	7.54	1146	20.72
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	22	1	383	69.23	1523	111.53
	300～499 床	68	1	1055	44.09	2998	157.09
	500 床以上	104	1	766	36.83	3830	83.99
	全体	194	1	1055	43.05	8351	117.41
(11) 循環器内科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	14	1	19	3.64	51	5.12
	300～499 床	51	1	27	4.22	215	4.92
	500 床以上	78	1	139	10.26	800	17.69
	全体	144	1	139	7.41	1067	13.75
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	28	1	67	6.14	172	13.47
	300～499 床	58	1	27	4.10	238	5.36
	500 床以上	69	1	56	7.30	504	9.27
	全体	155	1	67	5.90	914	9.09

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	14	1	29	4.71	66	7.18
	300～499 床	39	1	26	5.38	210	5.75
	500 床以上	51	1	31	4.55	232	5.32
	全体	104	1	31	4.88	508	5.71
(14) 腎臓内科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	11	1	36	5.91	65	10.39
	300～499 床	21	1	17	2.81	59	3.78
	500 床以上	33	1	7	2.55	84	1.82
	全体	66	1	36	3.17	209	4.92
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	6	1	2	1.50	9	0.55
	300～499 床	7	1	3	1.43	10	0.79
	500 床以上	13	1	5	1.46	19	1.13
	全体	26	1	5	1.46	38	0.90
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	6	1	2	1.67	10	0.52
	500 床以上	29	1	40	6.48	188	8.28
	全体	36	1	40	5.56	200	7.65
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	3	1	11	4.67	14	5.51
	300～499 床	3	1	21	9.00	27	10.58
	500 床以上	2	1	6	3.50	7	3.54
	全体	8	1	21	6.00	48	6.99
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	46	1	33	5.15	237	8.64
	300～499 床	34	1	111	11.32	385	21.56
	500 床以上	31	1	47	7.39	229	10.77
	全体	111	1	111	7.67	851	14.44

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	42	1	122	13.86	582	20.80
	全体	45	1	122	13.00	585	20.34
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	2	2	6	4.00	8	2.83
	300～499 床	6	1	4	2.00	12	1.10
	500 床以上	18	1	56	5.89	106	12.87
	全体	26	1	56	4.85	126	10.77
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	5	1	33	10.60	53	13.07
	300～499 床	28	1	107	12.86	360	24.83
	500 床以上	77	1	290	23.65	1821	40.75
	全体	110	1	290	20.31	2234	36.65
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	10	1	3	1.40	14	0.70
	全体	12	1	3	1.33	16	0.65
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	11	1	9	3.73	41	3.04
	300～499 床	7	1	39	9.14	64	14.05
	500 床以上	33	1	113	14.36	474	23.72
	全体	51	1	113	11.35	579	20.13

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	4	3.00	6	1.41
	全体	2	2	4	3.00	6	1.41
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	5	3.00	12	1.63
	全体	4	1	5	3.00	12	1.63

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	2	0.00		
	500 床以上	1	1	2	0.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	5	1	6	2.20	11	2.17
	全体	5	1	6	2.20	11	2.17
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	4	3.00	6	1.41
	全体	2	2	4	3.00	6	1.41
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	17	1	78	20.29	345	22.82
	300～499 床	55	1	240	32.02	1761	44.04
	500 床以上	119	1	559	53.68	6388	73.16
	全体	191	1	559	44.47	8494	63.79
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	14	7.50	15	9.19
	全体	2	1	14	7.50	15	9.19
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	33	13.67	41	16.86
	全体	3	2	33	13.67	41	16.86

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	3	1	20	7.67	23	10.69
	全体	4	1	20	6.00	24	9.35
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	5	5	5.00	5	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	5	3.00	6	2.83
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	8	8	8.00	8	
	全体	2	1	8	4.50	9	4.95
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	5	1	65	18.00	90	26.46
	300～499 床	9	1	86	20.67	186	29.99
	500 床以上	4	1	17	9.00	36	8.68
	全体	18	1	86	17.33	312	24.97

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	10	1	69	10.90	109	21.24
	全体	10	1	69	10.90	109	21.24
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	8	8	8.00	8	
	500 床以上	3	1	54	19.00	57	30.32
	全体	4	1	54	16.25	65	25.36
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	2	2.00	4	0.00
	全体	2	2	2	2.00	4	0.00

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	4	1	67	28.25	113	29.30
	300～499 床	31	1	23	5.81	180	6.07
	500 床以上	70	1	20	4.33	303	4.40
	全体	105	1	67	5.68	596	8.31
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	3	1	5	2.67	8	2.08
	300～499 床	6	1	31	6.50	39	12.03
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	10	1	31	5.00	50	9.23

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	2	1	3	2.00	4	1.41
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上						
	全体	1	10	10	10.00	10	

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	3	1.67	5	1.15
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	2	2	6	4.00	8	2.83
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	5	3	292	63.80	319	127.62
	300～499 床	13	1	45	19.23	250	17.75
	500 床以上	37	1	86	14.22	526	20.41
	全体	55	1	292	19.91	1095	41.89
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	3	1	6	3.00	9	2.65
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	3	1	6	3.00	9	2.65

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	1	13	13	13.00	13	
	全体	2	2	13	7.50	15	7.78
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	6	3.50	7	3.54
	全体	2	1	6	3.50	7	3.54
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	4	1	15	7.50	30	7.05
	300～499 床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500 床以上	2	1	70	35.50	71	48.79
	全体	8	1	70	13.25	106	23.57

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	300～499 床						
	500 床以上	3	1	2	1.33	4	0.58
	全体	5	1	3	1.80	9	0.84
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	4	2.50	5	2.12
	全体	2	1	4	2.50	5	2.12
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	3	1	2	1.33	4	0.58
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	6	6	6.00	6	
	500 床以上	4	1	4	2.25	9	1.26
	全体	6	1	6	2.67	16	1.97
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	17	1	579	110.12	1872	164.10
	300～499 床	37	1	123	28.70	1062	29.25
	500 床以上	75	1	357	58.89	4417	83.21
	全体	129	1	579	56.98	7351	90.65
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	2	12	19	15.50	31	4.95
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	3	2	19	11.00	33	8.54

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	3	2.50	5	0.71
	全体	2	2	3	2.50	5	0.71
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500 床以上						
	全体	2	1	4	2.50	5	2.12
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	105	53.50	107	72.83
	全体	2	2	105	53.50	107	72.83
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	4	2	16	7.75	31	6.55
	300～499 床	5	1	68	29.00	145	31.48
	500 床以上	3	1	12	8.00	24	6.08
	全体	12	1	68	16.67	200	22.30

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	13	1	98	24.38	317	34.76
	全体	13	1	98	24.38	317	34.76
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上	2	4	15	9.50	19	7.78
	全体	3	2	15	7.00	21	7.00
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	30	30	30.00	30	
	全体	1	30	30	30.00	30	
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	3	1	45	18.33	55	23.44
	300～499 床	12	1	43	12.75	153	12.47
	500 床以上	24	1	30	7.50	180	7.94
	全体	39	1	45	9.95	388	11.13
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床						
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	2	3	6	4.50	9	2.12

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	1	6	6	6.00	6	

1-141. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の、製剤種別、使用場所別に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	3	4	10	7.67	23	3.21
	300～499 床	4	1	19	7.25	29	8.50
	500 床以上	5	1	140	32.00	160	60.44
	全体	12	1	140	17.67	212	38.86
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	9	9	9.00	9	
	全体	1	9	9	9.00	9	
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	5	2	189	42.40	212	82.02
	300～499 床	4	1	16	5.25	21	7.23
	500 床以上	3	1	23	10.00	30	11.53
	全体	12	1	189	21.92	263	53.06
(2) 外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	71	1	195	6.92	491	24.67
	300～499 床	75	1	338	9.92	744	39.84
	500 床以上	112	1	611	35.08	3929	81.02
	全体	258	1	611	20.02	5164	60.29
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	7	1	6	2.71	19	1.98
	300～499 床	7	1	4	2.43	17	1.27
	500 床以上	23	1	17	4.52	104	5.13
	全体	37	1	17	3.78	140	4.24
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	500 床以上	7	1	5	2.29	16	1.50
	全体	10	1	5	2.00	20	1.33
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	9	1	26	5.56	50	8.05
	300～499 床	17	1	22	3.71	63	5.16
	500 床以上	47	1	39	3.85	181	6.22
	全体	73	1	39	4.03	294	6.18
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	5	1	25	7.40	37	10.26
	300～499 床	21	1	18	2.67	56	3.75
	500 床以上	60	1	54	7.67	460	10.51
	全体	86	1	54	6.43	553	9.46
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	3	3	15	8.67	26	6.03
	1～299 床	399	1	3488	56.59	22579	224.57
	300～499 床	210	1	2738	257.24	54020	393.13
	500 床以上	150	7	4924	1148.59	172289	876.56
	全体	762	1	4924	326.66	248914	626.42
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	135	1	862	35.88	4844	107.88
	300～499 床	163	1	774	72.21	11770	113.08
	500 床以上	142	1	1500	195.68	27787	188.92
	全体	440	1	1500	100.91	44401	155.71
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	16	1	29	4.38	70	6.92
	300～499 床	60	1	35	4.55	273	6.09
	500 床以上	117	1	131	12.85	1503	19.35
	全体	193	1	131	9.56	1846	16.06
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	74	1	97	14.23	1053	23.11
	300～499 床	137	1	367	38.61	5289	68.37
	500 床以上	148	1	1020	127.41	18857	151.81
	全体	359	1	1020	70.19	25199	117.18
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	46	2	146	24.17	1112	32.30
	300～499 床	124	1	224	42.59	5281	44.91
	500 床以上	136	5	1023	170.75	23222	167.72
	全体	306	1	1023	96.78	29615	133.59
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上						
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	97	1	466	14.63	1419	64.70
	300～499 床	102	1	107	10.30	1051	19.22
	500 床以上	100	1	545	49.52	4952	98.31
	全体	300	1	545	24.74	7423	70.57
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	16	1	46	11.50	184	14.95
	300～499 床	31	1	109	11.16	346	23.45
	500 床以上	59	1	540	20.53	1211	71.76
	全体	106	1	540	16.42	1741	55.27
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500 床以上	19	1	20	3.47	66	4.50
	全体	23	1	20	3.09	71	4.17
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	14	1	40	5.71	80	10.11
	300～499 床	37	1	16	4.68	173	4.35
	500 床以上	73	1	123	9.07	662	17.56
	全体	124	1	123	7.38	915	14.18
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	13	1	22	6.00	78	7.14
	300～499 床	42	1	31	5.10	214	7.00
	500 床以上	79	1	145	11.38	899	20.28
	全体	134	1	145	8.89	1191	16.43
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	140	1	219	12.64	1770	30.54
	300～499 床	122	1	953	25.90	3160	111.70
	500 床以上	103	1	288	44.54	4588	56.80
	全体	367	1	953	25.94	9520	74.47
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	28	1	238	27.96	783	50.85
	300～499 床	44	1	99	10.61	467	20.28
	500 床以上	63	1	97	11.62	732	20.00
	全体	135	1	238	14.68	1982	29.75
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	5	3	30	10.00	50	11.45
	300～499 床	10	1	4	1.70	17	0.95
	500 床以上	37	1	80	5.41	200	13.07
	全体	52	1	80	5.13	267	11.65
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	28	1	142	15.21	426	28.70
	300～499 床	65	1	157	16.77	1090	28.51
	500 床以上	95	1	536	38.82	3688	70.72
	全体	188	1	536	27.68	5204	55.12
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	18	1	29	8.50	153	9.01
	300～499 床	52	1	168	18.19	946	28.61
	500 床以上	83	1	257	39.01	3238	54.35
	全体	153	1	257	28.35	4337	44.96
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	20	1	79	17.65	353	25.69
	300～499 床	50	1	153	18.62	931	27.54
	500 床以上	102	1	346	35.70	3641	48.69
	全体	172	1	346	28.63	4925	42.00
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	12	1	58	12.00	144	16.42
	300～499 床	28	1	102	26.89	753	28.41
	500 床以上	71	1	100	20.34	1444	22.76
	全体	111	1	102	21.09	2341	23.93
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	1	10	10	10.00	10	
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	3	1	1	1.00	3	0.00
	全体	5	1	10	2.80	14	4.02
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	12	12	12.00	12	
	500 床以上	2	3	48	25.50	51	31.82
	全体	3	3	48	21.00	63	23.81
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	1	2	1.50	6	0.58
	500 床以上	15	1	31	5.13	77	7.70
	全体	19	1	31	4.37	83	6.96
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	5	1	56	13.00	65	24.14
	300～499 床	25	1	23	3.36	84	4.58
	500 床以上	48	1	15	3.77	181	3.69
	全体	78	1	56	4.23	330	7.10
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	5	2	33	12.00	60	12.25
	300～499 床	14	1	17	4.86	68	5.39
	500 床以上	36	1	9	2.83	102	2.24
	全体	55	1	33	4.18	230	5.32
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	8	1	205	30.50	244	70.63
	300～499 床	10	1	37	10.80	108	10.81
	500 床以上	30	1	65	10.23	307	14.89
	全体	48	1	205	13.73	659	30.98
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	4	4	86	26.00	104	40.03
	300～499 床	7	1	36	18.86	132	15.99
	500 床以上	16	1	76	17.25	276	22.39
	全体	27	1	86	18.96	512	23.30
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	3	1	2	1.33	4	0.58
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	20	1	237	44.90	898	70.28
	300～499 床	35	1	68	15.69	549	17.21
	500 床以上	64	1	364	41.22	2638	59.71
	全体	119	1	364	34.33	4085	54.15
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	14	1	245	32.71	458	63.92
	300～499 床	19	1	58	21.05	400	19.25
	500 床以上	47	1	186	32.34	1520	46.53
	全体	80	1	245	29.73	2378	45.18
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	4	1	2	1.25	5	0.50
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	1	40	40	40.00	40	
	300～499 床						
	500 床以上	6	1	28	5.67	34	10.95
	全体	7	1	40	10.57	74	16.38
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	300～499 床	6	1	16	7.50	45	5.32
	500 床以上	14	1	28	5.57	78	6.73
	全体	22	1	28	5.68	125	6.15
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	2	2	9	5.50	11	4.95
	300～499 床	5	1	107	36.60	183	42.26
	500 床以上	9	1	43	14.56	131	12.65
	全体	16	1	107	20.31	325	26.47
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

1-142. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血小板製剤の患者の製剤種別、入院・外来別に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	19	9.33	28	9.07
	500 床以上	6	1	140	28.50	171	54.72
	全体	9	1	140	22.11	199	44.54
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 医療機関外患者	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	

【(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	3	2	8	4.33	13	3.21
	300～499 床	5	1	16	4.00	20	6.71
	500 床以上	4	1	23	7.75	31	10.44
	全体	12	1	23	5.33	64	7.15
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	

【(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	75	1	246	7.03	527	29.75
	300～499 床	88	1	338	9.53	839	36.33
	500 床以上	133	1	612	38.74	5152	87.83
	全体	296	1	612	22.02	6518	65.52
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	6	1	6	2.33	14	1.86
	300～499 床	16	1	5	2.56	41	1.46
	500 床以上	31	1	18	4.16	129	4.91
	全体	53	1	18	3.47	184	3.94
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(4) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	3	3	15	8.67	26	6.03
	1～299 床	400	1	3634	64.85	25939	235.84
	300～499 床	219	1	2830	306.02	67019	404.66
	500 床以上	161	10	6680	1396.86	224894	1065.88
	全体	783	1	6680	405.97	317878	756.01

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	140	1	862	35.72	5001	106.18
	300～499 床	173	1	777	74.40	12871	113.18
	500 床以上	151	1	1100	194.40	29354	170.92
	全体	464	1	1100	101.78	47226	148.34
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(5) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	105	1	488	17.15	1801	65.66
	300～499 床	122	1	108	14.20	1732	22.27
	500 床以上	122	1	844	61.46	7498	121.11
	全体	350	1	844	31.52	11032	83.82
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	16	1	238	25.19	403	58.24
	300～499 床	43	1	109	9.91	426	20.88
	500 床以上	60	1	540	26.43	1586	83.09
	全体	119	1	540	20.29	2415	64.03
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(6) 人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	149	1	220	14.36	2139	31.68
	300～499 床	141	1	1048	38.70	5456	121.88
	500 床以上	125	1	845	106.16	13270	152.91
	全体	417	1	1048	50.04	20867	117.40
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	30	1	100	18.50	555	29.28
	300～499 床	54	1	99	10.94	591	19.82
	500 床以上	79	1	221	14.10	1114	30.44
	全体	163	1	221	13.87	2260	27.11
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(7) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	19	1	75	15.37	292	21.97
	300～499 床	54	1	153	18.76	1013	28.16
	500 床以上	107	1	420	40.40	4323	61.59
	全体	180	1	420	31.27	5628	51.51
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	11	1	58	9.36	103	16.78
	300～499 床	33	1	102	25.39	838	27.20
	500 床以上	73	1	100	20.58	1502	22.80
	全体	117	1	102	20.88	2443	23.86

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(8) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	4	1	497	126.25	505	247.18
	300～499 床	27	1	23	3.70	100	4.49
	500 床以上	50	1	15	3.76	188	3.65
	全体	81	1	497	9.79	793	54.95
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	5	2	33	12.00	60	12.25
	300～499 床	19	1	17	4.21	80	4.83
	500 床以上	36	1	9	2.78	100	2.19
	全体	60	1	33	4.00	240	5.15
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(9) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	8	1	206	30.63	245	70.98
	300～499 床	10	1	37	10.60	106	10.93
	500 床以上	33	1	58	10.18	336	14.70
	全体	51	1	206	13.47	687	30.35

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	4	4	86	26.00	104	40.03
	300～499 床	8	1	36	14.88	119	15.32
	500 床以上	17	1	76	16.29	277	21.53
	全体	29	1	86	17.24	500	22.55
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(10) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	19	1	279	48.74	926	78.37
	300～499 床	33	1	68	15.94	526	17.27
	500 床以上	72	1	370	42.22	3040	59.31
	全体	124	1	370	36.23	4492	56.23
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	13	1	245	35.15	457	65.85
	300～499 床	22	1	107	22.95	505	26.49
	500 床以上	50	1	299	40.50	2025	62.89
	全体	85	1	299	35.14	2987	56.19
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	3	2.00	4	1.41

【(11) 人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-HLA-LR-10）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	300～499 床	7	1	37	10.86	76	11.88
	500 床以上	19	1	46	9.42	179	12.05
	全体	29	1	46	8.93	259	11.44
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	3	1	9	4.00	12	4.36
	300～499 床	8	1	43	14.38	115	14.18
	500 床以上	13	1	76	17.38	226	20.95
	全体	24	1	76	14.71	353	17.64
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

1-143. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血小板製剤を使用した患者の製剤種別に平均年齢を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤)／才	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	1	92	92	92.00	92	
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	92	46.50	93	64.35

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	47	4	92	71.36	3354	18.19
	300～499 床	54	1	94	68.30	3688	19.06
	500 床以上	91	1	87	46.18	4202	27.38
	全体	192	1	94	58.56	11244	25.96
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤)／才	0 床	3	78	93	85.33	256	7.51
	1～299 床	310	2	98	74.46	23082	13.46
	300～499 床	146	7	87	71.10	10381	8.51
	500 床以上	115	38	76	62.44	7181	8.30
	全体	574	2	98	71.25	40900	12.33
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	75	14	97	73.65	5524	13.89
	300～499 床	81	11	88	69.47	5627	12.20
	500 床以上	86	21	87	63.60	5470	10.47
	全体	242	11	97	68.68	16621	12.82
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)／才	0 床	1	84	84	84.00	84	
	1～299 床	107	12	96	72.93	7804	12.32
	300～499 床	96	12	92	70.95	6811	10.45
	500 床以上	89	29	78	63.56	5657	9.30
	全体	293	12	96	69.47	20356	11.54
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	15	42	86	67.40	1011	12.65
	300～499 床	35	9	89	67.37	2358	14.93
	500 床以上	86	3	82	61.93	5326	12.90
	全体	136	3	89	63.93	8695	13.58
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	5	58	89	75.80	379	12.83
	300～499 床	23	44	97	70.70	1626	11.39
	500 床以上	48	41	89	64.67	3104	12.70
	全体	76	41	97	67.22	5109	12.67

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	7	42	82	65.71	460	14.27
	300～499 床	10	62	85	72.70	727	8.25
	500 床以上	26	41	81	66.92	1740	10.84
	全体	43	41	85	68.07	2927	10.98
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・LR-10 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	15	8	89	63.60	954	24.16
	300～499 床	25	43	84	66.32	1658	12.01
	500 床以上	51	19	88	57.10	2912	15.07
	全体	91	8	89	60.70	5524	16.52
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板 ・HLA-LR-10 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	3	62	70	66.00	198	4.00
	300～499 床	6	55	87	72.83	437	11.20
	500 床以上	14	27	80	59.14	828	16.18
	全体	23	27	87	63.61	1463	14.87

3-8) 血漿製剤の使用実績について(全体)

1-144. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、血漿製剤を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	30	4.07%	1239	42.58%	387	96.03%	236	100.00%	1892	44.14%
2	使用していない	707	95.93%	1671	57.42%	16	3.97%	0	0.00%	2394	55.86%
	回答施設合計	737		2910		403		236		4286	

1-145. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・120 製剤)	0 床	6	1	8	3.33	20	3.01
	1～299 床	189	1	565	17.28	3266	64.91
	300～499 床	80	1	438	22.54	1803	69.34
	500 床以上	137	1	2037	85.20	11672	220.25
	全体	412	1	2037	40.68	16761	141.07
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・240 製剤)	0 床	22	1	78	9.77	215	17.45
	1～299 床	1108	1	1904	58.60	64924	157.26
	300～499 床	366	1	4824	366.93	134296	500.95
	500 床以上	230	3	8484	1335.74	307221	1339.61
	全体	1726	1	8484	293.54	506656	699.76
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・480 製剤)	0 床	9	1	938	106.11	955	311.96
	1～299 床	426	1	783	28.77	12256	65.99
	300～499 床	255	1	1672	109.79	27997	198.04
	500 床以上	214	3	5004	502.70	107578	691.17
	全体	904	1	5004	164.59	148786	404.11

【特別集計：血漿製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血漿製剤使用／袋(本)	0 床	28	1	938	42.50	1190	176.22
	1～299 床	1217	1	1963	66.10	80446	163.75
	300～499 床	380	1	4824	431.83	164096	532.75
	500 床以上	234	56	10724	1822.53	426471	1546.17
	全体	1859	1	10724	361.59	672203	839.18
血漿製剤使用／単位	0 床	28	2	3752	152.50	4270	706.17
	1～299 床	1217	1	4050	149.66	182138	357.97
	300～499 床	380	2	9648	1006.27	382383	1223.62
	500 床以上	234	113	21324	4514.64	1056426	3733.02
	全体	1859	1	21324	874.24	1625217	2041.67

【特別集計：一般病床数あたりの新鮮凍結人血漿使用量】

一般病床数あたりの血漿製剤使用量（単位）		（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）					
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 血漿製剤／単位	1～299 床	1217	0.0042	32.2051	1.12820	1373.0199	2.65
	300～499 床	380	0.0056	28.2933	2.58914	983.8736	3.19
	500 床以上	234	0.2242	32.3807	6.15343	1439.9032	4.17
	全体	1831	0.0042	32.3807	2.07361	3796.7967	3.43

1-146. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の使用理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 凝固因子の補充	0 床	5	1	15	4.20	21	6.10
	1～299 床	255	1	553	16.36	4172	47.47
	300～499 床	52	1	1092	144.25	7501	187.09
	500 床以上	20	40	1318	535.60	10712	412.03
	全体	332	1	1318	67.49	22406	181.96
(2) 凝固阻害因子や線溶因子の補充	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	27	1	249	21.59	583	48.41
	300～499 床	7	1	33	13.86	97	14.12
	500 床以上	4	1	220	91.50	366	107.30
	全体	39	1	249	26.85	1047	55.25
(3) 血漿因子の補充 (PT 及び APTT が正常な場合)	0 床	1	20	20	20.00	20	
	1～299 床	18	1	59	11.39	205	18.06
	300～499 床	8	1	30	9.00	72	9.81
	500 床以上	3	2	73	48.00	144	39.89
	全体	30	1	73	14.70	441	21.34
(4) 循環血漿量減少の改善と補充	0 床	5	1	4	2.00	10	1.22
	1～299 床	79	1	76	7.59	600	13.20
	300～499 床	21	1	471	64.86	1362	120.56
	500 床以上	9	2	567	174.67	1572	204.91
	全体	114	1	567	31.09	3544	89.12

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) たん白質源としての栄養補給	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	18	1	23	5.78	104	6.13
	300～499 床	2	3	12	7.50	15	6.36
	500 床以上	1	29	29	29.00	29	
	全体	22	1	29	6.77	149	7.64
(6) 創傷治癒の促進	0 床						
	1～299 床	9	1	21	4.44	40	6.44
	300～499 床	2	4	10	7.00	14	4.24
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	12	1	21	4.67	56	5.79
(7) 末期患者への投与	0 床	2	1	14	7.50	15	9.19
	1～299 床	8	1	50	8.63	69	16.83
	300～499 床	1	5	5	5.00	5	
	500 床以上						
	全体	11	1	50	8.09	89	14.43
(8) その他	0 床						
	1～299 床	34	1	100	11.85	403	21.01
	300～499 床	22	1	1270	126.23	2777	276.56
	500 床以上	19	2	1773	343.47	6526	504.19
	全体	75	1	1773	129.41	9706	319.15

1-147. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の診療科別(参考資料 1:診療科分類を参照)に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	70	1	1733	270.67	18947	348.97
	300～499 床	120	2	1958	346.18	41541	341.56
	500 床以上	187	1	5812	595.22	111306	676.60
	全体	377	1	5812	455.69	171794	552.82
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	291	1	297	32.19	9366	46.84
	300～499 床	167	1	452	75.14	12549	81.87
	500 床以上	154	4	2290	232.06	35738	306.71
	全体	612	1	2290	94.20	57653	182.04
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	152	1	121	10.47	1592	17.33
	300～499 床	171	1	208	16.89	2888	24.77
	500 床以上	183	1	202	23.61	4321	27.10
	全体	506	1	208	17.39	8801	24.28
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	15	2	94	14.53	218	23.70
	300～499 床	72	1	148	13.22	952	21.18
	500 床以上	119	1	702	29.32	3489	78.82
	全体	206	1	702	22.62	4659	61.90
(5) 整形外科	0 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	1～299 床	263	1	268	10.17	2676	23.05
	300～499 床	220	1	107	12.07	2655	15.78
	500 床以上	187	1	118	26.25	4908	24.94
	全体	672	1	268	15.24	10244	22.56
(6) 産婦人科	0 床	2	4	20	12.00	24	11.31
	1～299 床	194	1	124	12.30	2386	16.98
	300～499 床	190	1	278	25.13	4775	37.27
	500 床以上	193	1	285	60.17	11612	53.90
	全体	579	1	285	32.46	18797	43.91

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	13	1	88	10.54	137	23.50
	300～499 床	37	1	15	4.70	174	4.05
	500 床以上	94	1	180	17.36	1632	30.25
	全体	144	1	180	13.49	1943	26.00
(8) 泌尿器科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	96	1	94	8.49	815	13.34
	300～499 床	162	1	224	12.48	2022	26.80
	500 床以上	177	1	747	31.39	5556	67.89
	全体	436	1	747	19.25	8394	47.68
(9) その他の外科	0 床	1	5	5	5.00	5	
	1～299 床	255	1	311	24.45	6235	43.02
	300～499 床	186	1	452	59.68	11101	71.77
	500 床以上	163	1	2235	167.72	27338	276.75
	全体	605	1	2235	73.85	44679	162.41
(10) 血液内科	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	73	1	568	31.47	2297	79.60
	300～499 床	117	1	541	64.69	7569	86.87
	500 床以上	171	1	1084	166.63	28493	179.89
	全体	362	1	1084	105.97	38362	149.58
(11) 循環器内科	0 床	1	18	18	18.00	18	
	1～299 床	138	1	186	16.83	2323	28.84
	300～499 床	171	1	346	35.50	6070	51.48
	500 床以上	181	1	1307	74.37	13461	119.04
	全体	491	1	1307	44.55	21872	83.26
(12) 消化器内科	0 床	4	1	3	1.75	7	0.96
	1～299 床	205	1	111	12.57	2577	17.81
	300～499 床	206	1	214	31.61	6511	37.80
	500 床以上	194	1	521	73.39	14237	86.97
	全体	609	1	521	38.31	23332	60.24

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	25	1	21	6.24	156	6.93
	300～499 床	69	1	72	7.90	545	13.78
	500 床以上	117	1	175	16.78	1963	26.17
	全体	212	1	175	12.58	2666	21.58
(14) 腎臓内科	0 床	4	2	41	18.00	72	16.43
	1～299 床	68	1	232	17.96	1221	32.90
	300～499 床	103	1	297	32.44	3341	45.95
	500 床以上	135	1	518	87.89	11865	89.34
	全体	310	1	518	53.22	16499	73.17
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	17	1	103	17.00	289	24.86
	300～499 床	41	1	171	15.95	654	28.99
	500 床以上	92	1	671	49.71	4573	94.14
	全体	150	1	671	36.77	5516	77.28
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	16	1	303	31.50	504	74.67
	300～499 床	16	1	275	51.06	817	72.23
	500 床以上	69	1	1053	150.17	10362	209.35
	全体	101	1	1053	115.67	11683	184.51
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	5	1	8	4.40	22	2.88
	300～499 床	21	1	19	5.38	113	5.79
	500 床以上	33	1	255	21.52	710	47.92
	全体	59	1	255	14.32	845	36.69
(18) その他の内科	0 床	8	1	78	13.13	105	26.31
	1～299 床	233	1	315	13.83	3223	30.34
	300～499 床	130	1	863	50.18	6524	119.27
	500 床以上	91	1	1060	63.41	5770	133.69
	全体	462	1	1060	33.81	15622	91.66

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床	2	3	938	470.50	941	661.14
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	6	1	8	2.67	16	2.66
	500 床以上	11	1	24	4.64	51	6.59
	全体	20	1	938	50.60	1012	208.93
(20) 小児科	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	25	1	163	27.92	698	48.88
	300～499 床	52	1	439	32.04	1666	80.85
	500 床以上	141	1	1217	97.40	13734	185.86
	全体	219	1	1217	73.52	16101	158.17
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	5	2	74	19.00	95	31.08
	300～499 床	13	1	37	9.23	120	11.47
	500 床以上	27	1	1099	54.78	1479	210.35
	全体	45	1	1099	37.64	1694	163.48
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	53	1	391	40.15	2128	82.87
	300～499 床	129	1	1803	106.06	13682	209.59
	500 床以上	170	1	2226	361.27	61416	439.90
	全体	352	1	2226	219.39	77226	359.91
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	6	1	12	3.33	20	4.32
	300～499 床	6	1	58	12.17	73	22.49
	500 床以上	26	1	13	3.69	96	2.57
	全体	38	1	58	4.97	189	9.24
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	71	1	489	32.66	2319	70.34
	300～499 床	95	1	530	38.85	3691	83.32
	500 床以上	86	1	2411	139.14	11966	351.03
	全体	252	1	2411	71.33	17976	219.33

1-148. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の使用場所別に使用袋（本）数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	18	1	938	60.67	1092	219.68
	1～299 床	914	1	763	31.98	29234	69.22
	300～499 床	233	1	1028	129.39	30149	151.42
	500 床以上	158	27	2648	563.43	89022	525.54
	全体	1323	1	2648	113.00	149497	263.86
(2) 外来	0 床	6	1	41	13.33	80	15.34
	1～299 床	68	1	94	8.34	567	14.85
	300～499 床	78	1	158	13.21	1030	25.42
	500 床以上	108	1	915	51.31	5541	121.03
	全体	260	1	915	27.76	7218	81.88
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	38	1	147	16.76	637	37.67
	300～499 床	99	1	338	21.71	2149	43.05
	500 床以上	126	1	1042	112.95	14232	158.40
	全体	263	1	1042	64.71	17018	122.54
(4) 手術室	0 床	2	4	4	4.00	8	0.00
	1～299 床	300	1	753	41.66	12499	92.57
	300～499 床	200	1	1259	164.02	32803	246.91
	500 床以上	156	11	6782	746.19	116405	833.52
	全体	658	1	6782	245.77	161715	516.69
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	84	1	1218	88.56	7439	151.16
	300～499 床	145	1	1528	159.33	23103	190.38
	500 床以上	146	10	3366	591.73	86393	592.91
	全体	375	1	3366	311.83	116935	454.00
(6) 医療機関外	0 床	4	1	4	2.50	10	1.29
	1～299 床	2	3	11	7.00	14	5.66
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	6	1	11	4.00	24	3.58

1-149. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の患者の入院・外来別に使用袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	19	1	938	57.89	1100	213.84
	1～299 床	1039	1	1963	54.38	56503	138.53
	300～499 床	272	1	3624	382.33	103995	467.60
	500 床以上	177	20	10724	1845.78	326703	1576.97
	全体	1507	1	10724	324.02	488301	817.06
(2) 外来患者	0 床	7	1	41	12.14	85	14.40
	1～299 床	84	1	147	8.94	751	19.17
	300～499 床	151	1	827	36.15	5458	93.96
	500 床以上	141	1	810	133.45	18816	160.84
	全体	383	1	827	65.56	25110	125.82
(3) 医療機関外患者	0 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	1～299 床	2	11	16	13.50	27	3.54
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上						
	全体	5	2	16	7.00	35	6.20

3-9) 血漿製剤の使用実績について(個別製剤)

1-150. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤種別の集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	8	13.33%	473	37.21%	299	85.19%	201	93.49%	981	51.71%
2	システムを使用していないので手作業	52	86.67%	798	62.79%	52	14.81%	14	6.51%	916	48.29%
	回答施設合計	60		1271		351		215		1897	

1-151. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の、製剤種別、診療科別(参考資料 1:診療科分類を参照)に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-120 製剤)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	6	1	305	93.17	559	126.70
	300～499 床	7	2	36	11.71	82	12.24
	500 床以上	46	1	810	66.78	3072	145.61
	全体	59	1	810	62.93	3713	135.18
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	8	1	9	3.25	26	2.71
	300～499 床	7	1	8	3.14	22	2.73
	500 床以上	21	2	506	31.81	668	108.92
	全体	36	1	506	19.89	716	83.59
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	8	1	22	5.88	47	8.32
	300～499 床	3	1	4	2.33	7	1.53
	500 床以上	13	1	4	2.15	28	1.07
	全体	24	1	22	3.42	82	5.00
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上	6	2	206	38.00	228	82.34
	全体	7	2	206	34.00	238	75.90
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	6	1	10	4.17	25	4.54
	300～499 床	5	1	3	2.00	10	0.71
	500 床以上	5	1	8	4.00	20	2.55
	全体	16	1	10	3.44	55	3.12
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	4	1	14	6.25	25	6.02
	300～499 床	4	1	20	6.50	26	9.11
	500 床以上	14	2	94	10.57	148	24.21
	全体	22	1	94	9.05	199	19.60

【(1) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-120 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	5	2	12	5.60	28	4.98
	全体	7	1	12	4.43	31	4.54
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	3	1	5	2.67	8	2.08
	500 床以上	7	2	15	6.71	47	5.41
	全体	11	1	15	5.36	59	4.70
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	12	1	40	9.25	111	12.20
	300～499 床	5	2	26	8.80	44	9.83
	500 床以上	21	1	117	18.52	389	28.13
	全体	38	1	117	14.32	544	22.47
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	6	2	23	7.33	44	8.14
	300～499 床	5	1	31	8.80	44	12.56
	500 床以上	26	1	153	13.81	359	31.68
	全体	37	1	153	12.08	447	27.04
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	6	4	76	34.17	205	31.38
	300～499 床	6	2	9	5.00	30	3.10
	500 床以上	19	1	58	6.58	125	12.87
	全体	31	1	76	11.61	360	19.79
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	5	1	4	2.40	12	1.14
	300～499 床	6	1	4	2.00	12	1.10
	500 床以上	18	1	16	3.44	62	3.73
	全体	29	1	16	2.97	86	3.04

【(1) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-120 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	2	5	6	5.50	11	0.71
	300～499 床						
	500 床以上	5	1	8	3.00	15	2.83
	全体	7	1	8	3.71	26	2.63
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	3	1	28	10.00	30	15.59
	300～499 床	4	1	12	6.75	27	4.57
	500 床以上	10	2	48	10.50	105	14.08
	全体	17	1	48	9.53	162	12.18
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	1	5	5	5.00	5	
	300～499 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500 床以上	4	1	11	5.75	23	5.50
	全体	8	1	11	3.88	31	4.32
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	6	6	6.00	6	
	500 床以上	4	2	6	3.75	15	2.06
	全体	5	2	6	4.20	21	2.05
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	8	1	13	3.38	27	4.03
	300～499 床	10	1	135	18.50	185	42.08
	500 床以上	8	1	14	4.63	37	4.72
	全体	26	1	135	9.58	249	26.46

【(1) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-120 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	11	1	133	28.73	316	40.01
	300～499 床	16	1	77	10.75	172	19.12
	500 床以上	87	1	1114	55.60	4837	137.14
	全体	114	1	1114	46.71	5325	121.57
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床						
	500 床以上	1	41	41	41.00	41	
	全体	2	4	41	22.50	45	26.16
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	3	1	5	3.33	10	2.08
	300～499 床	4	3	53	21.25	85	23.47
	500 床以上	27	1	122	14.07	380	24.09
	全体	34	1	122	13.97	475	22.89
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	20	20	20.00	20	
	全体	1	20	20	20.00	20	
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	3	10	222	124.33	373	106.98
	300～499 床	2	3	88	45.50	91	60.10
	500 床以上	10	1	167	34.70	347	60.36
	全体	15	1	222	54.07	811	74.64

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	46	1	1733	280.57	12906	371.04
	300～499 床	98	1	1934	293.37	28750	305.15
	500 床以上	161	1	4899	523.98	84360	639.77
	全体	305	1	4899	413.17	126016	528.49
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	132	1	297	29.89	3946	46.77
	300～499 床	134	1	397	67.37	9028	76.99
	500 床以上	129	1	1897	195.11	25169	271.25
	全体	395	1	1897	96.56	38143	177.73
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	73	1	85	10.22	746	13.36
	300～499 床	132	1	115	15.65	2066	19.65
	500 床以上	159	1	195	20.70	3291	26.91
	全体	364	1	195	16.77	6103	22.49
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	10	6	157	34.20	342	50.47
	300～499 床	60	1	92	10.48	629	14.47
	500 床以上	88	1	306	28.20	2482	58.73
	全体	158	1	306	21.85	3453	47.09
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	127	1	268	9.70	1232	25.53
	300～499 床	180	1	104	11.16	2008	14.96
	500 床以上	154	1	118	24.55	3780	25.95
	全体	461	1	268	15.23	7020	23.10
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	63	1	124	13.16	829	21.31
	300～499 床	160	1	278	23.55	3768	33.01
	500 床以上	156	1	270	54.05	8432	52.38
	全体	379	1	278	34.38	13029	44.07

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	6	1	6	2.33	14	1.97
	300～499 床	27	1	14	4.07	110	3.37
	500 床以上	69	1	127	11.45	790	18.68
	全体	102	1	127	8.96	914	15.85
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	56	1	42	7.43	416	8.36
	300～499 床	133	1	139	8.99	1196	17.36
	500 床以上	138	1	158	23.22	3204	30.88
	全体	327	1	158	14.73	4816	24.24
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	139	1	230	24.66	3428	40.14
	300～499 床	157	1	447	54.67	8583	69.08
	500 床以上	142	1	2149	128.02	18179	248.06
	全体	438	1	2149	68.93	30190	154.59
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	45	1	478	35.76	1609	86.28
	300～499 床	97	1	344	48.52	4706	67.44
	500 床以上	145	2	1070	110.56	16031	138.56
	全体	287	1	1070	77.86	22346	115.98
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	81	1	110	12.20	988	17.02
	300～499 床	139	1	300	32.27	4486	49.67
	500 床以上	147	1	1202	71.50	10510	120.50
	全体	367	1	1202	43.55	15984	85.82
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	111	1	109	12.01	1333	16.96
	300～499 床	170	1	196	27.34	4647	35.08
	500 床以上	165	1	5138	81.45	13440	401.12
	全体	446	1	5138	43.54	19420	246.41

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	12	1	29	7.92	95	8.76
	300～499 床	52	1	71	7.44	387	12.01
	500 床以上	83	1	128	9.42	782	16.04
	全体	147	1	128	8.60	1264	14.20
(14) 腎臓内科	0 床	1	37	37	37.00	37	
	1～299 床	25	1	41	8.72	218	10.57
	300～499 床	69	1	95	12.28	847	16.35
	500 床以上	93	1	272	22.94	2133	32.87
	全体	188	1	272	17.21	3235	26.08
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	7	2	16	5.29	37	4.82
	300～499 床	22	1	36	6.73	148	9.09
	500 床以上	58	1	48	11.41	662	11.46
	全体	87	1	48	9.74	847	10.71
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	8	1	18	6.38	51	6.23
	300～499 床	9	1	102	19.11	172	31.78
	500 床以上	51	1	432	29.08	1483	62.18
	全体	68	1	432	25.09	1706	55.40
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床	17	1	19	4.65	79	5.15
	500 床以上	21	1	203	16.38	344	43.86
	全体	39	1	203	10.92	426	32.55
(18) その他の内科	0 床	2	1	6	3.50	7	3.54
	1～299 床	102	1	87	11.27	1150	14.96
	300～499 床	105	1	808	45.08	4733	115.13
	500 床以上	68	1	191	26.46	1799	38.95
	全体	277	1	808	27.76	7689	75.26

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	5	1	3	2.00	10	0.71
	500 床以上	8	1	5	3.13	25	1.46
	全体	15	1	5	2.80	42	1.26
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	15	1	102	21.40	321	33.47
	300～499 床	39	1	439	24.51	956	72.21
	500 床以上	123	1	900	62.67	7708	130.79
	全体	177	1	900	50.76	8985	115.75
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	2	2	13	7.50	15	7.78
	300～499 床	11	1	294	34.18	376	86.68
	500 床以上	22	1	1099	57.59	1267	232.72
	全体	35	1	1099	47.37	1658	189.42
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	31	1	391	40.00	1240	83.69
	300～499 床	102	1	1557	90.77	9259	192.34
	500 床以上	142	1	1863	333.28	47326	399.51
	全体	275	1	1863	210.27	57825	336.12
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	4	1	3	2.50	10	1.00
	500 床以上	18	1	13	3.67	66	2.74
	全体	23	1	13	3.35	77	2.53
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	44	1	156	28.23	1242	43.18
	300～499 床	77	1	501	30.94	2382	65.39
	500 床以上	64	1	1551	122.77	7857	277.64
	全体	185	1	1551	62.06	11481	174.80

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	21	1	771	86.52	1817	179.63
	300～499 床	34	1	841	144.18	4902	218.26
	500 床以上	97	1	2834	166.05	16107	346.82
	全体	152	1	2834	150.17	22826	303.13
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	47	1	104	17.85	839	24.41
	300～499 床	60	1	208	25.45	1527	40.85
	500 床以上	78	1	781	94.62	7380	151.79
	全体	185	1	781	52.68	9746	107.81
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	19	1	120	9.32	177	26.94
	300～499 床	39	1	97	7.72	301	16.02
	500 床以上	54	1	114	14.07	760	20.82
	全体	112	1	120	11.05	1238	20.53
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.67	5	0.58
	300～499 床	13	1	14	5.08	66	4.19
	500 床以上	38	1	66	11.37	432	15.40
	全体	54	1	66	9.31	503	13.42
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	34	1	119	5.88	200	20.10
	300～499 床	42	1	49	7.24	304	11.75
	500 床以上	53	1	89	16.81	891	19.35
	全体	129	1	119	10.81	1395	18.06
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	17	1	14	3.06	52	3.25
	300～499 床	32	1	56	9.25	296	13.54
	500 床以上	66	1	169	33.73	2226	39.10
	全体	115	1	169	22.38	2574	33.19

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	3	2	38	15.67	47	19.50
	300～499 床	8	1	7	3.13	25	2.70
	500 床以上	39	1	124	22.90	893	32.48
	全体	50	1	124	19.30	965	29.81
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	16	1	12	3.31	53	2.96
	300～499 床	38	1	130	11.97	455	26.20
	500 床以上	66	1	728	33.30	2198	92.31
	全体	120	1	728	22.55	2706	70.84
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	55	1	220	13.27	730	31.97
	300～499 床	53	1	625	32.38	1716	89.06
	500 床以上	70	1	447	69.89	4892	102.71
	全体	178	1	625	41.22	7338	85.71
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	22	1	90	13.45	296	20.28
	300～499 床	54	1	297	45.98	2483	59.69
	500 床以上	100	1	895	105.55	10555	133.69
	全体	176	1	895	75.76	13334	111.84
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	22	1	33	6.73	148	9.21
	300～499 床	39	1	102	15.77	615	24.79
	500 床以上	70	1	139	29.26	2048	33.81
	全体	131	1	139	21.46	2811	29.66
(12) 消化器内科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	43	1	68	9.77	420	15.42
	300～499 床	70	1	151	19.13	1339	28.45
	500 床以上	101	1	505	43.70	4414	66.11
	全体	215	1	505	28.72	6175	50.61

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	43	1	68	9.77	420	15.42
	300～499 床	70	1	151	19.13	1339	28.45
	500 床以上	101	1	505	43.70	4414	66.11
	全体	215	1	505	28.72	6175	50.61
(14) 腎臓内科	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	19	1	57	13.58	258	16.47
	300～499 床	55	1	202	37.25	2049	43.97
	500 床以上	100	2	423	82.86	8286	80.26
	全体	175	1	423	60.55	10597	70.78
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	8	1	36	19.63	157	12.61
	300～499 床	23	1	157	21.48	494	32.35
	500 床以上	58	1	436	53.17	3084	79.09
	全体	89	1	436	41.97	3735	67.56
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	5	1	301	73.20	366	127.78
	300～499 床	11	1	100	32.64	359	33.37
	500 床以上	55	1	1051	149.27	8210	207.63
	全体	71	1	1051	125.85	8935	190.64
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	7	1	16	5.29	37	6.99
	500 床以上	15	1	89	19.47	292	25.55
	全体	23	1	89	14.35	330	21.93
(18) その他の内科	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	37	1	107	20.32	752	30.66
	300～499 床	45	1	269	25.13	1131	43.91
	500 床以上	43	1	287	56.65	2436	70.52
	全体	126	1	287	34.29	4320	53.75

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	19	10.00	20	12.73
	500 床以上	3	1	24	8.67	26	13.28
	全体	5	1	24	9.20	46	11.37
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	2	21	10.75	43	9.22
	500 床以上	50	1	124	23.18	1159	27.15
	全体	54	1	124	22.26	1202	26.40
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	74	74	74.00	74	
	300～499 床	5	1	24	7.60	38	9.56
	500 床以上	7	1	91	19.14	134	32.73
	全体	13	1	91	18.92	246	29.54
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	14	1	68	12.93	181	22.40
	300～499 床	37	1	246	39.11	1447	59.08
	500 床以上	91	1	1113	106.85	9723	185.62
	全体	142	1	1113	79.94	11351	155.82
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	5	3.00	6	2.83
	500 床以上	6	1	6	2.67	16	1.75
	全体	8	1	6	2.75	22	1.83
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	9	1	140	24.11	217	44.29
	300～499 床	23	1	530	32.48	747	109.75
	500 床以上	38	1	907	47.03	1787	148.57
	全体	70	1	907	39.30	2751	126.42

1-152. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の製剤種別、使用場所別に使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-120 製剤)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	41	1	305	19.02	780	53.33
	300～499 床	37	1	191	15.59	577	41.35
	500 床以上	80	1	288	36.29	2903	58.26
	全体	158	1	305	26.96	4260	54.00
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	3	1	37	13.33	40	20.50
	300～499 床	2	2	2	2.00	4	0.00
	500 床以上	8	1	48	14.13	113	16.47
	全体	13	1	48	12.08	157	15.76
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	2	6	45	25.50	51	27.58
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	9	1	114	16.22	146	36.84
	全体	12	1	114	16.58	199	33.02
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	8	1	258	66.00	528	113.18
	300～499 床	7	1	18	4.43	31	6.13
	500 床以上	49	1	476	38.51	1887	85.94
	全体	64	1	476	38.22	2446	85.31
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	6	1	247	60.50	363	99.33
	300～499 床	12	1	137	22.67	272	43.09
	500 床以上	56	1	1491	96.13	5383	229.48
	全体	74	1	1491	81.32	6018	203.47
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	1～299 床	335	1	464	34.89	11689	65.07
	300～499 床	192	1	862	103.06	19788	125.05
	500 床以上	145	2	2325	372.02	53943	395.74
	全体	674	1	2325	126.74	85424	239.62
(2) 外来	0 床	2	2	37	19.50	39	24.75
	1～299 床	40	1	176	9.90	396	27.94
	300～499 床	59	1	158	10.58	624	22.02
	500 床以上	87	1	2302	48.94	4258	247.93
	全体	188	1	2302	28.28	5317	170.17
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	19	1	202	37.16	706	60.29
	300～499 床	82	1	267	21.16	1735	40.33
	500 床以上	108	1	656	98.90	10681	129.08
	全体	209	1	656	62.78	13122	104.59
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	129	1	753	46.55	6005	98.43
	300～499 床	162	1	1159	148.49	24056	224.88
	500 床以上	135	1	6156	673.82	90966	827.32
	全体	426	1	6156	284.10	121027	557.01
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	54	1	288	57.26	3092	63.05
	300～499 床	122	1	1449	131.17	16003	177.48
	500 床以上	126	1	2376	437.39	55111	481.03
	全体	302	1	2376	245.72	74206	369.49
(6) 医療機関外	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	2	11	16	13.50	27	3.54
	300～499 床						
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	4	4	16	9.25	37	5.38

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	136	1	477	21.68	2948	49.63
	300～499 床	129	1	462	53.04	6842	80.30
	500 床以上	127	1	1477	242.35	30779	268.75
	全体	393	1	1477	103.23	40570	188.69
(2) 外来	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	16	1	63	10.75	172	16.32
	300～499 床	19	1	103	19.05	362	30.72
	500 床以上	44	2	907	77.07	3391	170.15
	全体	80	1	907	49.11	3929	130.38
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	6	1	5	1.67	10	1.63
	300～499 床	20	1	71	11.80	236	17.94
	500 床以上	43	1	269	33.67	1448	51.51
	全体	69	1	269	24.55	1694	43.31
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	47	1	276	22.66	1065	56.60
	300～499 床	62	1	738	69.10	4284	143.91
	500 床以上	87	1	3046	202.43	17611	424.86
	全体	196	1	3046	117.14	22960	304.91
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	28	1	147	29.75	833	33.56
	300～499 床	67	1	713	62.93	4216	106.50
	500 床以上	107	2	1605	188.07	20123	227.94
	全体	202	1	1605	124.61	25172	189.58
(6) 医療機関外	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床						
	300～499 床	1	6	6	6.00	6	
	500 床以上	1	20	20	20.00	20	
	全体	3	2	20	9.33	28	9.45

1-153. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した血漿製剤の患者の製剤種別、入院・外来別、使用袋(本)数を記入してください。

【(1) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-120 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	51	1	563	37.63	1919	113.25
	300～499 床	48	1	269	15.35	737	47.69
	500 床以上	102	1	2037	100.03	10203	242.61
	全体	201	1	2037	63.98	12859	186.74
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	4	1	45	13.00	52	21.37
	300～499 床	3	2	2	2.00	6	0.00
	500 床以上	12	1	47	12.08	145	14.15
	全体	19	1	47	10.68	203	14.61
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(2) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-240 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	368	1	1762	64.96	23905	149.16
	300～499 床	223	1	2533	306.27	68298	368.23
	500 床以上	162	3	8484	1328.73	215255	1385.56
	全体	754	1	8484	407.77	307461	839.32
(2) 外来患者	0 床	2	6	37	21.50	43	21.92
	1～299 床	45	1	102	10.91	491	19.73
	300～499 床	115	1	363	26.57	3055	56.03
	500 床以上	111	1	2619	130.75	14513	282.68
	全体	273	1	2619	66.31	18102	191.26

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床	2	11	16	13.50	27	3.54
	300～499 床						
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	3	6	16	11.00	33	5.00

【(3) 新鮮凍結人血漿（新鮮凍結血漿-LR-480 製剤）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	170	1	783	32.37	5503	76.92
	300～499 床	161	1	1554	104.47	16819	196.95
	500 床以上	149	3	4995	549.78	81917	738.30
	全体	481	1	4995	216.72	104240	483.61
(2) 外来患者	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	13	1	77	15.46	201	24.92
	300～499 床	35	1	118	15.80	553	28.98
	500 床以上	57	1	393	55.04	3137	86.62
	全体	106	1	393	36.75	3895	68.84
(3) 医療機関外患者	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	

1-154. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で血漿製剤を使用した患者の製剤種別に平均年齢を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・120 製剤)／才	0 床						
	1～299 床	36	1	97	59.83	2154	28.74
	300～499 床	21	1	89	67.48	1417	18.45
	500 床以上	65	1	81	26.94	1751	24.73
	全体	122	1	97	43.62	5322	30.74
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・240 製剤)／才	0 床	4	54	88	77.00	308	15.85
	1～299 床	252	2	93	70.89	17864	14.59
	300～499 床	139	3	81	68.14	9471	9.37
	500 床以上	108	14	84	60.59	6544	13.27
	全体	503	2	93	67.97	34187	13.65
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・480 製剤)／才	0 床	3	72	88	80.00	240	8.00
	1～299 床	121	3	96	67.26	8138	15.07
	300～499 床	110	11	89	66.96	7366	11.44
	500 床以上	97	32	84	61.96	6010	9.09
	全体	331	3	96	65.72	21754	12.55

3-10) 血液照射について

1-155. 血液製剤専用の放射線照射装置を設置していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	X 線血液製剤照射装置を設置している	2	0.27%	8	0.28%	10	2.53%	24	10.21%	44	1.03%
2	γ 線血液製剤照射装置を設置している	1	0.14%	5	0.17%	8	2.03%	44	18.72%	58	1.36%
3	以前 γ 線血液製剤照射装置を使用していたが廃棄済み	2	0.27%	18	0.62%	27	6.84%	32	13.62%	79	1.85%
4	いいえ	726	99.32%	2868	98.93%	350	88.61%	135	57.45%	4079	95.75%
	回答施設合計	731		2899		395		235		4260	

1-156. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で院内照射が行なえず未照射のまま輸血が行なわれた日赤未照射製剤がありましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.00%	2	15.38%	0	0.00%	2	2.94%	4	3.92%
2	ない	3	100.00%	11	84.62%	18	100.00%	66	97.06%	98	96.08%
	回答施設合計	3		13		18		68		102	

1-157. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間に購入した未照射製剤と院内で照射が行なえず未照射のまま輸血が行なわれた日赤未照射製剤の製剤別単位数を記入してください

購入した未照射製剤総量（単位）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 未照射赤血球製剤 ／単位	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	100	100	100.00	100	
	全体	1	100	100	100.00	100	
(2) 未照射血小板製剤 ／単位	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

院内で照射が行なえず未照射のまま輸血が行なわれた未照射製剤量（単位）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 未照射赤血球製剤 ／単位	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 未照射血小板製剤 ／単位	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

1-158. 未照射製剤を院内で照射が行なえなかった理由は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	緊急の輸血で照射を行なう余裕がなかった			0	0.00%					0	0.00%
2	時間外に院内照射を行なう体制がないため			0	0.00%					0	0.00%
3	放射線照射装置の故障のため			0	0.00%					0	0.00%
4	高K血症の予防のため			0	0.00%					0	0.00%
5	その他			2	100.00%					2	100.00%
	回答施設合計			2						2	

「(5)その他」の場合、その理由を 50 文字以内で記入して下さい

件数 0件

3-11) 外来輸血について

1-159. 平成30年4月～平成31年3月の期間で外来にて輸血をおこないましたか

(但し、救急外来での輸血は除く)

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	399	53.27%	1355	46.29%	367	91.75%	230	97.87%	2351	54.53%
2	いいえ	350	46.73%	1572	53.71%	33	8.25%	5	2.13%	1960	45.47%
	回答施設合計	749		2927		400		235		4311	

1-160. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で外来にて輸血をおこなった製剤毎の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤	0 床	384	1	257	12.90	4955	23.27
	1～299 床	1199	1	2573	42.31	50732	106.36
	300～499 床	269	1	1557	248.73	66908	263.50
	500 床以上	166	8	1659	558.00	92628	332.81
	全体	2018	1	2573	106.65	215223	220.68
(2) 血小板製剤	0 床	19	1	42	11.26	214	12.94
	1～299 床	305	1	1088	33.64	10261	92.82
	300～499 床	215	1	980	89.57	19258	142.99
	500 床以上	158	2	3260	219.96	34753	309.37
	全体	697	1	3260	92.52	64486	192.44
(3) 血漿製剤	0 床	10	1	53	14.70	147	18.15
	1～299 床	73	1	2147	37.08	2707	250.64
	300～499 床	107	1	392	28.46	3045	54.49
	500 床以上	105	1	517	37.94	3984	68.21
	全体	295	1	2147	33.50	9883	134.69

1-161. 外来輸血の実施場所

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	外来処置室	146	37.15%	1010	76.23%	347	95.59%	224	98.68%	1727	74.83%
2	外来の空いている診察室	15	3.82%	100	7.55%	26	7.16%	21	9.25%	162	7.02%
3	輸血部のベッド	3	0.76%	5	0.38%	0	0.00%	6	2.64%	14	0.61%
4	病棟の空きベッド	3	0.76%	66	4.98%	9	2.48%	4	1.76%	82	3.55%
5	その他	245	62.34%	331	24.98%	46	12.67%	17	7.49%	639	27.69%
	回答施設合計	393		1325		363		227		2308	

1-162. 外来輸血後、院内で経過観察する時間を設けていますか(会計等のための待ち時間は含みません)

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	318	81.54%	909	70.47%	200	58.82%	106	49.30%	1533	68.59%
2	いない	72	18.46%	381	29.53%	140	41.18%	109	50.70%	702	31.41%
	回答施設合計	390		1290		340		215		2235	

1-163. 経過観察する時間は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	30 分未満	68	21.94%	271	30.08%	82	42.93%	49	48.04%	470	31.25%
2	30 分～60 分	95	30.65%	407	45.17%	80	41.88%	40	39.22%	622	41.36%
3	60 分以上	147	47.42%	223	24.75%	29	15.18%	13	12.75%	412	27.39%
	回答施設合計	310		901		191		102		1504	

1-164. 帰宅後に見られる輸血関連有害事象(または輸血副作用)の説明を行っていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	202	53.16%	632	50.16%	166	49.85%	110	52.13%	1110	50.82%
2	口頭で実施している	132	34.74%	502	39.84%	139	41.74%	80	37.91%	853	39.06%
3	文章を渡すのみ	19	5.00%	41	3.25%	4	1.20%	2	0.95%	66	3.02%
4	実施していない	27	7.11%	85	6.75%	24	7.21%	19	9.00%	155	7.10%
	回答施設合計	380		1260		333		211		2184	

1-165. 帰宅後の連絡先について説明していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	190	50.26%	532	42.49%	138	42.46%	98	46.23%	958	44.21%
2	口頭で実施している	129	34.13%	575	45.93%	149	45.85%	88	41.51%	941	43.42%
3	文章を渡すのみ	19	5.03%	38	3.04%	4	1.23%	4	1.89%	65	3.00%
4	実施していない	40	10.58%	107	8.55%	34	10.46%	22	10.38%	203	9.37%
	回答施設合計	378		1252		325		212		2167	

1-166. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間に外来輸血で帰宅後に発生した輸血副作用への対応について

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	連携医療機関で対応してもらった	5	1.37%	5	0.42%	0	0.00%	2	1.10%	12	0.59%
2	近隣救急センターを利用してもらった	1	0.27%	1	0.08%	1	0.34%	3	1.66%	6	0.30%
3	救急外来で対応した	2	0.55%	31	2.60%	32	10.77%	26	14.36%	91	4.48%
4	翌日に外来を受診してもらった	9	2.47%	18	1.51%	14	4.71%	12	6.63%	53	2.61%
5	往診した	2	0.55%	1	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	3	0.15%
6	電話連絡のみで済ませた	3	0.82%	15	1.26%	10	3.37%	14	7.73%	42	2.07%
7	連絡はなかった	330	90.66%	1084	91.02%	240	80.81%	135	74.59%	1789	88.00%
8	連絡を受ける体制がない	3	0.82%	9	0.76%	3	1.01%	5	2.76%	20	0.98%
9	その他	19	5.22%	53	4.45%	21	7.07%	13	7.18%	106	5.21%
	回答施設合計	364		1191		297		181		2033	

3-12) 病院外(介護施設・在宅)輸血について

1-167. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間に病院外(介護施設・在宅)で輸血を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いいえ	647	86.85%	2888	98.53%	393	98.99%	232	100.00%	4160	96.63%
2	関連病院と連携して介護施設・在宅両方で実施した	4	0.54%	5	0.17%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.21%
3	関連病院と連携して介護施設で実施した	12	1.61%	10	0.34%	1	0.25%	0	0.00%	23	0.53%
4	関連病院と連携して在宅で実施した	31	4.16%	16	0.55%	3	0.76%	0	0.00%	50	1.16%
5	関連病院と連携なく介護施設・在宅両方で実施した	5	0.67%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	0.12%
6	関連病院と連携なく介護施設で実施した	7	0.94%	2	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.21%
7	関連病院と連携なく在宅で実施した	39	5.23%	10	0.34%	0	0.00%	0	0.00%	49	1.14%
	回答施設合計	745		2931		397		232		4305	

1-168. 病院外で輸血を実施した患者さんに特別な理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病院まで距離が遠いため	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(2) 通院困難	0 床	23	1	67	5.96	137	13.71
	1～299 床	6	1	5	1.83	11	1.60
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	30	1	67	4.97	149	12.10

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 療を行っているため	0 床	70	1	217	11.96	837	29.44
	1～299 床	26	1	79	7.04	183	16.29
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上						
	全体	98	1	217	10.43	1022	26.30
(4) 終末期医療のため	0 床	23	1	25	5.13	118	6.97
	1～299 床	6	1	7	2.67	16	2.42
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	30	1	25	4.50	135	6.27
(5) 病診連携で病院より依頼されたため	0 床	9	1	14	3.78	34	4.41
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	10	1	14	3.50	35	4.25
(6) 患者さんからの希望	0 床	6	1	14	4.33	26	5.13
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	7	1	14	3.86	27	4.85
(7) その他	0 床	3	1	6	3.00	9	2.65
	1～299 床	3	1	3	2.33	7	1.15
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	6	1	6	2.67	16	1.86

1-169. 問1-168で「(2) 通院困難」の場合、通院困難な理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 交通事情	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 寝たきり	0 床	13	1	67	7.23	94	18.08
	1～299 床	5	1	5	1.80	9	1.79
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	19	1	67	5.47	104	15.02
(3) 身体障害	0 床	3	1	4	2.00	6	1.73
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	3	1	4	2.00	6	1.73
(4) 認知症	0 床	5	1	4	2.20	11	1.30
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	6	1	4	2.17	13	1.17
(5) その他	0 床	4	1	14	4.50	18	6.35
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	4	1	14	4.50	18	6.35

1-170. 問 1-168 で「(3) 在宅治療を行っているため」の場合、患者さんの疾患の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 腎臓疾患(透析など)	0 床	3	2	3	2.67	8	0.58
	1～299 床	2	1	20	10.50	21	13.44
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	5	1	20	5.80	29	7.98
(2) 血液疾患(貧血など)	0 床	25	1	37	4.32	108	7.40
	1～299 床	5	1	12	3.80	19	4.60
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	30	1	37	4.23	127	6.95
(3) 血液悪性疾患(MDS、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)	0 床	28	1	205	11.14	312	38.29
	1～299 床	8	1	16	3.38	27	5.18
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	37	1	205	9.19	340	33.43
(4) 悪性新生物	0 床	31	1	67	7.16	222	13.63
	1～299 床	16	1	60	6.94	111	14.69
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	47	1	67	7.09	333	13.84
(5) 消化器疾患(悪性新生物は除く)	0 床	3	1	10	4.00	12	5.20
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	4	1	10	3.25	13	4.50
(6) 産婦人科疾患(悪性新生物は除く)	0 床	1	5	5	5.00	5	
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	5	5	5.00	5	

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他	0 床	10	1	9	2.70	27	3.33
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	11	1	9	2.55	28	3.21

1-171. インフォームド・コンセント(IC)について

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同じ説明・同意書で行っている	51	55.43%	34	79.07%	4	100.00%			89	64.03%
2	病院外（介護施設・在宅）輸血用の説明・同意書を別に作成し使用している	37	40.22%	9	20.93%	0	0.00%			46	33.09%
3	その他	4	4.35%	0	0.00%	0	0.00%			4	2.88%
	回答施設合計	92	55.43%	43		4				139	

1-172. 赤血球製剤を保存する場合、保冷庫は以下のいずれですか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液製剤専用の自記式温度記録装置付き保冷庫	7	7.53%	15	34.88%	2	50.00%			24	17.14%
2	血液製剤専用で使用している保冷庫	4	4.30%	5	11.63%	1	25.00%			10	7.14%
3	薬品と同じ保冷庫	78	83.87%	11	25.58%	0	0.00%			89	63.57%
4	保冷ボックス	2	2.15%	11	25.58%	1	25.00%			14	10.00%
5	その他	2	2.15%	1	2.33%	0	0.00%			3	2.14%
	回答施設合計	93		43		4				140	

「その他」の場合、その内容を 50 文字以内で記入して下さい

別紙 設問 1-172 その他詳細.xlsx を参照

1-173. 複数人分の輸血用血液製剤を同じ場所で保管することができますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	32	34.78%	18	43.90%	2	50.00%			52	37.96%
2	ない	60	65.22%	23	56.10%	2	50.00%			85	62.04%
	回答施設合計	92		41		4				137	

1-174. 病院外（介護施設・在宅）輸血を行う場合に交差適合試験を実施していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自院で必ず行っている	8	8.70%	19	44.19%	4	100.00%			31	22.30%
2	院外の検査センターで必ず行っている	82	89.13%	15	34.88%	0	0.00%			97	69.78%
3	関連病院で必ず行っている	1	1.09%	8	18.60%	0	0.00%			9	6.47%
4	自院、院外の検査センターもしくは関連病院で必ず行っている	1	1.09%	0	0.00%	0	0.00%			1	0.72%
5	症例によって実施したりしなかったりする	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%
6	実施していない	0	0.00%	1	2.33%	0	0.00%			1	0.72%
	回答施設合計	92		43		4				139	

1-175. 輸血前後の感染症検査（HBV、HCV、HIV）は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	院内と同様に実施している	37	43.02%	21	51.22%	2	50.00%			60	45.80%
2	ほとんど実施していない	44	51.16%	19	46.34%	2	50.00%			65	49.62%
3	その他	5	5.81%	1	2.44%	0	0.00%			6	4.58%
	回答施設合計	86		41		4				131	

1-176. 輸血前後の検体保存は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	院内と同様に実施している	25	29.76%	25	65.79%	4	100.00%			54	42.86%
2	ほとんど実施していない	48	57.14%	10	26.32%	0	0.00%			58	46.03%
3	その他	11	13.10%	3	7.89%	0	0.00%			14	11.11%
	回答施設合計	84		38		4				126	

1-177. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合に実施困難な検査は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査の二重チェック	24	48.00%	6	28.57%	2	50.00%			32	42.67%
2	血液型検査のウラ試験	13	26.00%	5	23.81%	1	25.00%			19	25.33%
3	不規則抗体スクリーニング検査	14	28.00%	5	23.81%	1	25.00%			20	26.67%
4	抗免疫グロブリン法による交差適合試験	21	42.00%	4	19.05%	1	25.00%			26	34.67%
5	輸血前感染症検査（肝炎ウイルスマーカー）	11	22.00%	10	47.62%	2	50.00%			23	30.67%
6	輸血後感染症検査（肝炎ウイルスマーカー）	22	44.00%	16	76.19%	3	75.00%			41	54.67%
	回答施設合計	50		21		4				75	

1-178. 輸血の実施者は誰ですか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	68	74.73%	16	38.10%	1	25.00%			85	62.04%
2	輸血担当施設の看護師	37	40.66%	13	30.95%	2	50.00%			52	37.96%
3	訪問看護ステーションの看護師	27	29.67%	21	50.00%	3	75.00%			51	37.23%
4	連携病院の看護師	4	4.40%	5	11.90%	0	0.00%			9	6.57%
5	その他	4	4.40%	0	0.00%	0	0.00%			4	2.92%
	回答施設合計	91		42		4				137	

1-179. 病院外(介護施設・在宅)輸血後の患者観察(5分後、15分後)は行っていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同様に行っている	75	84.27%	35	83.33%	4	100.00%			114	84.44%
2	不十分ながら担当者が行っている	13	14.61%	5	11.90%	0	0.00%			18	13.33%
3	ほとんど行っていない	1	1.12%	2	4.76%	0	0.00%			3	2.22%
	回答施設合計	89		42		4				135	

1-180. 輸血中に付添う医療従事者は誰ですか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	42	46.67%	8	19.05%	2	50.00%			52	38.24%
2	輸血担当施設の看護師	51	56.67%	19	45.24%	2	50.00%			72	52.94%
3	訪問看護ステーションの看護師	54	60.00%	22	52.38%	4	100.00%			80	58.82%
4	連携病院の看護師	6	6.67%	5	11.90%	0	0.00%			11	8.09%
5	その他	11	12.22%	5	11.90%	0	0.00%			16	11.76%
	回答施設合計	90		42		4				136	

1-181. 輸血中に医療従事者以外で付き添う方は誰ですか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	患者さんの家族	77	90.59%	29	78.38%	4	100.00%			110	87.30%
2	患者さんの隣人・知人	4	4.71%	2	5.41%	0	0.00%			6	4.76%
3	ヘルパー	16	18.82%	4	10.81%	0	0.00%			20	15.87%
4	いない（独居）	10	11.76%	5	13.51%	0	0.00%			15	11.90%
5	その他	7	8.24%	2	5.41%	0	0.00%			9	7.14%
	回答施設合計	85		37		4				126	

「その他」の場合、その理由を 50 文字以内で記入して下さい

別紙 設問 1-181 その他詳細.xlsx を参照

1-182. 輸血終了時に抜針をするのは誰ですか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	34	37.78%	3	7.14%	1	25.00%			38	27.94%
2	輸血担当施設の看護師	52	57.78%	18	42.86%	0	0.00%			70	51.47%
3	訪問看護ステーションの看護師	55	61.11%	23	54.76%	3	75.00%			81	59.56%
4	連携病院の看護師	7	7.78%	2	4.76%	0	0.00%			9	6.62%
5	その他	2	2.22%	3	7.14%	0	0.00%			5	3.68%
	回答施設合計	90		42		4				136	

1-183. 輸血バッグの廃棄方法は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設で廃棄	74	87.06%	23	56.10%	2	50.00%			99	76.15%
2	訪問看護ステーションで廃棄	3	3.53%	10	24.39%	2	50.00%			15	11.54%
3	連携病院で廃棄	8	9.41%	7	17.07%	0	0.00%			15	11.54%
4	その他	0	0.00%	1	2.44%	0	0.00%			1	0.77%
	回答施設合計	85		41		4				130	

1-184. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合、自施設では実施困難な項目は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始	4	9.76%	0	0.00%	0	0.00%			29	44.62%
2	輸血中の観察	21	51.22%	8	38.10%	0	0.00%			16	24.62%
3	輸血終了中の有害事象への対応	9	21.95%	6	28.57%	1	33.33%			18	27.69%
4	輸血後の抜針	13	31.71%	4	19.05%	1	33.33%			5	7.69%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	1	2.44%	3	14.29%	1	33.33%			39	60.00%
6	輸血終了後（患家を離れた後） の有害事象への対応	23	56.10%	14	66.67%	2	66.67%			29	44.62%
	回答施設合計	41		21		3				65	

1-185. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合、訪問看護ステーションで実施困難な項目は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始	28	50.91%	1	7.14%					29	42.03%
2	輸血中の観察	7	12.73%	2	14.29%					9	13.04%
3	輸血終了中の有害事象への対応	16	29.09%	6	42.86%					22	31.88%
4	輸血後の抜針	4	7.27%	2	14.29%					6	8.70%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	27	49.09%	3	21.43%					30	43.48%
6	輸血終了後（患家を離れた後） の有害事象への対応	29	52.73%	10	71.43%					39	56.52%
	回答施設合計	55		14						69	

1-186. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で行った病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数は

病院外(介護施設・在宅)輸血の件数 (件)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤	0 床	87	1	155	13.84	1204	28.69
	1～299 床	30	1	81	10.83	325	21.19
	300～499 床	2	1	14	7.50	15	9.19
	500 床以上						
	全体	119	1	155	12.97	1544	26.70
(2) 血小板製剤	0 床	14	1	138	22.79	319	38.99
	1～299 床	3	2	6	3.67	11	2.08
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	18	1	138	18.39	331	35.14
(3) 血漿製剤	0 床	7	1	13	3.57	25	4.24
	1～299 床	3	3	8	5.00	15	2.65
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	10	1	13	4.00	40	3.74

1-187. 病院外(介護施設・在宅)輸血後の副作用発症時の対応策は決めていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同様に行っている	30	34.48%	18	46.15%	1	50.00%			49	38.28%
2	連絡をもらい適切な処置をとるように決めている	48	55.17%	15	38.46%	0	0.00%			63	49.22%
3	関連病院と連携をとり適切な処置を取るように決めている	6	6.90%	4	10.26%	1	50.00%			11	8.59%
4	特に決めていない	3	3.45%	2	5.13%	0	0.00%			5	3.91%
	回答施設合計	87		39		2				128	

3-13) 輸血副作用について

1-188. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、輸血副作用が発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	26	3.46%	778	26.91%	359	90.89%	223	98.24%	1386	32.50%
2	発生していない	726	96.54%	2113	73.09%	36	9.11%	4	1.76%	2879	67.50%
	回答施設合計	752		2891		395		227		4265	

1-189. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で、輸血副作用が発生した件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 発熱	0 床	11	1	5	2.00	22	1.26
	1～299 床	451	1	65	5.21	2350	8.20
	300～499 床	277	1	261	12.95	3586	24.89
	500 床以上	187	1	262	23.88	4466	29.62
	全体	926	1	262	11.26	10424	21.12
(2) 悪寒・戦慄	0 床	2	1	5	3.00	6	2.83
	1～299 床	160	1	15	1.93	309	1.85
	300～499 床	162	1	22	2.66	431	3.03
	500 床以上	166	1	66	5.21	865	6.44
	全体	490	1	66	3.29	1611	4.49
(3) 熱感・ほてり	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	100	1	15	2.95	295	3.10
	300～499 床	121	1	37	3.43	415	4.44
	500 床以上	128	1	52	6.05	774	6.44
	全体	350	1	52	4.24	1485	5.15
(4) 掻痒感・かゆみ	0 床	7	1	3	1.29	9	0.76
	1～299 床	232	1	48	3.21	744	5.85
	300～499 床	229	1	94	7.67	1756	11.73
	500 床以上	172	1	390	34.33	5904	41.21
	全体	640	1	390	13.15	8413	26.17

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 発赤・顔面紅潮	0 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	1～299 床	175	1	27	2.29	401	2.83
	300～499 床	158	1	21	3.96	625	4.12
	500 床以上	159	1	131	13.99	2224	16.78
	全体	496	1	131	6.56	3254	11.17
(6) 発疹・蕁麻疹	0 床	8	1	2	1.13	9	0.35
	1～299 床	303	1	181	4.58	1388	12.86
	300～499 床	270	1	102	12.13	3274	15.15
	500 床以上	195	1	411	55.49	10821	64.38
	全体	776	1	411	19.96	15492	40.21
(7) 呼吸困難	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	84	1	9	1.46	123	1.15
	300～499 床	112	1	7	1.61	180	1.09
	500 床以上	146	1	12	3.17	463	2.30
	全体	343	1	12	2.24	767	1.90
(8) 嘔気・嘔吐	0 床	5	1	2	1.20	6	0.45
	1～299 床	125	1	7	1.56	195	1.13
	300～499 床	121	1	56	2.29	277	5.07
	500 床以上	144	1	31	3.65	526	3.85
	全体	395	1	56	2.54	1004	3.80
(9) 胸痛・腹痛・腰背部痛	0 床						
	1～299 床	37	1	7	1.38	51	1.09
	300～499 床	47	1	14	1.47	69	1.95
	500 床以上	46	1	8	2.15	99	1.70
	全体	130	1	14	1.68	219	1.68
(10) 頭痛・頭重感	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	51	1	4	1.37	70	0.72
	300～499 床	52	1	6	1.58	82	1.00
	500 床以上	78	1	113	4.17	325	13.76
	全体	182	1	113	2.63	478	9.10

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 血圧低下	0 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	1～299 床	161	1	33	2.58	416	4.54
	300～499 床	154	1	49	3.06	471	5.52
	500 床以上	167	1	42	4.54	758	4.73
	全体	486	1	49	3.39	1649	4.98
(12) 血圧上昇	0 床	2	1	42	21.50	43	28.99
	1～299 床	135	1	123	5.84	788	14.76
	300～499 床	110	1	127	4.17	459	12.34
	500 床以上	122	1	45	5.18	632	7.20
	全体	369	1	127	5.21	1922	12.07
(13) 動悸・頻脈	0 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	1～299 床	75	1	29	2.52	189	4.08
	300～499 床	68	1	9	1.94	132	1.59
	500 床以上	99	1	14	2.69	266	2.49
	全体	244	1	29	2.41	589	2.90
(14) 血管痛	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床	51	1	5	1.63	83	1.08
	300～499 床	53	1	9	1.75	93	1.36
	500 床以上	64	1	14	2.34	150	2.25
	全体	169	1	14	1.95	329	1.71
(15) 意識障害	0 床						
	1～299 床	9	1	8	1.78	16	2.33
	300～499 床	8	1	4	1.63	13	1.06
	500 床以上	21	1	5	1.29	27	0.96
	全体	38	1	8	1.47	56	1.39
(16) 赤褐色尿	0 床						
	1～299 床	10	1	4	1.40	14	0.97
	300～499 床	5	1	4	2.00	10	1.41
	500 床以上	12	1	15	3.17	38	4.09
	全体	27	1	15	2.30	62	2.89

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) その他	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	104	1	11	1.79	186	1.65
	300～499 床	94	1	24	3.87	364	4.91
	500 床以上	119	1	61	5.29	630	7.46
	全体	318	1	61	3.71	1181	5.56

3-14) 自己血製剤使用の実績について

1-190. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で自己血(貯血式・希釈式・回収式)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	3	0.37%	826	26.99%	366	90.59%	233	99.15%	1428	31.60%
2	使用していない	817	99.63%	2234	73.01%	38	9.41%	2	0.85%	3091	68.40%
	回答施設合計	820		3060		404		235		4519	

1-191. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で貯血式自己血を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	3	100.00%	777	94.99%	363	99.73%	232	99.57%	1375	96.97%
2	使用していない	0	0.00%	41	5.01%	1	0.27%	1	0.43%	43	3.03%
	回答施設合計	3		818		364		233		1418	

1-192. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で貯血式自己血採血の症例数(実患者数)は

貯血式自己血採血の症例数(人)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	2	5	130	67.50	135	88.39
1～299 床	747	1	900	36.35	27154	69.23
300～499 床	328	1	580	64.07	21015	77.18
500 床以上	206	2	708	136.75	28171	126.90
全体	1283	1	900	59.61	76475	90.37

1-193. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で貯血式自己血採血の総件数は

貯血式自己血輸血採血の総件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0 床	2	10	260	135.00	270	176.78
1～299 床	748	1	1007	51.29	38368	98.30
300～499 床	333	1	1183	97.48	32460	120.01
500 床以上	208	4	942	217.47	45234	201.63
全体	1291	1	1183	90.11	116332	139.13

1-194. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した貯血式自己血の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 貯血式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0 床						
	1～299 床	273	1	457	18.47	5042	48.53
	300～499 床	168	1	665	18.82	3161	66.43
	500 床以上	184	1	380	22.92	4218	42.26
	全体	625	1	665	19.87	12421	52.30
(2) 貯血式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0 床	2	10	260	135.00	270	176.78
	1～299 床	708	1	1128	48.70	34478	99.69
	300～499 床	337	1	787	77.66	26170	98.00
	500 床以上	219	4	808	170.69	37382	169.74
	全体	1266	1	1128	77.65	98300	122.75

【特別集計：貯血式自己血の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 使用総袋(本)	0 床	2	10	260	135.00	270	176.78
	1～299 床	744	1	1184	53.12	39520	112.81
	300～499 床	338	1	1126	86.78	29331	117.71
	500 床以上	220	4	995	189.09	41600	183.31
	全体	1304	1	1184	84.91	110721	137.57
貯血式自己血の 使用総単位数	0 床	2	20	520	270.00	540	353.55
	1～299 床	744	1	2312	99.46	73998	208.90
	300～499 床	338	2	1844	164.20	55501	211.24
	500 床以上	220	8	1756	359.01	78982	351.09
	全体	1304	1	2312	160.29	209021	256.99

【特別集計：一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】

一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量（単位）（計算式：貯血式自己血製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血／単位	1～299 床	744	0.0036	35.2727	1.10889	825.0201	2.8955
	300～499 床	338	0.0045	4.6216	0.42648	144.1533	0.5405
	500 床以上	220	0.0150	2.5770	0.50999	112.1987	0.4724
	全体	1302	0.0036	35.2727	0.83054	1081.3721	2.2373

1-195. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血はありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	33.33%	414	54.26%	297	85.10%	222	96.94%	934	69.49%
2	ない	2	66.67%	349	45.74%	52	14.90%	7	3.06%	410	30.51%
	回答施設合計	3		763		349		229		1344	

1-196. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で廃棄した、貯血式自己血の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)貯血式自己血(200mL)廃棄総袋(本)数	0 床						
	1～299 床	100	1	57	5.81	581	9.90
	300～499 床	95	1	57	5.49	522	9.07
	500 床以上	116	1	121	9.10	1056	18.25
	全体	311	1	121	6.94	2159	13.51
(2)貯血式自己血(400mL)廃棄総袋(本)数	0 床						
	1～299 床	379	1	369	11.56	4383	25.86
	300～499 床	276	1	227	19.88	5488	31.78
	500 床以上	211	1	348	42.42	8951	55.86
	全体	866	1	369	21.73	18822	39.01

【特別集計：貯血式自己血の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 廃棄総袋(本)	0 床						
	1～299 床	407	1	369	12.20	4964	25.98
	300～499 床	285	1	227	21.09	6010	32.42
	500 床以上	213	1	348	46.98	10007	59.19
	全体	905	1	369	23.18	20981	40.55
貯血式自己血の 廃棄総単位数	0 床						
	1～299 床	407	1	738	22.97	9347	50.81
	300～499 床	285	1	454	40.34	11498	63.63
	500 床以上	213	2	696	89.00	18958	114.11
	全体	905	1	738	43.98	39803	78.53

1-197. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で貯血式自己血輸血の実績(実際に輸血されたもの)

貯血式自己血輸血の実績 (単位)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 全血／単位	0 床	2	20	520	270.00	540	353.55
	1～299 床	671	1	1744	90.78	60912	182.52
	300～499 床	325	2	1844	147.30	47874	183.23
	500 床以上	206	2	1569	280.43	57769	290.91
	全体	1204	1	1844	138.78	167095	216.54
(2) MAP／単位	0 床						
	1～299 床	54	2	1032	85.07	4594	190.00
	300～499 床	19	2	3410	291.42	5537	778.86
	500 床以上	52	2	1022	197.50	10270	257.95
	全体	125	2	3410	163.21	20401	369.49
(3) FFP／単位	0 床						
	1～299 床	14	2	1004	177.00	2478	330.67
	300～499 床	14	4	912	207.86	2910	298.43
	500 床以上	47	2	1072	190.21	8940	231.32
	全体	75	2	1072	191.04	14328	261.17
(4) フィブリン糊 ／単位	0 床						
	1～299 床	3	34	950	341.67	1025	526.84
	300～499 床	9	1	202	52.00	468	69.56
	500 床以上	23	8	1408	231.48	5324	377.72
	全体	35	1	1408	194.77	6817	343.50
(5) 血小板糊／単位	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	30	1690	860.00	1720	1173.80
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	1690	573.67	1721	966.88

1-198. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で希釈式自己血を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	33.33%	38	4.85%	44	13.50%	73	38.42%	156	11.98%
2	使用していない	2	66.67%	745	95.15%	282	86.50%	117	61.58%	1146	88.02%
	回答施設合計	3		783		326		190		1302	

1-199. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した、希釈式自己血の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 希釈式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0 床						
	1～299 床	10	1	36	7.60	76	10.75
	300～499 床	7	1	68	13.00	91	24.52
	500 床以上	13	1	14	4.77	62	4.19
	全体	30	1	68	7.63	229	13.35
(2) 希釈式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0 床						
	1～299 床	29	1	920	54.48	1580	169.41
	300～499 床	27	1	132	23.74	641	28.58
	500 床以上	51	1	444	32.43	1654	70.31
	全体	107	1	920	36.21	3875	101.25

【特別集計：希釈式自己血の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
希釈式自己血の 使用総袋(本)	0 床						
	1～299 床	32	1	920	51.75	1656	162.39
	300～499 床	29	1	132	25.24	732	29.43
	500 床以上	51	1	452	33.65	1716	71.72
	全体	112	1	920	36.64	4104	100.02
希釈式自己血の 使用総単位数	0 床						
	1～299 床	32	1	1840	101.13	3236	324.13
	300～499 床	29	2	264	47.34	1373	56.24
	500 床以上	51	2	896	66.08	3370	142.00
	全体	112	1	1840	71.24	7979	199.10

1-200. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で回収式自己血を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい(濃縮・洗浄法)	0	0.00%	119	15.54%	93	31.53%	124	70.86%	336	26.92%
2	はい(濾過法)	0	0.00%	47	6.14%	15	5.08%	12	6.86%	74	5.93%
3	いいえ	12	100.00%	600	78.33%	187	63.39%	39	22.29%	838	67.15%
	回答施設合計	12		766		295		175		1248	

1-201. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した、回収式自己血の件数と使用総量を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 回収式自己血使用件数(件)	0 床						
	1～299 床	132	1	511	57.66	7611	89.86
	300～499 床	67	1	384	77.84	5215	87.13
	500 床以上	90	2	750	161.13	14502	130.40
	全体	289	1	750	94.56	27328	112.88
(2) 回収式自己血使用総量(mL)	0 床						
	1～299 床	125	30	331571	17818.75	2227344	37977.66
	300～499 床	54	260	296718	42833.65	2313017	60862.27
	500 床以上	73	73	582596	90122.45	6578939	101204.42
	全体	252	30	582596	44124.21	11119300	73437.52

3-15) 血漿分画製剤の使用実績について

1-202. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	170	20.71%	2034	67.44%	382	98.45%	232	99.15%	2818	63.20%
2	使用していない	651	79.29%	982	32.56%	6	1.55%	2	0.85%	1641	36.80%
	回答施設合計	821		3016		388		234		4459	

1-203. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	15	9.26%	685	34.35%	285	77.87%	210	94.59%	1195	43.55%
2	システムを使用していないので手作業	147	90.74%	1309	65.65%	81	22.13%	12	5.41%	1549	56.45%
	回答施設合計	162		1994		366		222		2744	

3-16) アルブミン製剤の使用実績について(全体)

1-204. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	161	78.92%	1951	93.75%	377	99.74%	227	100.00%	2716	93.98%
2	使用していない	43	21.08%	130	6.25%	1	0.26%	0	0.00%	174	6.02%
	回答施設合計	204		2081		378		227		2890	

1-205. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、)の使用本数を、国産・輸入別、規格別に本数で記入してください。

等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	3	6	33	15.33	46	15.31
	1～299 床	23	1	311	54.04	1243	82.04
	300～499 床	13	1	859	208.62	2712	258.72
	500 床以上	11	4	420	159.91	1759	160.86
	全体	50	1	859	115.20	5760	172.73
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床	1	30	30	30.00	30	
	1～299 床	2	2	540	271.00	542	380.42
	300～499 床	2	248	335	291.50	583	61.52
	500 床以上						
	全体	5	2	540	231.00	1155	223.29
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床						
	1～299 床	1	80	80	80.00	80	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	80	80	80.00	80	
国産・輸入の詳細不明	0 床						
	1～299 床	3	22	56	44.67	134	19.63
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	4	2	56	34.00	136	26.68
合計（本）	0 床	4	6	33	19.00	76	14.49
	1～299 床	29	1	540	68.93	1999	116.84
	300～499 床	15	1	859	219.67	3295	241.86
	500 床以上	12	2	420	146.75	1761	160.01
	全体	60	1	859	118.85	7131	172.59

等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) 使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	4	4	41	20.00	80	15.43
	1～299 床	308	1	1365	80.89	24915	153.12
	300～499 床	139	1	4167	383.91	53363	519.04
	500 床以上	128	11	7704	1348.29	172581	1348.88
	全体	579	1	7704	433.40	250939	854.35
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床	1	4	4	4.00	4	
	1～299 床	221	1	778	77.59	17147	105.56
	300～499 床	123	2	2678	424.91	52264	482.93
	500 床以上	90	3	3996	1069.12	96221	838.92
	全体	435	1	3996	380.77	165636	601.23
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床	1	2	2	2.00	2	
	1～299 床	37	1	988	93.00	3441	187.26
	300～499 床	27	63	1485	356.59	9628	327.35
	500 床以上	17	210	5068	2188.53	37205	1714.21
	全体	82	1	5068	613.12	50276	1140.81
国産・輸入の詳細不明	0 床						
	1～299 床	17	1	654	81.53	1386	159.23
	300～499 床	3	267	2798	1113.67	3341	1458.68
	500 床以上	1	3214	3214	3214.00	3214	
	全体	21	1	3214	378.14	7941	889.44
合計（本）	0 床	6	2	41	14.33	86	14.84
	1～299 床	583	1	1365	80.65	47019	139.46
	300～499 床	281	1	4167	423.93	119124	516.79
	500 床以上	205	11	7704	1508.40	309221	1443.58
	全体	1075	1	7704	442.28	475450	874.67

高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) 使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	4	2	10	6.00	24	4.62
	1～299 床	23	3	632	137.48	3162	191.34
	300～499 床	18	2	2430	333.28	5999	599.25
	500 床以上	36	1	914	96.25	3465	193.16
	全体	81	1	2430	156.17	12650	335.56
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床						
	1～299 床	1	327	327	327.00	327	
	300～499 床						
	500 床以上	1	1345	1345	1345.00	1345	
	全体	2	327	1345	836.00	1672	719.83
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床						
	1～299 床	1	8	8	8.00	8	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	8	8	8.00	8	
国産・輸入の詳細不明	0 床	1	3	3	3.00	3	
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	
合計（本）	0 床	5	2	10	5.40	27	4.22
	1～299 床	25	3	632	139.88	3497	189.07
	300～499 床	18	2	2430	333.28	5999	599.25
	500 床以上	37	1	1345	130.00	4810	280.04
	全体	85	1	2430	168.62	14333	353.27

高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) 使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	18	1	399	44.28	797	93.46
	1～299 床	351	1	2163	161.37	56642	233.88
	300～499 床	101	10	3111	670.57	67728	600.19
	500 床以上	73	13	7119	1208.73	88237	1288.36
	全体	543	1	7119	393.01	213404	682.14
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床	2	56	66	61.00	122	7.07
	1～299 床	6	7	213	93.83	563	80.55
	300～499 床	3	646	1070	803.33	2410	232.18
	500 床以上	5	22	1952	848.80	4244	825.47
	全体	16	7	1952	458.69	7339	582.99
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床	5	3	14	7.20	36	4.55
	1～299 床	35	1	2725	384.29	13450	554.87
	300～499 床	25	24	2522	769.24	19231	653.16
	500 床以上	22	5	5484	1419.91	31238	1610.63
	全体	87	1	5484	735.11	63955	1037.03
国産・輸入の詳細不明	0 床						
	1～299 床	8	2	986	190.88	1527	333.06
	300～499 床	1	527	527	527.00	527	
	500 床以上						
	全体	9	2	986	228.22	2054	331.08
合計（本）	0 床	25	1	399	38.20	955	80.40
	1～299 床	402	1	2725	180.32	72488	282.75
	300～499 床	125	10	3111	719.17	89896	629.19
	500 床以上	92	5	7119	1344.77	123719	1379.49
	全体	644	1	7119	445.74	287058	759.24

高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) 使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	7	2	63	20.29	142	22.24
	1～299 床	44	1	1142	134.86	5934	232.08
	300～499 床	8	4	1223	252.88	2023	431.24
	500 床以上	20	3	785	140.45	2809	200.44
	全体	79	1	1223	138.08	10908	242.51
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床						
	1～299 床	1	22	22	22.00	22	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	22	22	22.00	22	
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床	2	14	239	126.50	253	159.10
	1～299 床	7	10	687	189.29	1325	258.66
	300～499 床	1	628	628	628.00	628	
	500 床以上	4	42	2249	1194.50	4778	1022.31
	全体	14	10	2249	498.86	6984	705.07
国産・輸入の詳細不明	0 床						
	1～299 床	3	3	276	99.00	297	153.47
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	3	3	276	99.00	297	153.47
合計（本）	0 床	9	2	239	43.89	395	75.69
	1～299 床	55	1	1142	137.78	7578	227.77
	300～499 床	9	4	1223	294.56	2651	422.32
	500 床以上	24	3	2249	316.13	7587	574.91
	全体	97	1	2249	187.74	18211	363.69

高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) 使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産 (採血国：日本)	0 床	68	1	576	35.01	2381	75.35
	1～299 床	1077	1	1341	123.32	132821	173.10
	300～499 床	167	2	4101	579.39	96758	599.63
	500 床以上	127	16	7909	1583.91	201157	1179.19
	全体	1439	1	7909	300.98	433117	606.11
輸入 (採血国：海外、献血)	0 床	6	1	57	24.17	145	20.12
	1～299 床	37	1	1757	172.73	6391	341.39
	300～499 床	16	96	2945	1041.38	16662	681.43
	500 床以上	13	677	3052	1451.08	18864	760.18
	全体	72	1	3052	584.19	42062	744.53
輸入 (採血国：海外、 非献血)	0 床	30	2	399	60.73	1822	96.85
	1～299 床	252	1	2251	204.13	51441	300.52
	300～499 床	63	20	3121	882.52	55599	628.40
	500 床以上	46	9	6998	1418.26	65240	1408.41
	全体	391	1	6998	445.27	174102	736.19
国産・輸入の詳細不明	0 床	12	3	105	22.58	271	36.71
	1～299 床	50	2	1800	141.48	7074	358.98
	300～499 床	2	470	479	474.50	949	6.36
	500 床以上	1	5308	5308	5308.00	5308	
	全体	65	2	5308	209.26	13602	719.32
合計（本）	0 床	118	1	576	40.55	4785	77.67
	1～299 床	1408	1	2251	140.72	198137	217.99
	300～499 床	236	2	7046	722.08	170412	713.05
	500 床以上	155	9	11894	1874.64	290569	1503.17
	全体	1917	1	11894	346.32	663903	722.78

【特別集計：アルブミン製剤使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）	0 床	10	25.0	512.5	145.50	1455.0	150.86
	1～299 床	607	5.0	17062.5	984.73	597732.5	1723.44
	300～499 床	290	5.0	52087.5	5191.47	1505525.0	6414.37
	500 床以上	206	137.5	96300.0	18806.15	3874067.5	18054.40
	全体	1113	5.0	96300.0	5371.77	5978780.0	10798.07
(2) 高張アルブミン製剤（20%）	0 床	30	8.0	3990.0	321.93	9658.0	744.06
	1～299 床	426	10.0	27250.0	1734.43	738868.0	2777.20
	300～499 床	135	56.0	31110.0	6836.71	922956.0	6253.39
	500 床以上	108	4.0	71190.0	11633.61	1256430.0	13613.99
	全体	699	4.0	71190.0	4188.72	2927912.0	7408.73
(3) 高張アルブミン製剤（25%）	0 床	127	10.0	7200.0	486.52	61787.5	943.28
	1～299 床	1456	5.0	28137.5	1727.06	2514602.5	2696.72
	300～499 床	239	25.0	88075.0	8968.22	2143405.0	8882.71
	500 床以上	162	15.0	148675.0	22654.61	3670047.5	18851.87
	全体	1984	5.0	148675.0	4228.75	8389842.5	8924.82
(4) アルブミン製剤合計	0 床	160	8.0	7200.0	455.63	72900.5	900.88
	1～299 床	1917	5.0	36512.5	2008.97	3851203.0	3267.09
	300～499 床	354	25.0	140162.5	12914.93	4571886.0	12428.54
	500 床以上	213	2890.0	203500.0	41317.11	8800545.0	33072.61
	全体	2644	5.0	203500.0	6541.81	17296534.5	15368.73

【特別集計：一般病床数あたりのアルブミン製剤使用量（g）】

一般病床数あたりのアルブミン製剤使用量（g） （計算式：アルブミン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）	1～299 床	607	0.0563	221.0526	7.40433	4494.4293	17.10
	300～499 床	290	0.0161	152.7493	13.19186	3825.6415	16.64
	500 床以上	206	0.2284	190.3500	25.80697	5316.2378	22.78
	全体	1103	0.0161	221.0526	12.36292	13636.3086	19.43
(2) 高張アルブミン製剤（20%）	1～299 床	426	0.0426	151.2500	14.49055	6172.9757	19.88
	300～499 床	135	0.1806	83.1818	17.52600	2366.0107	15.72
	500 床以上	108	0.0060	95.4290	16.34860	1765.6493	17.58
	全体	669	0.0060	151.2500	15.40304	10304.6357	18.77
(3) 高張アルブミン製剤（25%）	1～299 床	1456	0.0500	554.1667	18.03716	26262.1172	31.08
	300～499 床	239	0.0538	258.2845	23.75997	5678.6329	24.69
	500 床以上	162	0.0281	144.9074	31.63646	5125.1072	22.58
	全体	1857	0.0281	554.1667	19.96007	37065.8573	29.94
(4) アルブミン製剤合計	1～299 床	1917	0.0426	554.1667	19.26422	36929.5229	31.17
	300～499 床	354	0.0538	411.0337	33.53187	11870.2851	33.22
	500 床以上	213	5.7115	236.9500	57.30982	12206.9937	37.56
	全体	2484	0.0426	554.1667	24.55990	61006.8017	33.94

1-206. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した等張アルブミン製剤:5%の使用理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血性ショックの改善	0 床	2	2	2	2.00	4	0.00
	1～299 床	80	1	300	12.18	974	36.59
	300～499 床	21	1	146	32.29	678	36.04
	500 床以上	22	3	607	128.50	2827	165.16
	全体	125	1	607	35.86	4483	87.10
(2) 重症敗血症の改善	0 床						
	1～299 床	42	1	38	4.76	200	6.97
	300～499 床	13	1	119	20.85	271	32.63
	500 床以上	10	1	65	25.50	255	25.02
	全体	65	1	119	11.17	726	19.92
(3) 肝硬変に伴う腹水の改善	0 床	3	1	16	6.67	20	8.14
	1～299 床	35	1	120	9.80	343	23.21
	300～499 床	7	1	329	60.29	422	119.89
	500 床以上	12	3	78	27.50	330	27.71
	全体	57	1	329	19.56	1115	48.06
(4) 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群の改善	0 床	2	15	57	36.00	72	29.70
	1～299 床	19	1	200	17.74	337	46.74
	300～499 床	4	3	98	30.75	123	45.18
	500 床以上	10	2	134	23.50	235	40.04
	全体	35	1	200	21.91	767	42.64
(5) 循環動態が不安定な体外循環の改善	0 床	3	1	9	6.00	18	4.36
	1～299 床	45	1	332	20.00	900	52.02
	300～499 床	14	3	948	103.79	1453	246.33
	500 床以上	19	1	199	42.32	804	51.14
	全体	81	1	948	39.20	3175	113.66
(6) 凝固因子の補充を必要としない治療的血漿交換療法	0 床						
	1～299 床	6	5	153	35.00	210	58.05
	300～499 床	8	1	40	14.88	119	14.96
	500 床以上	17	1	1081	98.53	1675	257.61
	全体	31	1	1081	64.65	2004	193.63

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 重症熱傷	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	3	1	4	2.00	6	1.73
	500 床以上	11	1	62	11.64	128	17.65
	全体	15	1	62	9.00	135	15.60
(8) 低蛋白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫の改善	0 床	4	1	12	6.75	27	6.08
	1～299 床	53	1	200	9.64	511	28.06
	300～499 床	9	1	299	50.67	456	96.42
	500 床以上	18	1	602	127.89	2302	167.51
	全体	84	1	602	39.24	3296	97.30
(9) 循環血漿量の著明な減少の改善	0 床	3	7	33	23.33	70	14.22
	1～299 床	44	1	186	10.27	452	28.57
	300～499 床	14	1	696	72.64	1017	182.93
	500 床以上	19	1	1338	252.05	4789	332.99
	全体	80	1	1338	79.10	6328	202.93
(10) 脳虚血の改善	0 床						
	1～299 床	5	1	5	2.60	13	1.67
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	14	5.25	21	5.91
	全体	9	1	14	3.78	34	4.06
(11) 人工心肺を使用する心臓手術	0 床						
	1～299 床	3	16	48	28.00	84	17.44
	300～499 床	4	39	320	169.50	678	141.04
	500 床以上	14	4	510	142.50	1995	174.18
	全体	21	4	510	131.29	2757	157.21
(12) 周術期の循環動態の安定した低アルブミン血症の改善	0 床						
	1～299 床	33	1	134	16.82	555	28.03
	300～499 床	6	8	38	19.50	117	11.26
	500 床以上	11	4	289	130.09	1431	110.22
	全体	50	1	289	42.06	2103	72.36

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 妊娠高血圧症候群の改善	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	2	2	2	2.00	4	0.00
(14) 炎症性腸疾患の改善	0 床						
	1～299 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	300～499 床	1	7	7	7.00	7	
	500 床以上	4	1	2	1.25	5	0.50
	全体	8	1	7	2.00	16	2.07
(15) 蛋白資源としての栄養補給	0 床	2	8	10	9.00	18	1.41
	1～299 床	18	1	78	12.33	222	19.28
	300～499 床	1	5	5	5.00	5	
	500 床以上	4	1	117	37.25	149	54.42
	全体	25	1	117	15.76	394	26.98
(16) 末期患者	0 床	1	57	57	57.00	57	
	1～299 床	13	1	8	3.08	40	2.66
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	4	1	4	2.50	10	1.29
	全体	19	1	57	5.79	110	12.60
(17) 他の血症増量剤が適応とならない病態の改善	0 床						
	1～299 床	5	1	1	1.00	5	0.00
	300～499 床	2	1	17	9.00	18	11.31
	500 床以上	4	6	40	16.50	66	15.86
	全体	11	1	40	8.09	89	11.91
(18) その他	0 床	1	13	13	13.00	13	
	1～299 床	24	1	41	8.29	199	12.07
	300～499 床	11	1	166	34.00	374	52.62
	500 床以上	19	4	5106	757.84	14399	1434.50
	全体	55	1	5106	272.45	14985	901.80

1-207. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、の使用理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血性ショックの改善	0 床	4	1	28	8.50	34	13.03
	1～299 床	73	1	366	14.79	1080	51.71
	300～499 床	10	1	59	9.80	98	17.69
	500 床以上	17	1	174	34.94	594	48.77
	全体	104	1	366	17.37	1806	48.32
(2) 重症敗血症の改善	0 床	4	1	5	2.00	8	2.00
	1～299 床	95	1	595	15.98	1518	69.10
	300～499 床	13	1	120	16.54	215	31.75
	500 床以上	9	2	116	39.33	354	39.22
	全体	121	1	595	17.31	2095	63.16
(3) 肝硬変に伴う腹水の改善	0 床	23	1	48	5.35	123	10.53
	1～299 床	194	1	527	24.57	4767	74.52
	300～499 床	21	2	335	83.19	1747	109.96
	500 床以上	22	5	873	194.50	4279	241.70
	全体	260	1	873	41.98	10916	110.80
(4) 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群の改善	0 床	13	1	63	9.54	124	16.84
	1～299 床	132	1	184	10.88	1436	23.80
	300～499 床	13	1	607	120.08	1561	185.20
	500 床以上	16	3	494	69.81	1117	119.02
	全体	174	1	607	24.36	4238	71.35
(5) 循環動態が不安定な体外循環の改善	0 床	21	1	129	13.81	290	27.74
	1～299 床	98	1	369	15.67	1536	44.24
	300～499 床	16	1	138	26.25	420	40.65
	500 床以上	17	2	187	46.53	791	55.50
	全体	152	1	369	19.98	3037	44.17
(6) 凝固因子の補充を必要としない治療的血漿交換療法	0 床						
	1～299 床	6	1	277	58.33	350	108.54
	300～499 床	4	1	24	10.75	43	11.18
	500 床以上	12	1	463	103.08	1237	158.16
	全体	22	1	463	74.09	1630	131.30

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 重症熱傷	0 床						
	1～299 床	8	1	117	22.50	180	39.87
	300～499 床						
	500 床以上	6	3	47	18.83	113	18.32
	全体	14	1	117	20.93	293	31.44
(8) 低蛋白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫の改善	0 床	34	1	87	12.12	412	18.02
	1～299 床	299	1	554	22.58	6751	54.60
	300～499 床	23	1	1394	141.26	3249	303.76
	500 床以上	22	2	2226	470.64	10354	613.18
	全体	378	1	2226	54.94	20766	200.62
(9) 循環血漿量の著明な減少の改善	0 床	3	1	10	4.00	12	5.20
	1～299 床	93	1	100	9.22	857	15.92
	300～499 床	14	1	225	41.07	575	73.96
	500 床以上	17	2	837	171.00	2907	236.42
	全体	127	1	837	34.26	4351	104.21
(10) 脳虚血の改善	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	7	1	100	24.57	172	39.87
	300～499 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	500 床以上	3	2	12	6.00	18	5.29
	全体	13	1	100	15.08	196	30.26
(11) 人工心肺を使用する心臓手術	0 床						
	1～299 床	2	8	118	63.00	126	77.78
	300～499 床	3	4	45	24.67	74	20.50
	500 床以上	9	1	451	135.67	1221	164.36
	全体	14	1	451	101.50	1421	139.83
(12) 周術期の循環動態の安定した低アルブミン血症の改善	0 床	3	1	2	1.67	5	0.58
	1～299 床	84	1	351	15.95	1340	41.49
	300～499 床	8	1	158	48.50	388	64.68
	500 床以上	9	3	634	154.67	1392	211.92
	全体	104	1	634	30.05	3125	82.03

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 妊娠高血圧症候群の改善	0 床						
	1～299 床	4	1	9	4.25	17	3.95
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	6	1	9	3.33	20	3.39
(14) 炎症性腸疾患の改善	0 床						
	1～299 床	13	1	10	2.31	30	2.50
	300～499 床	2	20	22	21.00	42	1.41
	500 床以上	4	2	19	7.50	30	7.85
	全体	19	1	22	5.37	102	7.03
(15) 蛋白資源としての栄養補給	0 床	8	1	10	3.50	28	3.59
	1～299 床	76	1	500	22.91	1741	68.85
	300～499 床	8	1	100	19.88	159	33.31
	500 床以上	3	2	510	194.67	584	275.32
	全体	95	1	510	26.44	2512	80.25
(16) 末期患者	0 床	7	1	23	6.71	47	8.04
	1～299 床	62	1	37	5.37	333	7.52
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	6	1	13	6.00	36	4.52
	全体	76	1	37	5.50	418	7.27
(17) 他の血症増量剤が適応とならない病態の改善	0 床						
	1～299 床	7	1	6	3.14	22	2.19
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	2	8	84	46.00	92	53.74
	全体	10	1	84	11.60	116	25.55
(18) その他	0 床	5	1	13	4.60	23	4.83
	1～299 床	62	1	294	23.34	1447	48.48
	300～499 床	16	2	523	75.19	1203	140.33
	500 床以上	23	1	1878	500.13	11503	666.14
	全体	106	1	1878	133.74	14176	367.52

3-17) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について(全体)

1-208. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で加熱人血漿蛋白(等張アルブミン製剤:4.4%)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	7	3.52%	253	12.41%	45	13.12%	18	8.49%	323	11.57%
2	使用していない	192	96.48%	1785	87.59%	298	86.88%	194	91.51%	2469	88.43%
	回答施設合計	199		2038		343		212		2792	

1-209. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で加熱人血漿蛋白製剤(等張アルブミン製剤:4.4%)の使用本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (100mL) 使用本数	0 床	2	10	33	21.50	43	16.26
	1～299 床	16	2	289	39.06	625	75.76
	300～499 床	5	41	157	103.60	518	50.40
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	24	2	289	49.50	1188	71.24
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (250mL) 使用本数	0 床	5	1	708	221.40	1107	317.14
	1～299 床	229	1	869	61.00	13969	114.32
	300～499 床	37	9	664	166.27	6152	157.14
	500 床以上	15	25	2575	403.87	6058	674.15
	全体	286	1	2575	95.41	27286	210.24

【特別集計：加熱人血漿蛋白製剤使用量 (g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤	0 床	7	11.0	7788.0	1766.60	12366.2	3068.96
	1～299 床	245	8.8	9559.0	638.40	156409.0	1224.67
	300～499 床	41	99.0	7304.0	1706.13	69951.2	1685.78
	500 床以上	16	8.8	28325.0	4165.43	66646.8	7249.49
	全体	309	8.8	28325.0	988.26	305373.2	2237.03

【特別集計：一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量（g）】

一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量（g）（計算式：加熱人血漿蛋白製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤	1～299 床	245	0.0440	67.4667	4.68528	1147.8957	8.03
	300～499 床	41	0.3194	17.9901	4.65653	190.9179	4.25
	500 床以上	16	0.0141	49.0052	7.19365	115.0984	12.64
	全体	302	0.0141	67.4667	4.81427	1453.9120	7.93

3-18) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について(全体)

1-210. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	23	11.50%	1160	56.81%	312	94.26%	198	99.00%	1693	61.05%
2	使用していない	177	88.50%	882	43.19%	19	5.74%	2	1.00%	1080	38.95%
	回答施設合計	200		2042		331		200		2773	

1-211. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)の使用本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL) / 本	0 床	1	5	5	5.00	5	
	1～299 床	49	1	254	31.92	1564	51.11
	300～499 床	65	1	641	49.43	3213	93.31
	500 床以上	111	1	799	85.51	9492	109.44
	全体	226	1	799	63.16	14274	97.05
(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL) / 本	0 床	1	10	10	10.00	10	
	1～299 床	12	1	78	22.50	270	26.04
	300～499 床	10	5	106	25.70	257	32.55
	500 床以上	9	7	158	50.22	452	47.54
	全体	32	1	158	30.91	989	35.92

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL) / 本	0 床	16	1	176	18.38	294	42.65
	1～299 床	763	1	4659	90.65	69163	237.82
	300～499 床	236	1	3073	247.16	58330	348.27
	500 床以上	165	1	7138	770.79	127181	1235.81
	全体	1180	1	7138	216.07	254968	571.98
(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0 床	4	2	163	78.75	315	86.68
	1～299 床	466	1	3820	97.79	45571	224.80
	300～499 床	203	1	3559	343.96	69823	426.15
	500 床以上	158	13	6383	1119.48	176878	1054.62
	全体	831	1	6383	352.09	292587	657.04
(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL) / 本	0 床	1	10	10	10.00	10	
	1～299 床	41	1	1121	87.17	3574	213.12
	300～499 床	38	5	337	84.97	3229	83.15
	500 床以上	42	1	1054	242.90	10202	242.63
	全体	122	1	1121	139.47	17015	206.85
(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL) / 本	0 床						
	1～299 床	6	1	110	28.00	168	41.69
	300～499 床	20	1	670	63.75	1275	151.44
	500 床以上	45	1	459	70.56	3175	115.02
	全体	71	1	670	65.04	4618	121.67
(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL) / 本	0 床						
	1～299 床	74	1	969	71.68	5304	157.74
	300～499 床	77	1	753	62.12	4783	122.61
	500 床以上	70	1	1377	140.90	9863	237.13
	全体	221	1	1377	90.27	19950	179.71
(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL) / 本	0 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	1～299 床	145	1	787	46.19	6698	84.63
	300～499 床	114	1	962	137.82	15711	164.76
	500 床以上	119	2	4396	480.70	57203	578.96
	全体	380	1	4396	209.52	79616	387.61

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g／100mL)／本	0 床	1	25	25	25.00	25	
	1～299 床	40	1	166	34.08	1363	39.47
	300～499 床	60	2	621	76.75	4605	95.61
	500 床以上	65	2	757	164.92	10720	148.29
	全体	166	1	757	100.68	16713	122.93
(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g／200mL)／本	0 床						
	1～299 床	24	2	173	23.63	567	37.61
	300～499 床	20	1	75	25.35	507	22.93
	500 床以上	34	2	549	98.15	3337	110.71
	全体	78	1	549	56.55	4411	84.62

【特別集計：免疫グロブリン製剤使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0 床	23	2.5	837.5	117.07	2692.5	236.67
	1～299 床	1137	0.5	33967.5	447.98	509358.5	1443.79
	300～499 床	290	11.0	18055.0	2332.53	676433.5	2446.14
	500 床以上	186	32.5	43502.5	9654.63	1795760.5	7810.79
	全体	1636	0.5	43502.5	1824.11	2984245.0	4217.71

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	1～299 床	1137	0.0025	281.9737	3.67845	4182.4017	11.97
	300～499 床	290	0.0362	44.0366	5.99008	1737.1240	6.07
	500 床以上	186	0.0514	47.1525	13.22389	2459.6445	8.62
	全体	1613	0.0025	281.9737	5.19477	8379.1702	11.19

1-212. 免疫グロブリン製剤(静注)について平成30年4月～平成31年3月の期間で使用した製剤の適応疾患の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 重症感染症	0床	13	1	30	6.46	84	8.12
	1～299床	685	1	423	19.11	13090	46.26
	300～499床	115	1	1537	41.12	4729	148.58
	500床以上	73	1	494	61.37	4480	94.70
	全体	886	1	1537	25.26	22383	73.51
(2) 低・無ガンマグロブリン血症	0床	3	2	144	52.00	156	79.77
	1～299床	118	1	108	7.71	910	16.61
	300～499床	69	1	540	26.58	1834	84.13
	500床以上	63	1	650	90.76	5718	142.80
	全体	253	1	650	34.06	8618	90.85
(3) 川崎病	0床						
	1～299床	106	1	460	17.75	1882	55.76
	300～499床	84	1	186	27.94	2347	33.86
	500床以上	66	2	372	46.45	3066	58.36
	全体	256	1	460	28.50	7295	51.51
(4) ギラン・バレー症候群	0床	1	10	10	10.00	10	
	1～299床	78	1	137	9.51	742	25.39
	300～499床	56	1	178	7.84	439	24.23
	500床以上	66	1	244	21.62	1427	45.27
	全体	201	1	244	13.02	2618	33.35
(5) 特発性血小板減少性紫斑病	0床	1	1	1	1.00	1	
	1～299床	84	1	25	2.77	233	4.07
	300～499床	65	1	226	8.62	560	28.83
	500床以上	62	1	304	17.16	1064	44.58
	全体	212	1	304	8.76	1858	29.47
(6) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	0床	2	7	149	78.00	156	100.41
	1～299床	104	1	850	23.29	2422	98.18
	300～499床	53	1	241	14.96	793	41.60
	500床以上	57	1	2397	126.09	7187	355.89
	全体	216	1	2397	48.88	10558	200.65

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 多発筋炎・皮膚筋炎	0 床						
	1～299 床	33	1	905	34.03	1123	157.18
	300～499 床	35	1	342	16.74	586	58.77
	500 床以上	49	1	173	22.69	1112	37.73
	全体	117	1	905	24.11	2821	91.99
(8) 重症筋無力症	0 床						
	1～299 床	35	1	24	4.94	173	6.18
	300～499 床	35	1	921	29.46	1031	155.20
	500 床以上	52	1	940	50.50	2626	152.69
	全体	122	1	940	31.39	3830	130.25
(9) 天疱瘡	0 床						
	1～299 床	20	1	210	25.20	504	52.92
	300～499 床	33	1	50	6.61	218	10.80
	500 床以上	49	1	701	32.27	1581	102.83
	全体	102	1	701	22.58	2303	75.63
(10) チャーグ・ストラウス症候群	0 床						
	1～299 床	5	1	5	1.80	9	1.79
	300～499 床	10	1	5	2.00	20	1.63
	500 床以上	11	1	15	5.00	55	5.18
	全体	26	1	15	3.23	84	3.82
(11) スティーブンス・ジョンソン症候群	0 床						
	1～299 床	4	1	10	3.50	14	4.36
	300～499 床	9	1	3	1.67	15	1.00
	500 床以上	19	1	40	7.58	144	12.64
	全体	32	1	40	5.41	173	10.12
(12) 血清 IgG2 値の低下を伴う急性中耳炎および呼吸器感染症	0 床						
	1～299 床	12	1	4	1.58	19	1.00
	300～499 床	8	1	47	9.13	73	15.89
	500 床以上	12	1	93	15.33	184	28.24
	全体	32	1	93	8.63	276	19.42

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) その他	0 床	2	1	10	5.50	11	6.36
	1～299 床	116	1	500	18.06	2095	52.45
	300～499 床	57	1	616	33.82	1928	100.47
	500 床以上	55	1	3874	295.42	16248	837.88
	全体	230	1	3874	88.18	20282	427.78

1-213. 問 1-212 の件数はどこから情報を得ましたか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	各実施部門のシステム・記録簿	14	63.64%	635	72.00%	129	75.00%	54	54.00%	832	70.75%
2	保険係・事務	2	9.09%	97	11.00%	15	8.72%	23	23.00%	137	11.65%
3	輸血部門システム	0	0.00%	18	2.04%	2	1.16%	5	5.00%	25	2.13%
4	その他	7	31.82%	190	21.54%	34	19.77%	28	28.00%	259	22.02%
	回答施設合計	22		882		172		100		1176	

3-19) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について(個別製剤)

1-214. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の製剤種別集計データの主な抽出元は

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	システムから抽出	3	6.52%	449	37.57%	202	71.63%	151	86.29%	805	47.41%
2	システムを使用していないので手作業	43	93.48%	746	62.43%	80	28.37%	24	13.71%	893	52.59%
	回答施設合計	46		1195		282		175		1698	

1-215. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の、製剤種別、診療科別に使用本数を記入してください。

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	2	3	52	27.50	55	34.65
	300～499 床						
	500 床以上	19	1	31	12.16	231	10.24
	全体	21	1	52	13.62	286	13.26
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床	1	5	5	5.00	5	
	500 床以上	10	1	24	7.90	79	8.66
	全体	12	1	24	7.50	90	7.89
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	4	4	4.00	4	
	全体	1	4	4	4.00	4	
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	4	20	8.75	35	7.54
	全体	4	4	20	8.75	35	7.54
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	1	3	3	3.00	3	
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	2	3	6	4.50	9	2.12
	300～499 床						
	500 床以上	5	1	105	24.00	120	45.32
	全体	7	1	105	18.43	129	38.22

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	9	4	55	22.56	203	19.05
	全体	9	4	55	22.56	203	19.05
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	3	2.67	8	0.58
	全体	3	2	3	2.67	8	0.58
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床	1	34	34	34.00	34	
	500 床以上	9	2	19	9.78	88	6.36
	全体	11	2	34	11.36	125	9.64
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	1	5	5	5.00	5	
	300～499 床	3	1	31	11.00	33	17.32
	500 床以上	5	5	50	27.20	136	20.17
	全体	9	1	50	19.33	174	19.20
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	2	91	212	151.50	303	85.56
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	2	2	3	2.50	5	0.71
	全体	5	2	212	62.00	310	92.23
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	1	14	14	14.00	14	
	全体	2	3	14	8.50	17	7.78

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上	3	1	10	5.33	16	4.51
	全体	4	1	10	4.75	19	3.86
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	1	26	26	26.00	26	
	全体	2	3	26	14.50	29	16.26
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	3	2	36	14.33	43	18.82
	300～499 床	5	10	33	20.00	100	11.60
	500 床以上	23	1	255	43.17	993	60.70
	全体	31	1	255	36.65	1136	53.60
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上	7	1	26	14.43	101	9.88
	全体	8	1	26	13.88	111	9.28
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	24	24	24.00	24	
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	2	6	24	15.00	30	12.73
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	3	2	95	33.67	101	53.13
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	5	1	95	20.80	104	41.49

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	21	1	78	17.76	373	19.41
	300～499 床	36	1	209	32.92	1185	46.18
	500 床以上	84	1	323	52.88	4442	66.29
	全体	141	1	323	42.55	6000	58.07
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	22	22	22.00	22	
	500 床以上	9	1	30	9.22	83	10.67
	全体	10	1	30	10.50	105	10.84
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	2	12	38	25.00	50	18.38
	300～499 床	4	1	228	69.75	279	107.75
	500 床以上	10	3	70	17.70	177	19.19
	全体	16	1	228	31.63	506	55.57

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	44	44	44.00	44	
	500 床以上						
	全体	1	44	44	44.00	44	
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	48	48	48.00	48	
	500 床以上	2	7	15	11.00	22	5.66
	全体	3	7	48	23.33	70	21.73
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	2	5	6	5.50	11	0.71
	300～499 床	1	19	19	19.00	19	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	4	1	19	7.75	31	7.80
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	1	32	32	32.00	32	
	300～499 床	1	197	197	197.00	197	
	500 床以上						
	全体	2	32	197	114.50	229	116.67
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	18	18	18.00	18	
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	2	3	18	10.50	21	10.61
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	5	542	185.67	557	308.60
	500 床以上	1	57	57	57.00	57	
	全体	4	5	542	153.50	614	260.06
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	5	5	5.00	5	
	500 床以上						
	全体	1	5	5	5.00	5	
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	3	2	56	31.67	95	27.39
	300～499 床	4	10	377	103.75	415	182.18
	500 床以上	7	11	60	33.00	231	19.51
	全体	14	2	377	52.93	741	95.20
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	12	12	12.00	12	
	500 床以上						
	全体	2	1	12	6.50	13	7.78

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	18	2	192	31.44	566	49.59
	300～499 床	20	3	391	39.55	791	85.39
	500 床以上	50	1	378	29.70	1485	59.05
	全体	88	1	391	32.30	2842	63.66
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	68	1	304	24.16	1643	42.15
	300～499 床	43	1	139	30.47	1310	30.85
	500 床以上	49	1	306	43.18	2116	66.09
	全体	160	1	306	31.68	5069	48.83
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	25	2	55	17.04	426	17.17
	300～499 床	21	1	73	18.67	392	21.19
	500 床以上	27	2	569	50.11	1353	130.87
	全体	73	1	569	29.74	2171	81.58
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	4	1	12	6.00	24	4.55
	300～499 床	5	3	12	6.00	30	3.54
	500 床以上	12	1	58	16.92	203	20.68
	全体	21	1	58	12.24	257	16.48
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	26	1	98	12.92	336	22.40
	300～499 床	11	1	48	16.64	183	15.67
	500 床以上	13	1	55	16.46	214	17.70
	全体	50	1	98	14.66	733	19.65
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	5	1	6	3.80	19	2.17
	300～499 床	3	2	9	6.33	19	3.79
	500 床以上	18	1	80	23.28	419	26.58
	全体	26	1	80	17.58	457	23.64

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	11	2	210	55.18	607	76.65
	300～499 床	20	3	804	109.75	2195	176.92
	500 床以上	40	1	1225	151.53	6061	245.57
	全体	71	1	1225	124.83	8863	210.16
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	22	1	292	25.86	569	60.66
	300～499 床	19	1	79	18.05	343	22.23
	500 床以上	30	1	389	28.10	843	72.05
	全体	71	1	389	24.72	1755	58.30
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	61	1	108	18.77	1145	19.52
	300～499 床	35	1	230	38.23	1338	50.67
	500 床以上	36	1	226	27.33	984	42.65
	全体	132	1	230	26.27	3467	37.30
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	33	1	423	63.45	2094	89.39
	300～499 床	30	1	432	68.07	2042	91.45
	500 床以上	63	2	1821	170.10	10716	310.67
	全体	126	1	1821	117.87	14852	233.69
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	42	1	658	46.74	1963	116.27
	300～499 床	28	1	162	24.36	682	36.68
	500 床以上	33	1	457	32.97	1088	80.63
	全体	103	1	658	36.24	3733	88.98
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	65	1	379	27.74	1803	53.66
	300～499 床	44	1	225	30.09	1324	46.35
	500 床以上	41	1	344	30.27	1241	69.72
	全体	150	1	379	29.12	4368	56.25

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	20	1	150	25.35	507	38.36
	300～499 床	26	1	187	28.42	739	43.02
	500 床以上	31	1	987	110.65	3430	243.57
	全体	77	1	987	60.73	4676	161.55
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	20	1	76	16.05	321	19.87
	300～499 床	21	2	136	29.81	626	35.46
	500 床以上	35	1	661	75.51	2643	137.45
	全体	76	1	661	47.24	3590	98.58
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	45	2	3998	245.71	11057	615.36
	300～499 床	73	1	745	108.88	7948	179.92
	500 床以上	87	1	6792	458.87	39922	1103.29
	全体	205	1	6792	287.45	58927	794.09
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	9	2	348	52.11	469	112.54
	300～499 床	21	1	349	46.52	977	84.09
	500 床以上	39	1	647	84.23	3285	140.21
	全体	69	1	647	68.57	4731	121.99
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	6	2	12	6.67	40	3.56
	300～499 床	7	3	162	43.29	303	62.48
	500 床以上	5	4	11	6.00	30	2.83
	全体	18	2	162	20.72	373	41.55
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	79	1	380	39.08	3087	54.10
	300～499 床	36	1	514	89.22	3212	137.69
	500 床以上	21	2	662	89.95	1889	177.83
	全体	136	1	662	60.21	8188	109.16

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	7	7	7.00	7	
	500 床以上	4	3	130	53.25	213	54.94
	全体	5	3	130	44.00	220	51.88
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	78	1	524	82.47	6433	121.12
	300～499 床	94	1	1364	95.87	9012	180.47
	500 床以上	100	1	1011	164.70	16470	216.23
	全体	272	1	1364	117.33	31915	183.75
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	8	2	131	31.50	252	44.18
	500 床以上	4	3	8	5.25	21	2.06
	全体	12	2	131	22.75	273	37.56
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	5	1	9	4.80	24	3.63
	300～499 床	18	1	94	27.83	501	31.20
	500 床以上	41	1	163	24.32	997	34.20
	全体	64	1	163	23.78	1522	32.25
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	3	24	13.50	27	14.85
	500 床以上	4	1	6	3.50	14	2.08
	全体	6	1	24	6.83	41	8.57
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	12	1	33	12.50	150	10.32
	300～499 床	14	2	701	64.07	897	183.97
	500 床以上	13	1	210	43.46	565	64.55
	全体	39	1	701	41.33	1612	115.67

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	10	1	25	7.20	72	6.73
	300～499 床	16	3	113	27.69	443	30.04
	500 床以上	66	2	322	26.18	1728	49.93
	全体	92	1	322	24.38	2243	44.40
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	43	1	115	18.93	814	21.53
	300～499 床	53	1	141	31.58	1674	38.43
	500 床以上	59	1	372	52.42	3093	64.74
	全体	155	1	372	36.01	5581	48.94
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	21	1	396	41.57	873	91.08
	300～499 床	17	2	1362	91.53	1556	327.60
	500 床以上	33	1	467	22.27	735	80.15
	全体	71	1	1362	44.56	3164	174.96
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床	2	5	9	7.00	14	2.83
	300～499 床	8	2	30	7.88	63	9.26
	500 床以上	31	1	318	28.29	877	58.36
	全体	41	1	318	23.27	954	51.48
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	10	1	24	6.70	67	7.47
	300～499 床	8	2	6	3.25	26	1.49
	500 床以上	24	1	60	11.96	287	15.26
	全体	42	1	60	9.05	380	12.49
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	300～499 床	10	1	40	9.10	91	12.18
	500 床以上	31	1	38	10.97	340	11.48
	全体	43	1	40	10.14	436	11.38

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	12	8	420	60.00	720	114.29
	300～499 床	36	3	605	78.83	2838	103.21
	500 床以上	72	1	1206	167.67	12072	207.61
	全体	120	1	1206	130.25	15630	179.45
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	12	3	137	25.75	309	38.50
	300～499 床	20	1	47	7.25	145	10.25
	500 床以上	40	2	500	33.50	1340	80.57
	全体	72	1	500	24.92	1794	62.87
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	30	1	82	20.60	618	21.04
	300～499 床	29	1	112	18.24	529	23.51
	500 床以上	46	1	190	29.17	1342	37.64
	全体	105	1	190	23.70	2489	30.16
(10) 血液内科	0 床	1	10	10	10.00	10	
	1～299 床	25	1	243	53.44	1336	68.49
	300～499 床	45	1	566	93.76	4219	116.10
	500 床以上	88	2	1117	166.59	14660	192.35
	全体	159	1	1117	127.20	20225	164.23
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	31	1	149	16.32	506	28.19
	300～499 床	30	1	42	9.80	294	10.96
	500 床以上	45	1	131	14.58	656	23.37
	全体	106	1	149	13.74	1456	22.26
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	37	1	129	15.27	565	25.48
	300～499 床	44	1	379	32.30	1421	67.42
	500 床以上	54	2	259	26.78	1446	46.80
	全体	135	1	379	25.42	3432	50.44

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	18	2	268	27.00	486	61.86
	300～499 床	33	1	1156	48.61	1604	199.46
	500 床以上	53	2	151	26.17	1387	30.07
	全体	104	1	1156	33.43	3477	116.43
(14) 腎臓内科	0 床	1	144	144	144.00	144	
	1～299 床	14	1	99	17.71	248	30.42
	300～499 床	27	1	170	19.67	531	36.30
	500 床以上	48	2	638	54.73	2627	105.74
	全体	90	1	638	39.44	3550	82.87
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	49	3	3370	285.29	13979	522.58
	300～499 床	69	3	1806	226.13	15603	255.73
	500 床以上	96	10	3890	655.01	62881	708.83
	全体	214	3	3890	432.07	92463	589.58
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	14	1	343	47.57	666	90.87
	300～499 床	20	2	288	70.20	1404	75.90
	500 床以上	53	1	771	106.15	5626	141.98
	全体	87	1	771	88.46	7696	123.50
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	2	69	129	99.00	198	42.43
	300～499 床	9	1	35	6.67	60	10.93
	500 床以上	11	1	235	29.18	321	68.93
	全体	22	1	235	26.32	579	55.38
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	36	1	423	49.94	1798	80.36
	300～499 床	29	1	495	53.34	1547	97.43
	500 床以上	29	1	2212	134.52	3901	407.87
	全体	94	1	2212	77.09	7246	238.46

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床	3	3	40	26.33	79	20.31
	300～499 床	3	5	25	12.33	37	11.02
	500 床以上	4	2	90	37.25	149	42.73
	全体	10	2	90	26.50	265	29.08
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	54	1	614	78.85	4258	122.87
	300～499 床	77	1	555	117.01	9010	121.73
	500 床以上	94	2	746	187.39	17615	162.48
	全体	225	1	746	137.26	30883	146.90
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床	1	11	11	11.00	11	
	300～499 床	4	3	50	19.50	78	20.92
	500 床以上	7	1	636	101.14	708	235.99
	全体	12	1	636	66.42	797	179.84
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	5	2	29	12.40	62	12.64
	300～499 床	11	1	201	44.45	489	68.90
	500 床以上	59	1	272	38.46	2269	54.92
	全体	75	1	272	37.60	2820	55.36
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	2	24	13.00	26	15.56
	500 床以上	5	1	20	6.00	30	7.87
	全体	7	1	24	8.00	56	9.66
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	8	1	13	5.00	40	4.04
	300～499 床	9	1	14	4.44	40	4.03
	500 床以上	21	1	196	29.62	622	46.05
	全体	38	1	196	18.47	702	36.20

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	2	3	4	3.50	7	0.71
	500 床以上	3	3	12	8.33	25	4.73
	全体	6	1	12	5.50	33	4.42
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	3	20	11.50	23	12.02
	500 床以上	3	2	10	4.67	14	4.62
	全体	5	2	20	7.40	37	7.80
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	126	126	126.00	126	
	500 床以上						
	全体	1	126	126	126.00	126	
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	10	15	12.50	25	3.54
	全体	2	10	15	12.50	25	3.54
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上	2	6	23	14.50	29	12.02
	全体	3	6	23	13.00	39	8.89
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	30	30	30.00	30	
	500 床以上	3	6	15	10.00	30	4.58
	全体	4	6	30	15.00	60	10.68

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	5	3	25	12.60	63	8.88
	500 床以上	14	5	105	34.86	488	32.99
	全体	19	3	105	29.00	551	30.08
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	10	6.00	18	4.00
	全体	3	2	10	6.00	18	4.00
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	15	15	15.00	15	
	500 床以上	3	1	23	8.33	25	12.70
	全体	5	1	23	8.20	41	10.26
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	1	38	38	38.00	38	
	300～499 床	2	3	61	32.00	64	41.01
	500 床以上	15	1	103	43.27	649	35.44
	全体	18	1	103	41.72	751	33.87
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	3	11	6.00	18	4.36
	全体	3	3	11	6.00	18	4.36
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	10	18	14.00	28	5.66
	500 床以上	5	2	42	16.00	80	15.80
	全体	7	2	42	15.43	108	13.14

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	6	2	10	4.67	28	2.94
	全体	7	2	10	4.29	30	2.87
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上	11	1	70	18.36	202	22.62
	全体	12	1	70	17.67	212	21.70
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	9	2	1121	276.11	2485	414.62
	300～499 床	15	10	266	62.20	933	64.83
	500 床以上	28	14	429	147.79	4138	109.83
	全体	52	2	1121	145.31	7556	198.90
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	2	45	50	47.50	95	3.54
	300～499 床	5	10	81	29.20	146	29.47
	500 床以上	14	3	152	57.71	808	53.38
	全体	21	3	152	49.95	1049	46.66
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	2	5	10	7.50	15	3.54
	300～499 床	6	2	63	22.50	135	26.46
	500 床以上	4	18	79	46.75	187	32.26
	全体	12	2	79	28.08	337	28.71

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	13	13	13.00	13	
	全体	1	13	13	13.00	13	
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	3	1	31	20.00	60	16.52
	300～499 床	7	4	141	45.14	316	48.12
	500 床以上	18	2	194	44.94	809	48.18
	全体	28	1	194	42.32	1185	45.37
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	65	65	65.00	65	
	500 床以上						
	全体	1	65	65	65.00	65	
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上	5	1	30	9.00	45	11.98
	全体	6	1	30	8.17	49	10.91
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	1	30	30	30.00	30	
	300～499 床	2	5	19	12.00	24	9.90
	500 床以上						
	全体	3	5	30	18.00	54	12.53

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	1	15	15	15.00	15	
	300～499 床	1	8	8	8.00	8	
	500 床以上	7	2	43	11.86	83	14.96
	全体	9	2	43	11.78	106	13.07
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	1	18	18	18.00	18	
	300～499 床	1	18	18	18.00	18	
	500 床以上	3	3	34	18.33	55	15.50
	全体	5	3	34	18.20	91	10.96
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	2	4	7	5.50	11	2.12
	全体	3	3	7	4.67	14	2.08
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	4	133	68.50	137	91.22
	全体	2	4	133	68.50	137	91.22
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	1	15	6.67	20	7.37
	全体	3	1	15	6.67	20	7.37

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	10	10	10.00	10	
	500 床以上	4	5	133	40.75	163	61.91
	全体	5	5	133	34.60	173	55.35
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	113	113	113.00	113	
	500 床以上	5	6	34	19.40	97	10.67
	全体	6	6	113	35.00	210	39.39
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	24	24	24.00	24	
	500 床以上	4	4	11	8.00	32	3.16
	全体	5	4	24	11.20	56	7.66
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	2	8	49	28.50	57	28.99
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	1	8	8	8.00	8	
	全体	4	3	49	17.00	68	21.46
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	500 床以上	1	4	4	4.00	4	
	全体	3	1	4	2.33	7	1.53

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	1	16	16	16.00	16	
	300～499 床	1	9	9	9.00	9	
	500 床以上	2	2	20	11.00	22	12.73
	全体	4	2	20	11.75	47	7.93
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床	3	10	511	183.67	551	283.66
	500 床以上	11	2	415	67.73	745	118.01
	全体	15	2	511	86.80	1302	155.58
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	4	35	13.00	52	14.76
	全体	4	4	35	13.00	52	14.76
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	17	30	23.50	47	9.19
	500 床以上	1	16	16	16.00	16	
	全体	3	16	30	21.00	63	7.81

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	4	9	21	13.25	53	5.68
	300～499 床	12	1	233	31.50	378	64.17
	500 床以上	31	2	239	36.16	1121	52.44
	全体	47	1	239	33.02	1552	53.12
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	7	7	7.00	7	
	500 床以上						
	全体	1	7	7	7.00	7	
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	7	5.00	15	2.65
	全体	3	2	7	5.00	15	2.65
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	8	511	259.50	519	355.67
	500 床以上	3	2	11	6.00	18	4.58
	全体	5	2	511	107.40	537	225.64

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	2	8	26	17.00	34	12.73
	300～499 床	5	1	24	14.40	72	11.01
	500 床以上	14	1	272	24.79	347	71.40
	全体	21	1	272	21.57	453	58.04
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	5	17	40	28.20	141	8.96
	300～499 床	9	1	285	55.56	500	97.91
	500 床以上	12	4	111	21.17	254	32.02
	全体	26	1	285	34.42	895	61.52
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	2	120	58.00	174	59.23
	500 床以上	8	1	45	11.88	95	16.92
	全体	11	1	120	24.45	269	36.96
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	2	4	6	5.00	10	1.41
	全体	3	1	6	3.67	11	2.52
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	53	53	53.00	53	
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	2	3	53	28.00	56	35.36
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上	3	3	7	4.33	13	2.31
	全体	4	3	7	4.25	17	1.89

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	2	65	19.25	77	30.53
	500 床以上	17	3	269	35.00	595	65.44
	全体	21	2	269	32.00	672	60.05
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	3	33	18.00	36	21.21
	500 床以上	7	1	9	4.71	33	3.09
	全体	9	1	33	7.67	69	9.89
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	3	2	13	7.00	21	5.57
	300～499 床	9	2	88	18.56	167	28.61
	500 床以上	10	1	158	26.00	260	49.39
	全体	22	1	158	20.36	448	37.45
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	4	3	95	32.50	130	43.24
	300～499 床	7	1	52	16.71	117	17.96
	500 床以上	19	2	185	26.05	495	41.56
	全体	30	1	185	24.73	742	36.84
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	5	1	18	6.40	32	6.73
	300～499 床	2	1	56	28.50	57	38.89
	500 床以上	9	1	26	8.67	78	8.92
	全体	16	1	56	10.44	167	14.36
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	2	3	4	3.50	7	0.71
	300～499 床	7	2	22	6.43	45	7.07
	500 床以上	9	5	48	11.44	103	14.14
	全体	18	2	48	8.61	155	11.00

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	2	5	66	35.50	71	43.13
	300～499 床	2	5	12	8.50	17	4.95
	500 床以上	5	2	18	7.60	38	6.58
	全体	9	2	66	14.00	126	20.15
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	3	1	6	4.33	13	2.89
	300～499 床	5	3	71	34.20	171	32.63
	500 床以上	9	1	48	13.78	124	15.59
	全体	17	1	71	18.12	308	22.71
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	7	3	257	63.86	447	90.05
	300～499 床	24	1	79	18.33	440	18.25
	500 床以上	39	3	862	59.28	2312	139.91
	全体	70	1	862	45.70	3199	109.52
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	5	2.33	7	2.31
	500 床以上	13	2	164	24.85	323	44.97
	全体	16	1	164	20.63	330	41.24
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	2	2	3	2.50	5	0.71
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	2	3	77	40.00	80	52.33
	300～499 床	5	1	21	13.20	66	7.92
	500 床以上	3	2	13	5.67	17	6.35
	全体	10	1	77	16.30	163	22.56

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	14	1	427	56.21	787	115.19
	300～499 床	34	1	274	28.94	984	57.51
	500 床以上	47	2	608	64.68	3040	100.60
	全体	95	1	608	50.64	4811	90.68
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	3	184	93.50	187	127.99
	500 床以上	2	3	11	7.00	14	5.66
	全体	4	3	184	50.25	201	89.25
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床	3	2	5	3.33	10	1.53
	500 床以上	10	1	17	5.10	51	5.02
	全体	14	1	17	4.79	67	4.30
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	1	3	3	3.00	3	
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	53	145	83.67	251	53.12
	500 床以上	3	3	10	6.33	19	3.51
	全体	6	3	145	45.00	270	54.11

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床	8	1	7	4.00	32	2.14
	500 床以上	36	1	237	25.39	914	52.62
	全体	45	1	237	21.16	952	47.71
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	14	3	80	18.71	262	25.66
	300～499 床	32	1	64	12.41	397	14.92
	500 床以上	43	1	205	33.40	1436	50.12
	全体	89	1	205	23.54	2095	38.35
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	5	1	21	12.60	63	8.62
	300～499 床	4	3	7	4.75	19	2.06
	500 床以上	16	1	69	12.88	206	18.51
	全体	25	1	69	11.52	288	15.37
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	2	8	5.00	10	4.24
	500 床以上	16	2	90	14.94	239	23.73
	全体	18	2	90	13.83	249	22.54
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床	1	7	7	7.00	7	
	300～499 床	6	2	10	5.00	30	2.83
	500 床以上	14	1	42	8.57	120	11.79
	全体	21	1	42	7.48	157	9.75
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床	1	10	10	10.00	10	
	300～499 床	3	2	20	8.33	25	10.12
	500 床以上	16	1	50	12.88	206	13.98
	全体	20	1	50	12.05	241	12.96

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床	1	35	35	35.00	35	
	300～499 床	10	2	58	23.50	235	21.86
	500 床以上	39	1	687	53.72	2095	111.81
	全体	50	1	687	47.30	2365	99.67
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床	3	3	30	16.67	50	13.50
	300～499 床	8	1	54	9.50	76	18.04
	500 床以上	28	1	70	11.75	329	15.67
	全体	39	1	70	11.67	455	15.72
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	8	3	97	23.00	184	30.51
	300～499 床	14	1	34	10.43	146	9.93
	500 床以上	29	1	62	17.07	495	15.64
	全体	51	1	97	16.18	825	17.61
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	14	1	150	28.50	399	43.16
	300～499 床	26	1	284	55.31	1438	74.04
	500 床以上	75	1	1740	155.29	11647	268.48
	全体	115	1	1740	117.25	13484	225.83
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	9	1	46	10.89	98	16.59
	300～499 床	11	1	20	5.91	65	5.66
	500 床以上	32	1	170	15.94	510	30.90
	全体	52	1	170	12.94	673	25.43
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	8	3	80	16.38	131	25.99
	300～499 床	23	1	51	12.22	281	14.76
	500 床以上	29	1	160	19.24	558	33.00
	全体	60	1	160	16.17	970	26.25

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	4	1	6	3.75	15	2.22
	300～499 床	13	1	25	7.85	102	6.73
	500 床以上	33	1	76	15.61	515	18.22
	全体	50	1	76	12.64	632	15.70
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床	2	1	15	8.00	16	9.90
	300～499 床	10	2	54	15.60	156	18.52
	500 床以上	27	1	77	14.41	389	16.18
	全体	39	1	77	14.38	561	16.30
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	10	7	362	61.10	611	107.15
	300～499 床	33	4	348	90.36	2982	94.50
	500 床以上	70	2	2202	184.56	12919	343.32
	全体	113	2	2202	146.12	16512	280.31
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	4	3	13	6.75	27	4.35
	300～499 床	9	1	129	44.67	402	41.43
	500 床以上	39	1	181	44.82	1748	49.50
	全体	52	1	181	41.87	2177	46.91
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	1	6	6	6.00	6	
	300～499 床	2	2	6	4.00	8	2.83
	500 床以上	2	9	85	47.00	94	53.74
	全体	5	2	85	21.60	108	35.53
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床	13	1	182	17.54	228	49.51
	300～499 床	14	2	265	33.07	463	70.18
	500 床以上	14	2	374	54.64	765	104.52
	全体	41	1	374	35.51	1456	78.24

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	18	18	18.00	18	
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	2	2	18	10.00	20	11.31
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	20	2	82	24.30	486	22.35
	300～499 床	47	1	879	63.81	2999	147.13
	500 床以上	68	4	732	133.84	9101	172.11
	全体	135	1	879	93.23	12586	155.44
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	6	8	7.00	14	1.41
	500 床以上	4	3	11	5.50	22	3.79
	全体	6	3	11	6.00	36	3.10
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床	2	3	36	19.50	39	23.33
	300～499 床	3	3	45	17.33	52	23.97
	500 床以上	38	1	151	14.39	547	25.80
	全体	43	1	151	14.84	638	25.07
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	25	10.75	43	11.09
	全体	4	1	25	10.75	43	11.09
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床	5	2	14	7.60	38	5.59
	500 床以上	12	1	95	21.08	253	31.26
	全体	18	1	95	16.33	294	26.24

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	4	11	7.50	15	4.95
	全体	2	4	11	7.50	15	4.95
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床	1	3	3	3.00	3	
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	15	5.50	22	6.40
	全体	5	1	15	5.00	25	5.66
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床	2	5	18	11.50	23	9.19
	300～499 床						
	500 床以上	4	4	182	50.50	202	87.70
	全体	6	4	182	37.50	225	70.98
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上						
	全体	1	4	4	4.00	4	
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	10	5.50	11	6.36
	全体	2	1	10	5.50	11	6.36
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	8	20	14.00	28	8.49
	500 床以上	3	2	6	3.33	10	2.31
	全体	5	2	20	7.60	38	7.40

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	5	1	35	15.80	79	14.02
	500 床以上	10	5	122	36.60	366	43.74
	全体	15	1	122	29.67	445	37.27
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	6	20	14.33	43	7.37
	全体	3	6	20	14.33	43	7.37
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	3	12	7.50	15	6.36
	500 床以上	7	2	20	6.29	44	6.21
	全体	9	2	20	6.56	59	5.85
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床	2	131	156	143.50	287	17.68
	300～499 床	12	2	131	34.67	416	43.30
	500 床以上	33	2	166	32.61	1076	37.87
	全体	47	2	166	37.85	1779	44.28
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	2	2	3	2.50	5	0.71
	300～499 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	500 床以上	4	1	13	7.00	28	5.48
	全体	9	1	13	4.11	37	4.37
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500 床以上	4	4	15	9.00	36	4.55
	全体	6	1	15	6.83	41	4.96

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床	1	20	20	20.00	20	
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	39	12.25	49	17.91
	全体	5	1	39	13.80	69	15.90
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	5	1	43	12.60	63	17.44
	500 床以上	5	2	41	15.80	79	14.94
	全体	10	1	43	14.20	142	15.40
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	9	1	39	10.00	90	13.16
	300～499 床	25	5	220	55.76	1394	56.41
	500 床以上	33	10	472	99.39	3280	105.70
	全体	67	1	472	71.10	4764	87.14
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	2	5	19	12.00	24	9.90
	300～499 床	5	1	10	8.00	40	3.94
	500 床以上	16	1	133	30.94	495	33.04
	全体	23	1	133	24.30	559	29.29
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床	1	10	10	10.00	10	
	300～499 床	2	1	29	15.00	30	19.80
	500 床以上						
	全体	3	1	29	13.33	40	14.29
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	7	1	30	10.29	72	9.60
	500 床以上	5	2	48	19.80	99	19.29
	全体	12	1	48	14.25	171	14.48

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	11	2	114	24.82	273	31.11
	300～499 床	21	1	330	55.14	1158	84.59
	500 床以上	36	1	243	51.22	1844	57.11
	全体	68	1	330	48.16	3275	63.98
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	192	192	192.00	192	
	500 床以上	1	8	8	8.00	8	
	全体	2	8	192	100.00	200	130.11
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	2	7	4.50	9	3.54
	500 床以上	3	2	11	5.67	17	4.73
	全体	5	2	11	5.20	26	3.83
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	13	5.00	15	6.93
	500 床以上	3	1	4	3.00	9	1.73
	全体	6	1	13	4.00	24	4.65

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	3	6	4.50	9	2.12
	全体	2	3	6	4.50	9	2.12
(2) 消化器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 脳神経外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	5	5	5.00	5	
	全体	1	5	5	5.00	5	
(4) 呼吸器外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(5) 整形外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 産婦人科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	3	2.33	7	0.58
	全体	3	2	3	2.33	7	0.58

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	6	35	20.50	41	20.51
	500 床以上	10	1	39	16.50	165	13.22
	全体	12	1	39	17.17	206	13.55
(8) 泌尿器科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	3	5	9	6.33	19	2.31
	全体	3	5	9	6.33	19	2.31
(9) その他の外科	0 床						
	1～299 床	1	20	20	20.00	20	
	300～499 床						
	500 床以上	1	26	26	26.00	26	
	全体	2	20	26	23.00	46	4.24
(10) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	2	5	3.50	7	2.12
	500 床以上	9	1	42	16.44	148	14.29
	全体	11	1	42	14.09	155	13.83
(11) 循環器内科	0 床						
	1～299 床	1	5	5	5.00	5	
	300～499 床						
	500 床以上	3	2	12	5.67	17	5.51
	全体	4	2	12	5.50	22	4.51
(12) 消化器内科	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床						
	500 床以上	3	1	12	7.00	21	5.57
	全体	4	1	12	6.25	25	4.79

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	4	1	6	3.25	13	2.22
	全体	4	1	6	3.25	13	2.22
(14) 腎臓内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	3	3	3.00	3	
	500 床以上	5	1	24	10.20	51	8.70
	全体	6	1	24	9.00	54	8.32
(15) 神経内科	0 床						
	1～299 床	10	2	142	36.80	368	46.27
	300～499 床	10	2	35	17.10	171	13.40
	500 床以上	22	2	439	73.05	1607	98.89
	全体	42	2	439	51.10	2146	78.15
(16) 膠原病リウマチ科	0 床						
	1～299 床	3	1	20	8.67	26	10.02
	300～499 床						
	500 床以上	11	1	35	14.00	154	10.91
	全体	14	1	35	12.86	180	10.59
(17) 内分泌代謝科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(18) その他の内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	5	15	9.33	28	5.13
	500 床以上	6	2	75	24.33	146	27.44
	全体	9	2	75	19.33	174	23.10

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(20) 小児科	0 床						
	1～299 床	1	8	8	8.00	8	
	300～499 床	3	1	37	15.00	45	19.29
	500 床以上	16	1	49	16.63	266	15.42
	全体	20	1	49	15.95	319	15.19
(21) 腫瘍治療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	5	5	5.00	5	
	全体	1	5	5	5.00	5	
(22) 救急科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	6	1	6	2.83	17	1.94
	全体	6	1	6	2.83	17	1.94
(23) 歯科・口腔外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(24) その他の診療科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	29	15.50	31	19.09
	全体	2	2	29	15.50	31	19.09

1-216. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の、製剤種別、使用場所別に使用本数を記入してください。

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	20	1	446	52.40	1048	103.44
	300～499 床	36	2	2990	118.86	4279	494.71
	500 床以上	69	1	258	58.36	4027	57.92
	全体	125	1	2990	74.83	9354	270.84
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	2	1	5	3.00	6	2.83
	300～499 床	7	1	28	9.29	65	9.34
	500 床以上	11	1	168	26.55	292	48.94
	全体	20	1	168	18.15	363	37.18
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	5	3	64	17.20	86	26.20
	300～499 床	9	1	228	63.11	568	82.04
	500 床以上	32	1	253	32.91	1053	48.54
	全体	46	1	253	37.11	1707	55.43
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	4	2	98	51.00	204	41.87
	300～499 床	8	5	950	203.00	1624	333.58
	500 床以上	7	7	81	35.29	247	28.71
	全体	19	2	950	109.21	2075	225.01
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	3	8	36	18.00	54	15.62
	500 床以上						
	全体	4	1	36	13.75	55	15.33
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	6	6	6.00	6	
	500 床以上						
	全体	2	1	6	3.50	7	3.54
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	1	8	8	8.00	8	
	300～499 床	1	246	246	246.00	246	
	500 床以上	2	1	3	2.00	4	1.41
	全体	4	1	246	64.50	258	121.04
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	237	1	4438	109.26	25895	339.61
	300～499 床	128	1	1598	176.96	22651	251.69
	500 床以上	103	1	6895	590.88	60861	1033.31
	全体	468	1	6895	233.78	109407	587.88
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	50	1	788	51.82	2591	123.02
	300～499 床	56	1	577	55.30	3097	90.62
	500 床以上	65	1	1558	175.08	11380	310.21
	全体	171	1	1558	99.81	17068	216.20
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	4	1	240	63.00	252	118.05
	300～499 床	4	1	64	19.00	76	30.14
	500 床以上	9	2	57	18.44	166	19.88
	全体	17	1	240	29.06	494	57.95
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	4	1	286	85.75	343	135.78
	300～499 床	1	168	168	168.00	168	
	500 床以上	2	2	72	37.00	74	49.50
	全体	7	1	286	83.57	585	107.42
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	24	1	132	32.71	785	35.46
	300～499 床	39	1	191	37.85	1476	37.79
	500 床以上	61	1	567	77.62	4735	110.28
	全体	124	1	567	56.42	6996	83.97
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	154	1	3769	127.90	19696	331.40
	300～499 床	119	3	2048	276.56	32911	307.71
	500 床以上	100	6	4148	804.44	80444	784.71
	全体	373	1	4148	356.71	133051	562.76
(2) 外来	0 床	1	144	144	144.00	144	
	1～299 床	49	1	342	74.67	3659	93.06
	300～499 床	66	1	1335	99.77	6585	187.44
	500 床以上	87	1	1725	298.61	25979	391.65
	全体	203	1	1725	179.15	36367	299.21
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床	2	2	4	3.00	6	1.41
	300～499 床	3	1	6	2.67	8	2.89
	500 床以上	11	1	63	16.00	176	22.92
	全体	16	1	63	11.88	190	19.79
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	5	2	6	3.20	16	1.64
	300～499 床	5	1	24	9.20	46	9.73
	500 床以上	6	3	12	7.33	44	3.50
	全体	16	1	24	6.63	106	6.03
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	23	2	55	16.26	374	15.94
	300～499 床	42	2	154	44.81	1882	40.06
	500 床以上	64	3	673	92.30	5907	128.73
	全体	129	2	673	63.28	8163	98.20
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	8	2	995	183.00	1464	332.11
	300～499 床	16	10	236	64.94	1039	64.33
	500 床以上	28	1	836	202.04	5657	192.43
	全体	52	1	995	156.92	8160	199.60
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	8	1	126	46.13	369	41.50
	300～499 床	11	2	116	37.91	417	38.29
	500 床以上	19	3	286	67.26	1278	66.97
	全体	38	1	286	54.32	2064	55.54
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	4	4	4.00	4	
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	2	2	4	3.00	6	1.41
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	15	15	15.00	15	
	500 床以上						
	全体	2	1	15	8.00	16	9.90
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	3	1	7	4.33	13	3.06
	300～499 床	2	5	5	5.00	10	0.00
	500 床以上	10	2	47	22.10	221	15.98
	全体	15	1	47	16.27	244	15.44
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	4	9	71	31.50	126	28.12
	300～499 床	14	1	148	22.43	314	37.57
	500 床以上	25	2	366	37.28	932	72.66
	全体	43	1	366	31.91	1372	59.65
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	2	11	30	20.50	41	13.44
	500 床以上	5	2	19	9.60	48	7.44
	全体	8	1	30	11.25	90	9.94
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	1	39	39	39.00	39	
	300～499 床	5	1	511	160.20	801	228.91
	500 床以上	14	1	108	28.36	397	35.88
	全体	20	1	511	61.85	1237	123.74
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	25	1	467	62.16	1554	105.15
	300～499 床	41	1	692	58.59	2402	135.98
	500 床以上	43	1	938	112.35	4831	177.25
	全体	109	1	938	80.61	8787	148.95
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	7	1	77	19.57	137	28.02
	300～499 床	13	1	61	19.00	247	21.80
	500 床以上	27	2	228	31.30	845	48.46
	全体	47	1	228	26.15	1229	39.88
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	1	9	9	9.00	9	
	全体	2	1	9	5.00	10	5.66
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	4	6	132	44.00	176	59.93
	300～499 床	14	3	110	22.29	312	30.53
	500 床以上	23	1	397	41.61	957	92.15
	全体	41	1	397	35.24	1445	73.03
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	48	1	362	47.48	2279	72.35
	300～499 床	66	1	787	102.17	6743	125.59
	500 床以上	71	2	1431	318.34	22602	316.96
	全体	185	1	1431	170.94	31624	243.28
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	19	1	26	10.37	197	7.60
	300～499 床	35	1	208	45.29	1585	55.85
	500 床以上	58	1	720	109.07	6326	142.79
	全体	112	1	720	72.39	8108	114.14
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	1	6	2.75	11	2.22
	500 床以上	5	1	42	11.80	59	17.20
	全体	9	1	42	7.78	70	13.13
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	2	4	259	131.50	263	180.31
	全体	4	1	259	66.50	266	128.34
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床	4	2	9	5.75	23	2.87
	300～499 床	21	2	92	25.95	545	23.68
	500 床以上	44	1	315	36.59	1610	56.68
	全体	69	1	315	31.57	2178	47.56
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	15	1	114	27.53	413	33.45
	300～499 床	29	1	548	73.48	2131	106.52
	500 床以上	37	2	460	123.22	4559	114.47
	全体	81	1	548	87.69	7103	106.77
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	14	1	78	16.64	233	21.25
	300～499 床	18	1	81	25.11	452	24.62
	500 床以上	31	5	341	57.32	1777	74.69
	全体	63	1	341	39.08	2462	57.42
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	30	16.00	32	19.80
	全体	2	2	30	16.00	32	19.80
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	6	1	22	11.00	66	6.87
	500 床以上	18	1	44	11.17	201	13.14
	全体	24	1	44	11.13	267	11.74
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	0 床						
	1～299 床	8	5	142	30.00	240	46.88
	300～499 床	10	2	47	25.00	250	18.82
	500 床以上	18	5	174	69.94	1259	50.23
	全体	36	2	174	48.58	1749	47.21
(2) 外来	0 床						
	1～299 床	10	1	93	19.10	191	27.59
	300～499 床	5	1	33	13.00	65	14.27
	500 床以上	13	2	79	27.77	361	26.16
	全体	28	1	93	22.04	617	24.94
(3) 救急外来	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(4) 手術室	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(5) 集中治療室	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	6	2	13	6.33	38	4.41
	全体	6	2	13	6.33	38	4.41
(6) 医療機関外	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

1-217. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の患者の製剤種別、入院・外来別に使用本数を記入してください。

【(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	21	1	243	38.00	798	58.75
	300～499 床	39	1	275	44.10	1720	67.23
	500 床以上	74	1	469	76.38	5652	81.45
	全体	134	1	469	60.97	8170	75.83
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	1	5	5	5.00	5	
	300～499 床	6	1	12	6.17	37	4.79
	500 床以上	15	1	168	26.53	398	44.44
	全体	22	1	168	20.00	440	37.66
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	5	2	98	47.40	237	43.60
	300～499 床	5	5	15	9.60	48	4.56
	500 床以上	8	7	82	37.75	302	27.16
	全体	18	2	98	32.61	587	31.44
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	223	1	4438	113.24	25253	331.49
	300～499 床	140	1	3045	214.26	29997	352.82
	500 床以上	102	1	7022	695.54	70945	1132.48
	全体	465	1	7022	271.39	126195	649.30
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	49	1	788	56.53	2770	124.60
	300～499 床	57	1	577	63.84	3639	104.11
	500 床以上	64	1	3578	234.66	15018	527.36
	全体	170	1	3578	126.04	21427	344.75
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	153	1	3820	137.22	20994	347.63
	300～499 床	127	2	2051	271.05	34423	308.60
	500 床以上	100	6	4796	922.14	92214	906.35
	全体	380	1	4796	388.50	147631	632.42

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来患者	0 床	1	144	144	144.00	144	
	1～299 床	48	2	342	75.50	3624	90.27
	300～499 床	68	1	1343	99.50	6766	187.16
	500 床以上	85	1	1725	303.80	25823	380.92
	全体	202	1	1725	179.99	36357	292.42
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	6	6	6.00	6	
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	2	6	6	6.00	12	0.00

【(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	12	1	995	177.50	2130	317.11
	300～499 床	17	10	245	63.82	1085	63.66
	500 床以上	30	1	947	233.53	7006	217.86
	全体	59	1	995	173.24	10221	222.07
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	10	1	197	51.30	513	63.20
	300～499 床	9	2	124	29.11	262	37.78
	500 床以上	20	1	289	69.95	1399	69.38
	全体	39	1	289	55.74	2174	62.71
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	4	9	110	41.25	165	46.89
	300～499 床	14	1	659	75.14	1052	178.37
	500 床以上	30	1	459	76.10	2283	124.49
	全体	48	1	659	72.92	3500	136.37
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	11	11	11.00	11	
	500 床以上	8	2	19	8.50	68	6.76
	全体	9	2	19	8.78	79	6.38
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	23	1	467	72.35	1664	114.89
	300～499 床	47	1	692	57.70	2712	134.35
	500 床以上	44	1	1335	125.50	5522	230.04
	全体	114	1	1335	86.82	9898	176.16
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	5	1	77	24.00	120	32.62
	300～499 床	13	2	61	21.23	276	21.28
	500 床以上	31	2	359	47.32	1467	77.96
	全体	49	1	359	38.02	1863	64.45

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	51	1	362	39.80	2030	58.13
	300～499 床	70	1	883	114.11	7988	129.54
	500 床以上	77	2	2870	388.91	29946	436.61
	全体	198	1	2870	201.84	39964	321.69
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	16	1	22	10.19	163	6.85
	300～499 床	37	1	169	40.32	1492	47.14
	500 床以上	64	1	1416	142.14	9097	229.30
	全体	117	1	1416	91.90	10752	180.03
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	1	20	20	20.00	20	
	全体	1	20	20	20.00	20	

【(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	17	1	306	43.06	732	74.59
	300～499 床	32	1	561	79.47	2543	109.11
	500 床以上	39	2	448	128.64	5017	109.91
	全体	88	1	561	94.23	8292	108.00

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	13	1	80	16.46	214	20.62
	300～499 床	21	1	119	31.10	653	32.14
	500 床以上	33	5	341	55.82	1842	71.83
	全体	67	1	341	40.43	2709	56.14
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 入院患者	0 床						
	1～299 床	8	5	142	30.00	240	46.88
	300～499 床	10	2	47	20.80	208	18.55
	500 床以上	21	5	256	85.71	1800	72.05
	全体	39	2	256	57.64	2248	64.59
(2) 外来患者	0 床						
	1～299 床	10	1	93	21.00	210	26.85
	300～499 床	5	1	33	14.00	70	15.28
	500 床以上	16	2	293	44.13	706	71.33
	全体	31	1	293	31.81	986	54.44
(3) 医療機関外患者	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						

1-218. 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用した患者の製剤種別に平均年齢を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤 5% (0.5g/10mL) ／オ	0 床						
	1～299 床	13	1	58	10.23	133	17.36
	300～499 床	26	1	72	10.46	272	17.93
	500 床以上	44	1	53	10.77	474	12.88
	全体	83	1	72	10.59	879	15.14
(2) 免疫グロブリン製剤 5% (1.0g/20mL) ／オ	0 床						
	1～299 床	2	1	82	41.50	83	57.28
	300～499 床	4	1	68	28.75	115	32.14
	500 床以上	3	2	4	2.67	8	1.15
	全体	9	1	82	22.89	206	32.48
(3) 免疫グロブリン製剤 5% (2.5g/50mL) ／オ	0 床						
	1～299 床	212	1	97	60.66	12860	24.69
	300～499 床	108	1	84	47.22	5100	24.89
	500 床以上	70	3	82	44.76	3133	18.25
	全体	390	1	97	54.08	21093	24.75
(4) 免疫グロブリン製剤 5% (5.0g/100mL) ／オ	0 床	1	73	73	73.00	73	
	1～299 床	160	1	96	58.76	9402	23.38
	300～499 床	95	2	77	47.52	4514	21.32
	500 床以上	71	17	71	50.70	3600	12.56
	全体	327	1	96	53.79	17589	21.41
(5) 免疫グロブリン製剤 5% (10.0g/200mL) ／オ	0 床						
	1～299 床	14	5	80	53.21	745	24.02
	300～499 床	16	13	87	52.56	841	18.20
	500 床以上	24	1	74	51.50	1236	15.51
	全体	54	1	87	52.26	2822	18.44
(6) 免疫グロブリン製剤 10% (0.5g/5mL) ／オ	0 床						
	1～299 床	2	3	4	3.50	7	0.71
	300～499 床	8	1	71	14.50	116	25.46
	500 床以上	14	1	48	12.50	175	15.32
	全体	24	1	71	12.42	298	18.39

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 免疫グロブリン製剤 10% (2.5g/25mL) / 才	0 床						
	1～299 床	17	2	91	41.76	710	29.02
	300～499 床	32	2	80	44.72	1431	24.69
	500 床以上	33	1	71	26.70	881	19.96
	全体	82	1	91	36.85	3022	25.07
(8) 免疫グロブリン製剤 10% (5.0g/50mL) / 才	0 床						
	1～299 床	46	1	89	58.54	2693	23.07
	300～499 床	54	2	85	49.13	2653	22.44
	500 床以上	47	10	76	50.26	2362	15.16
	全体	147	1	89	52.44	7708	20.90
(9) 免疫グロブリン製剤 10% (10.0g/100mL) / 才	0 床						
	1～299 床	14	5	73	49.07	687	20.75
	300～499 床	25	5	72	38.16	954	23.03
	500 床以上	29	4	69	42.97	1246	18.35
	全体	68	4	73	42.46	2887	20.75
(10) 免疫グロブリン製剤 10% (20.0g/200mL) / 才	0 床						
	1～299 床	15	34	81	60.87	913	14.20
	300～499 床	9	6	88	52.56	473	24.51
	500 床以上	13	15	72	54.77	712	14.83
	全体	37	6	88	56.70	2098	17.26

【4】 その他

1-219. 回答内容を確認するため事務局からの問い合わせに対応いただけますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	352	50.29%	1145	46.89%	146	52.33%	115	67.25%	1758	48.94%
2	いいえ	348	49.71%	1297	53.11%	133	47.67%	56	32.75%	1834	51.06%
	回答施設合計	700		2442		279		171		3592	

「(1) はい」の場合、問い合わせ担当者の所属・氏名・電話番号メールアドレスを記入して下さい

R01 基本・詳細_施設回答(提出用).xlsx を参照

【5】一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

5-1) 異型適合血および輸血副作用の実態について

2-1. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血過誤による ABO 型異型輸血、間違った同型輸血が発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.00%	6	0.21%	0	0.00%	1	0.44%	7	0.16%
2	ない	753	99.60%	2888	99.62%	388	100.00%	224	99.56%	4253	99.65%
3	不明	3	0.40%	5	0.17%	0	0.00%	0	0.00%	8	0.19%
	回答施設合計	756		2899		388		225		4268	

「(1)ある」場合、症例数を整数で記入して下さい

「(1)ある」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	4	1	2	1.25	5	0.50
	300～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	5	1	2	1.20	6	0.45

2-2. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、血漿製剤)の ABO 異型適合血輸血を実施した事例はありましたか。

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	5	0.69%	76	2.73%	148	40.33%	176	81.86%	405	9.92%
2	ない	709	98.34%	2692	96.83%	216	58.86%	36	16.74%	3653	89.47%
3	不明	7	0.97%	12	0.43%	3	0.82%	3	1.40%	25	0.61%
	回答施設合計	721		2780		367		215		4083	

2-3. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血用血液製剤の ABO 異型適合血輸血を実施した事例数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 同型血入手不能時の O 型赤血球製剤の輸血事例数／件	0 床						
	1～299 床	28	1	9	1.96	55	2.19
	300～499 床	40	1	14	1.75	70	2.08
	500 床以上	27	1	15	2.30	62	2.88
	全体	95	1	15	1.97	187	2.35
(2) 同型血入手不能時の O 型以外の赤血球製剤輸血事例数／件	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500 床以上	3	1	2	1.67	5	0.58
	全体	7	1	2	1.29	9	0.49
(3) 血液型未確定時の O 型赤血球製剤輸血事例数／件	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	25	1	12	2.20	55	2.50
	300～499 床	68	1	57	6.38	434	9.89
	500 床以上	125	1	120	10.77	1346	15.41
	全体	219	1	120	8.38	1836	13.23
(4) 血液型未確定時の O 型以外の赤血球製剤輸血事例数／件	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	3	1	20	8.00	24	10.44
	500 床以上	4	13	69	32.00	128	25.17
	全体	8	1	69	19.13	153	22.30
(5) 造血幹細胞移植による異型輸血事例数／件	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	5	1	330	95.80	479	144.95
	300～499 床	15	1	1097	203.67	3055	302.34
	500 床以上	75	1	1715	117.96	8847	292.03
	全体	96	1	1715	128.98	12382	286.34
(6) 造血幹細胞移植以外の移植による異型輸血事例数／件	0 床						
	1～299 床	2	6	13	9.50	19	4.95
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	30	1	47	8.50	255	11.41
	全体	33	1	47	8.36	276	10.96

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他(理由を下の枠内に記入してください)事例数/件	0 床	1	1	1	1.00	1	
	1～299 床	12	1	6	3.00	36	1.60
	300～499 床	31	1	59	6.13	190	11.74
	500 床以上	50	1	540	21.82	1091	77.90
	全体	94	1	540	14.02	1318	57.56
(8)合計事例数/件	0 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	1～299 床	66	1	330	9.80	647	43.77
	300～499 床	122	1	1102	30.97	3778	125.25
	500 床以上	147	1	2260	79.82	11734	250.29
	全体	338	1	2260	47.82	16162	184.38

「(7)その他」の場合、その理由を 50 文字以内で記入して下さい

別紙 設問 2-3 その他事例.xlsx を参照

2-4. ABO 異型輸血、間違った同型輸血以外の重篤な溶血性副作用(輸血過誤以外)が、平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.00%	3	0.11%	2	0.55%	1	0.47%	6	0.15%
2	発生していない	699	99.29%	2728	99.38%	363	99.18%	213	99.07%	4003	99.33%
3	不明	5	0.71%	14	0.51%	1	0.27%	1	0.47%	21	0.52%
	回答施設合計	704		2745		366		215		4030	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 1) 輸血過誤が行われた症例

4 施設

5 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	300～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	5	1	1	1.00	5	0.00

2-5. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血関連急性肺障害(TRALI)を経験されましたか (疑い例も含む)

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	経験した	1	0.14%	2	0.07%	2	0.54%	0	0.00%	5	0.12%
2	経験無い	694	99.14%	2686	98.46%	362	98.64%	208	97.65%	3950	98.55%
3	不明	5	0.71%	40	1.47%	3	0.82%	5	2.35%	53	1.32%
	回答施設合計	700		2728		367		213		4008	

「(1) 経験した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (TRALI)

1 施設

1 症例

「(1) 経験した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上						
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00

2-6. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で重症アレルギー反応が、発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.14%	7	0.26%	11	3.00%	19	8.96%	38	0.95%
2	発生していない	696	99.43%	2682	98.46%	352	95.91%	186	87.74%	3916	97.83%
3	不明	3	0.43%	35	1.28%	4	1.09%	7	3.30%	49	1.22%
	回答施設合計	700		2724		367		212		4003	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (重症アレルギー反応)

24 施設

36 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	300～499 床	10	1	2	1.10	11	0.32
	500 床以上	17	1	7	2.06	35	1.71
	全体	30	1	7	1.63	49	1.38

2-7. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で移植片対宿主病(GVHD)が発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.00%	2	0.07%	1	0.27%	0	0.00%	3	0.07%
2	発生していない	698	99.57%	2690	98.90%	364	98.91%	211	98.14%	3963	98.98%
3	不明	3	0.43%	28	1.03%	3	0.82%	4	1.86%	38	0.95%
	回答施設合計	701		2720		368		215		4004	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (GVHD)

0 施設

0 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	

2-8. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血による重篤な細菌感染症を経験されましたか (疑い例も含む)

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.00%	1	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.02%
2	発生していない	698	99.57%	2689	98.93%	367	99.46%	211	98.14%	3965	99.05%
3	不明	3	0.43%	28	1.03%	2	0.54%	4	1.86%	37	0.92%
	回答施設合計	701		2718		369		215		4003	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (細菌感染症)

0 施設

0 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	1	1	1	1.00	1	
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	

2-9. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血関連循環過負荷 (TACO) が発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.00%	7	0.26%	6	1.63%	12	5.63%	25	0.63%
2	発生していない	694	99.43%	2651	97.71%	354	96.46%	196	92.02%	3895	97.59%
3	不明	4	0.57%	55	2.03%	7	1.91%	5	2.35%	71	1.78%
	回答施設合計	698		2713		367		213		3991	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (TACO)

12 施設

13 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	6	1	1	1.00	6	0.00
	300～499 床	6	1	2	1.33	8	0.52
	500 床以上	12	1	1	1.00	12	0.00
	全体	24	1	2	1.08	26	0.28

2-10. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で上記(問 2-4～問 2-9)以外の重篤な副作用が発生しましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.00%	1	0.04%	4	1.09%	8	3.74%	13	0.33%
2	発生していない	692	99.43%	2688	98.86%	358	97.55%	200	93.46%	3938	98.55%
3	不明	4	0.57%	30	1.10%	5	1.36%	6	2.80%	45	1.13%
	回答施設合計	696		2719		367		214		3996	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい

(別紙 2) 重篤な副作用症例 (その他)

9 施設

10 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	1	2	1.25	5	0.50
	500 床以上	7	1	2	1.14	8	0.38
	全体	11	1	2	1.18	13	0.40

5-2) 大量出血時の輸血について

2-11. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で大量出血のため 1 日につき RBC10 単位以上輸血した症例はありますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.00%	214	7.48%	264	70.21%	214	96.40%	692	16.44%
2	ない	748	100.00%	2648	92.52%	112	29.79%	8	3.60%	3516	83.56%
	回答施設合計	748		2862		376		222		4208	

2-12. 貴施設では大量出血・大量輸血時の凝固障害に対して何を用いて対応していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新鮮凍結血漿のみ			188	90.82%	213	84.86%	130	63.73%	531	80.21%
2	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート			1	0.48%	8	3.19%	27	13.24%	36	5.44%
3	新鮮凍結血漿＋フィブリノゲ ン濃縮製剤			15	7.25%	30	11.95%	37	18.14%	82	12.39%
4	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート、または新鮮凍結血 漿＋フィブリノゲン濃縮製剤			3	1.45%	0	0.00%	10	4.90%	13	1.96%
	回答施設合計			207		251		204		662	

2-13. 問 2-12 で「(2)～(4)」と答えた施設では、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を決めていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	決めている			6	33.33%	15	45.45%	38	54.29%	59	48.76%
2	決めてない			12	66.67%	18	54.55%	32	45.71%	62	51.24%
	回答施設合計			18		33		70		121	

2-14. 問 2-13 で「(1) 決めている」と答えた施設では何を投与基準としていますか

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血量 (mL)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1500	3000	2166.67	6500	763.76
	500 床以上	2	1500	2000	1750.00	3500	353.55
	全体	5	1500	3000	2000.00	10000	612.37
(2) PT 値 (%)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	2	30	30	30.00	60	0.00
	500 床以上	2	30	50	40.00	80	14.14
	全体	4	30	50	35.00	140	10.00
(3) フィブリノゲン値 (mg/dL)	0 床						
	1～299 床	6	100	150	125.00	750	27.39
	300～499 床	13	100	200	150.00	1950	20.41
	500 床以上	34	100	150	133.82	4550	23.74
	全体	53	100	200	136.79	7250	24.32

「その他」の詳細を 50 文字以内で記入して下さい

設問 2-14 その他詳細.xlsx を参照

2-15. 問 2-12 で「(2)および(4)」と答えた施設で、平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で作成し使用した、クリオプレシピテートの調整用製剤となった血漿製剤の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・120 製剤)／袋(本)	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR・240 製剤)／袋(本)	0 床						
	1～299 床	1	10	10	10.00	10	
	300～499 床						
	500 床以上	1	13	13	13.00	13	
	全体	2	10	13	11.50	23	2.12

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿・LR-480製剤)／袋(本)	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	6	5	246	67.50	405	90.57
	500 床以上	28	1	213	51.11	1431	49.48
	全体	35	1	246	52.57	1840	57.10
(4) 合計／袋(本)	0 床						
	1～299 床	2	4	10	7.00	14	4.24
	300～499 床	6	5	246	67.50	405	90.57
	500 床以上	29	1	213	49.79	1444	49.10
	全体	37	1	246	50.35	1863	56.29

2-16. 問 2-12 で「(2)～(4)」と答えた施設でクリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の 1 回の投与量は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) クリオプレシピテート／バック	0 床						
	1～299 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	300～499 床	8	3	4	3.13	25	0.35
	500 床以上	33	1	4	2.76	91	0.61
	全体	43	1	4	2.79	120	0.64
フィブリノゲン濃縮製剤／g	0 床						
	1～299 床	9	1	4	2.89	26	0.78
	300～499 床	12	1	6	2.92	35	1.24
	500 床以上	27	1	5	2.96	80	0.59
	全体	48	1	6	2.94	141	0.81

2-17. 問 2-12 で「(2)～(4)」と答えた施設でクリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤を使用する診療科と平成 31 年 1 月～平成 31 年 4 月)の件数は

クリオプレシピテート使用件数 (件)							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科 (小児を含む)	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	4	3	48	20.75	83	21.53
	500 床以上	23	1	41	13.26	305	11.12
	全体	28	1	48	14.00	392	12.77
(2) 産科	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床	1	21	21	21.00	21	
	500 床以上	11	1	10	3.36	37	2.91
	全体	13	1	21	4.62	60	5.61
(3) 救命救急	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	4	2	75	27.25	109	33.52
	500 床以上	15	1	13	5.73	86	4.15
	全体	19	1	75	10.26	195	16.79
(4) 肝胆膵外科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	6	1	5	1.83	11	1.60
	全体	6	1	5	1.83	11	1.60
(5) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	2	2	11	6.50	13	6.36
	全体	2	2	11	6.50	13	6.36
(6) その他	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	6	3.67	11	2.52
	500 床以上	10	1	12	4.30	43	3.95
	全体	13	1	12	4.15	54	3.58

フィブリノゲン濃縮製剤使用件数（件）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科（小児を含む）	0 床						
	1～299 床	2	4	105	54.50	109	71.42
	300～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	12	1	31	10.83	130	10.06
	全体	15	1	105	16.07	241	26.32
(2) 産科	0 床						
	1～299 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	300～499 床	5	1	4	2.60	13	1.34
	500 床以上	10	1	36	6.70	67	10.59
	全体	17	1	36	4.94	84	8.27
(3) 救命救急	0 床						
	1～299 床	1	2	2	2.00	2	
	300～499 床						
	500 床以上	7	1	149	25.86	181	55.01
	全体	8	1	149	22.88	183	51.63
(4) 肝胆膵外科	0 床						
	1～299 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	300～499 床						
	500 床以上	5	1	9	4.60	23	3.65
	全体	7	1	9	3.57	25	3.46
(5) 血液内科	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	1	21	21	21.00	21	
	500 床以上	3	2	4	3.33	10	1.15
	全体	4	2	21	7.75	31	8.88
(6) その他	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500 床以上	8	1	60	9.38	75	20.50
	全体	11	1	60	7.09	78	17.59

「その他」の診療科を 50 文字以内で記入して下さい

別紙 設問 2-17 その他診療科.xlsx を参照

5-3) 院内成分採血細胞処理・凍結保存・保管に関する実施状況調査

2-18. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で下記の採血、細胞処理、凍結、保存を行っていますか

- (1) 血縁および非血縁末梢血幹細胞 (2) 自家末梢血幹細胞
 (3) ドナーリンパ球(アフエレーシス法) (4) 顆粒球採取(アフエレーシス法)
 (5) 自己リンパ球(アフエレーシス法)

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.14%	16	0.56%	59	15.86%	148	65.49%	224	5.36%
2	いいえ	738	99.86%	2824	99.44%	313	84.14%	78	34.51%	3953	94.64%
	回答施設合計	739		2840		372		226		4177	

2-19. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で、血縁および非血縁末梢血幹細胞採取を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			2	15.38%	19	32.20%	82	57.34%	103	47.91%
2	採取していない			11	84.62%	40	67.80%	61	42.66%	112	52.09%
	回答施設合計			13		59		143		215	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	1	4	4	4.00	4	
	300～499 床	13	1	30	6.77	88	8.23
	500 床以上	72	1	62	5.11	368	8.85
	全体	86	1	62	5.35	460	8.68

2-20. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で、自家末梢血幹細胞採取を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			12	85.71%	46	77.97%	128	88.89%	186	85.71%
2	採取していない			2	14.29%	13	22.03%	16	11.11%	31	14.29%
	回答施設合計			14		59		144		217	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	10	1	12	4.00	40	3.43
	300～499 床	35	1	27	5.23	183	5.52
	500 床以上	118	1	120	7.16	845	12.68
	全体	163	1	120	6.55	1068	11.14

2-21. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で、ドナーリンパ球採取(アフエレーシス法)を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			2	14.29%	3	5.26%	22	15.71%	27	12.80%
2	採取していない			12	85.71%	54	94.74%	118	84.29%	184	87.20%
	回答施設合計			14		57		140		211	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床	3	1	3	1.67	5	1.15
	500 床以上	19	1	4	1.63	31	0.83
	全体	22	1	4	1.64	36	0.85

2-22. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で、顆粒球採取(アフエーシス法)を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			2	14.29%	1	1.72%	6	4.23%	9	4.21%
2	採取していない			12	85.71%	57	98.28%	136	95.77%	205	95.79%
	回答施設合計			14		58		142		214	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	2	1	12	6.50	13	7.78
	300～499 床						
	500 床以上	6	1	18	4.33	26	6.74
	全体	8	1	18	4.88	39	6.49

2-23. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で、自己リンパ球(アフエーシス法)を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			0	0.00%	0	0.00%	5	3.50%	5	2.33%
2	採取していない			14	100.00%	58	100.00%	138	96.50%	210	97.67%
	回答施設合計			14		58		143		215	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床						
	300～499 床						
	500 床以上	5	2	8	3.60	18	2.61
	全体	5	2	8	3.60	18	2.61

2-24. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で輸血部または関連する部門で細胞の凍結処理・保管管理を行いましたか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した			12	85.71%	45	76.27%	132	92.31%	189	87.50%
2	採取していない			2	14.29%	14	23.73%	11	7.69%	27	12.50%
	回答施設合計			14		59		143		216	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0 床						
	1～299 床	9	1	11	4.00	36	3.04
	300～499 床	33	1	48	7.94	262	10.52
	500 床以上	99	1	170	12.73	1260	24.34
	全体	141	1	170	11.05	1558	21.17

2-25. 標準作業手順書(SOP)を作成・使用していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい			13	92.86%	39	69.64%	118	85.51%	170	81.73%
2	いいえ			1	7.14%	17	30.36%	20	14.49%	38	18.27%
	回答施設合計			14		56		138		208	

2-26. 作業工程の記録をしていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい			10	71.43%	33	60.00%	120	86.33%	163	78.37%
2	いいえ			4	28.57%	22	40.00%	19	13.67%	45	21.63%
	回答施設合計			14		55		139		208	

5-4) 細胞治療(再生医療等製品)に関する実施状況調査

2-27. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で下記の細胞治療(再生医療等製品)を使用しましたか

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 | 『テムセル HS 注』 |
| (2) ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート | 『ハートシート』 |
| (3) ヒト(自己)表皮由来細胞シート | 『ジェイス』 |
| (4) ヒト(自己)軟骨由来組織 | 『ジャック』 |
| (5) ヒト(自己)骨髄由来 間葉系幹細胞 | 『ステミラック注』 |
| (6) チサゲンレクルユーセル | 『キムリア点滴静注』 |

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.14%	6	0.21%	7	1.97%	43	19.82%	57	1.38%
2	いいえ	736	99.86%	2830	99.79%	348	98.03%	174	80.18%	4088	98.62%
	回答施設合計	737		2836		355		217		4145	

2-28. 平成 31 年 1 月～平成 31 年 3 月の期間で使用した細胞治療(再生医療等製品)は

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 『テムセル HS 注』			2	66.67%	7	100.00%	39	92.86%	48	92.31%
2	ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート 『ハートシート』			0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	ヒト(自己)表皮由来細胞シート 『ジェイス』			0	0.00%	0	0.00%	3	7.14%	3	5.77%
4	ヒト(自己)軟骨由来組織 『ジャック』			1	33.33%	0	0.00%	2	4.76%	3	5.77%
5	ヒト(自己)骨髄由来 間葉系幹細胞 『ステミラック注』			0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	チサゲンレクルユーセル 『キムリア点滴静注』			0	0.00%	0	0.00%	1	2.38%	1	1.92%
	回答施設合計			3		7		42		52	

2-29. 投与記録の管理をしていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい			4	80.00%	7	100.00%	43	100.00%	54	98.18%
2	いいえ			1	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	1.82%
	回答施設合計			5		7		43		55	

2-30. 投与記録の管理は院内のどの部署が担当していますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門			2	50.00%	1	14.29%	26	60.47%	29	53.70%
2	事務部門			0	0.00%	0	0.00%	1	2.33%	1	1.85%
3	薬剤部			1	25.00%	4	57.14%	13	30.23%	18	33.33%
4	その他の部門			1	25.00%	2	28.57%	3	6.98%	6	11.11%
	回答施設合計			4		7		43		54	

2-31. 再生医療等製品は誰が調製していますか

複数回答

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部医師			0	0.00%	0	0.00%	7	16.28%	7	13.21%
2	診療科医師			0	0.00%	6	85.71%	18	41.86%	24	45.28%
3	検査技師			2	66.67%	1	14.29%	20	46.51%	23	43.40%
4	薬剤師			0	0.00%	0	0.00%	2	4.65%	2	3.77%
5	その他			1	33.33%	0	0.00%	2	4.65%	3	5.66%
	回答施設合計			3		7		43		53	

2-32. 調製している担当者は、認定細胞治療管理師の資格を持っていますか

番号	項目	0 床		1～299 床		300～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい			1	50.00%	3	60.00%	22	55.00%	26	55.32%
2	いいえ			1	50.00%	2	40.00%	18	45.00%	21	44.68%
	回答施設合計			2		5		40		47	

5-5) その他

2-33. 赤十字血液センターについてご意見が有れば記入して下さい

別紙 設問 2-33 赤十字血液センターについて.xlsx を参照

2-34. 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会についてご意見が有れば記入して下さい

別紙 設問 2-34 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会について.xlsx を参照