

## 資料 2

### 輸血副反応の症状項目についての捕捉説明書

#### 1) 発熱

輸血開始後、38℃以上に上昇した場合、輸血前から発熱している場合は輸血開始後に1℃以上の上昇が認められた場合。

#### 2) 悪寒・戦りつ

寒い感じ、体の震え感

#### 3) 熱感・ほてり

体が熱いまたはホテッタ感じ

#### 4) そうよう感・かゆみ

体がかゆい、またはかゆい感じ

#### 5) 発赤・顔面紅潮

膨隆を伴わない皮膚の赤い皮疹、顔面が赤くなった場合

#### 6) 発疹・じんま疹

膨隆を伴った皮疹

#### 7) 呼吸困難

努力性呼吸などの呼吸困難、チアノーゼ、喘鳴などの症状、SpO<sub>2</sub>の低下などが認められた場合

#### 8) 嘔気・嘔吐

#### 9) 胸痛・腹痛・腰背部痛

#### 10) 頭痛・頭重感

#### 11) 血圧低下

輸血開始後、収縮期血圧が30 mmHg以上の低下を認めた場合

#### 12) 血圧上昇

輸血開始後、正常血圧より収縮期血圧が30 mmHg以上の上昇を認めた場合

#### 13) 動悸・頻脈

ドキドキとした感じ、成人の場合は脈拍数が100回/分以上に上昇した場合、小児に関しては対象年齢による頻脈の定義に従う

#### 14) 血管痛

#### 15) 意識障害

意識低下、意識消失などの場合

#### 16) 赤褐色尿（血色素尿）