

この度、本学会雑誌 72 (3): 571-592, 2026 に掲載されました 科学的根拠に基づいた新鮮凍結血漿の使用ガイドライン（改訂第 3 版）におきまして訂正すべき個所がございましたので謹んでお詫び申し上げますと共に改訂を記載させていただきます。

改訂前文書

4. わが国で使用される FFP

わが国で使用される FFP は 3 製剤ある。新鮮凍結血漿-LR「日赤」120, 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240, 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480 である。120 と 240 はそれぞれ 200mL, 400mL 全血採血を ACD-A 液含有バッグを使用して行い、白血球除去フィルターで濾過後遠心分離して得られた血漿にそれぞれ 28, 56mL の CPD 液を添加して作成される。480 は成分採血により血漿ドナーから得るが使用する保存液は ACD-A 液である。120, 240, 480 の容量はそれぞれほぼ 120, 240, 480mL である。いずれの製剤も採血後 6 時間以内に凍結保存される。使用期限は採血後 1 年であるが、その内の 6 か月はドナー安全性確認のために日本赤十字社に貯蔵されている。使用に際しては、30～37℃で加温し十分解凍されたことを確認し輸血用器具を使用し静脈内に投与される。解凍後室温下では 3 時間以内に、2～6℃で保存した場合は 24 時間以内に使用する。

↓

改訂文書

4. わが国で使用される FFP

わが国で使用される FFP は 3 製剤ある。新鮮凍結血漿-LR「日赤」120, 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240, 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480 である。120 と 240 は血液保存液（CPD 液）を含有したバッグに全血 200mL, 400mL を採血した後に白血球除去フィルターで白血球の大部分を除去し、遠心分離して得られた血漿を採血後 8 時間以内に凍結したものである。480 は成分採血により白血球を大部分除去して得られた血漿を採血後 6 時間以内に凍結したものである。成分採血時には ACD-A 液を使用している。120, 240, 480 の容量はそれぞれほぼ 120, 240, 480mL である。~~いずれの製剤も採血後 6 時間以内に凍結保存される。~~使用期限は採血後 1 年であるが、その内の 6 か月はドナー安全性確認のために日本赤十字社に貯蔵されている。使用に際しては、30～37℃で加温し十分解凍されたことを確認し輸血用器具を使用し静脈内に投与される。解凍後室温下では 3 時間以内に、2～6℃で保存した場合は 24 時間以内に使用する。